

Catalogus Coleopterorum (Eleutheratorum) Danicorum.

Addidamentum tertium.

Fortegnelse over de i Danmark levende Coleoptera
(Eleutherata).

Tredie Tillæg.

Af

Fr. Meinert.

Denne Fortegnelse over danske Biller, Coleopterer eller Eleutherater, er en Fortsættelse af den lange Række af Fortegnelser og Tillæg til Fortegnelser over denne Insektdordens forskjellige Familier, som ere publicerede af Prof. Schiödte i den af ham udgivne Suite af »Naturhistorisk Tidsskrift«.

Med Hensyn til Benævnelsen af Ordenen og de enkelte Familier skal jeg bemærke, at Prof. Schiödte stadigt brugte Eleutherata for Ordenen og stadig dannede Familienavnene af Hovedslægtens Navn ved at ophoie dette til Pluralis; og heri blev han da ogsaa fulgt af sine Disciple, og blandt disse ogsaa af nærværende Forfatter i hans forskjellige Publikationer. Grunden til at Schiödte valgte de Fabriciske Ordensbenævnelser, saasom Eleutherata, Piezata o. s. v., for de ældre og mere almindeligt brugte Coleoptera, Hymenoptera o. s. v.,

var væsentlig den Betydning, som han efter Fabricius tillagde Munddelene for Systemets Opbygning; saaledes som vi ogsaa finde det udtalt i den »Karakteristik af Klassens Ordener«, hvormed han indleder sin høist fortreflige Bog, Genera og Species af Danmarks Eleutherata, 1841. En anden Grund til at optage disse Navne var vel ogsaa den, at Burmeister i sin udmærkede Handbuch der Entomologie, 2. Bind, 1839, forud havde optaget de samme Benævnelser. Men hverken Burmeister eller Schiödte formaaede ret at traenge igjennem med Brugen af Fabricius' Benævnelser, og da nu ikke blot i Udlandet, men ogsaa for en Del herhjemme de Linneiske Udtryk ere blevne de eneherskende, saa de andre knap høres eller forstaaes, har jeg her foretrukket at anvende de almindeligt brugte Navne.

Jeg har ogsaa indført de almindeligt brugte Benævnelser for Familierne indenfor Ordenen, idet de af Schiödte brugte Familiebenævnelser heller ikke ere slaaede igjennem, og dertil har den Ubekvemhed, at det ofte kan være vanskeligt at afgjøre, om der menes hele Familien eller kun den nævnte Hovedslægt. At Schiödte ogsaa selv maa have indseet dette, slutter jeg deraf, at Hr. Conserv. Løvendal, som har forfattet den sidste Fortegnelse over danske Coleopterer (Naturh. Tidsskr. 3. R. 14. B.), uden Modsigelse har benyttet de almindelige Familienavne.

For at lette Oversigten og Tilslutningen til de foregaaende Fortegnelser og Tillæg deler jeg dette nye Tillæg i Smaastykker, svarende til de Familier eller Grupper af Familier, som hidtil ere blevne fortegnede. Kun saaledes er det ogsaa muligt at bevare de gamle Numre for de før kjendte Arter, og indføje de nye paa en let og iøjnefaldende Maade paa deres systematiske Plads. Foran for hvert Stykke sættes en Henvisning til de tidligere Fortegnelser og Tillæg eller systematiske Bearbei-

delser i Naturh. Tidsskr. 3. R., hvori der findes faunistiske Oplysninger om de i vedkommende Stykke indeholdte Dyrs Forekomst og Levemaade.

Med Hensyn til Paalideligheden af de meddelte Oplysninger maa først bemærkes, at for Rigtigheden af de opgivne Findesteder kan intet uden Samlerens Paalidelighed være Borgen, ligesom det jo ogsaa er Hovedhensigten med at anføre de forskjellige Finderes Navne at lade disse bære Ansvaret herfor. Noget anderledes forholder det sig med Paalideligheden af de opgivne Navne. Her maa da først fremhæves, at Zoologerne i Almindelighed og Entomologerne i Særdeleshed, hvad enten de nu beskjæftige sig alene med Indsamling af Dyr eller ogsaa studere andre Sider af disses Liv, naturligt danne en Forening eller ialtfald staae i Forbindelse med hverandre, saa at derved sikkres en nogenlunde ensartet Bestemmelse af det indsamlede Forraad. Naturligvis vil det ikke kunne undgaaes, at der engang imellem indløber en uriktig Bestemmelse, eller at en Form, som af en Samler ansees for en god Art, af en anden kun betragtes som Varietet, og saaledes opføres med forskjelligt Artsnavn. Meget vilde det jo bøde paa mulig Usikkerhed, hvis der havdes let og sikker Adgang til i Twivlstilfælde at kunne recurrere til selve Dyret, hvorom der er Tale; og det vil derfor altid have Interesse at vide, hvor eller i hvilken Samling de omtalte eller opregnede Arter findes. I disse Tillæg saavelsom i de forskjellige Fortegnelser og Tillæg i Naturh. Tidsskrift gaaes der ud fra, at Arten findes repræsenteret i 3die Afdeling af Universitetets Zoologiske Museum, og naar dette ikke er Tilfældet, vil det udtrykkelig blive bemærket, og tillige angivet, i hvilken eller hvilke andre Samlinger vedkommende Art da findes.*)

*) I Slutningen af denne Fortegnelse skal jeg ogsaa give en Liste over de Arter af de hidtil fortegnede Billefamilier, som ikke

Naturligvis er det af høieste Betydning for Museet at have den rigeste og fyldigste Repræsentation af Landets Fauna, her Insekts-Fauna, og om muligt at eie alle de i Landet forekommende eller kjendte Insekter. Til Opnaaelse af dette Øiemed eller ialtfald at komme det saa nær som muligt, er nærværende Bestyrer af Afdelingen saa fri at lægge D'Hrr. Entomologer Betydningen af en saadan Generalsamling paa Hjerte, og er han yderlig villig til, om mulig ved Bytning eller andet Vederlag, at give nogen Erstatning for Afsavn af saadanne Skatte. Iovrigt er det ikke blot ukjendte eller for Museet nye Insekter, som kunde ønskes, men ogsaa saadanne Dyr, som eies i Forveien, men kun haves fra enkelte eller faa Localiteter, vil ofte have stor Interesse at besidde fra Landets forskjellige Egne. Det kunde maaske siges, saaledes som det da ogsaa er blevet sagt, at naar man først havde Fortegnelsen af Findestederne trykt, kunde man gjerne i Samlingerne rive Stedsetiketterne af, men dette er en meget stor Vildfarelse. Thi ikke blot er man ved Bestemmelsen af vanskeligere Arter altid utsat for, at der kan være løbet flere eller færre urigtige Bestemmelser ind med, hvorved let alle de opgivne Localiteter blive usikkre; men det kan ogsaa hænde sig, at Bestemmelserne vel alle have været upaaklelige, men at ifølge senere Undersøgelser den gamle Art bliver deelt i to eller flere nye Arter, eller at hvad man forhen ansaae for en Varietet, nu maa betragtes som en egen Art, og i begge Tilfælde blive de publicerede Localitetsbestemmelser baade for den gamle og den nye Art ubrugelige eller usikkre. Entomologerne kan det derfor ikke lægges stærkt nok paa Sinde at have deres Dyr tilstrækkeligt og sikkert betegnede efter Finested.

findes paa Museet, tilligemed en Angivelse af de andre Samlinger, hvori de vides at forekomme.

Denne Fortegnelse har jeg betegnet som Tredie Tillæg, idet der i Forveien haves to Tillæg af Schiödte, som omfatte væsentlig de samme Billefamilier, som i det følgende skulle omtales.

Disse to Tillæg ere:

Schiödte: Tillæg til Fortegnelserne over de i Danmark levende Eleutherata, Nat. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 482—88 og 10. B. p. 57—62.

Carabidæ.

Som oftest sondres de af Schiödte under Familienavnet Carabi samlede Biller i to Familier, nemlig Cicindelidæ og de egentlige Carabici. Her at indføre denne Tvedeling er upraktisk, saameget mere som vi af den første Afdeling eller Familie kun have 3 indenlandske Arter.

Schiödte: Danmarks Harpaliner, Nat. Tidsskr. 3. R. 1. B. p. 149—92.

Tillæg til Danmarks Harpaliner, ibid. p. 554—58.
De tunnelgravende Biller, Bledius, Heterocerus, Dyschirius, og deres danske Arter,
4. B. p. 141—67.

Andet Tillæg til Danmarks Harpaliner, ibid.
p. 168.

Tillæg til Danmarks Karaber og Dytisker
(Hovedfortegnelsen), 6. B. p. 402—34.

Tillæg til Fortegnelsen over de i Danmark
levende Karaber, 8. B. p. 160.

1. **Cicindela sylvatica** Linn. — Hornbæk, Aug. 1884 og 85;
i Mængde, Jørgensen.
6. **Dromius longiceps** Dej. — Viby Krat ved Aarhus, 1882
15 St., 1884 1 St., Rosenkrantz.
9. **Dromius fenestratus** Dej. — Lollands sydøstlige Egne:

Nysted Mark, Vandthore, mellem Sundby Storskov og Grængeskov, paa Risgjærder, især i Juni—Septemb., dog i begrændset Antal, Engelhart.

- 17a. **Blechrus maurus** St. — *Dromius maurus* Sturm, Deutschl. Ins. VII. 55. 16. t. 171. f. d. D.; Redtenbacher, Faun. austr. p. 18. *Blechrus maurus* Schaum, Naturg. Ins. Deutschl. I. Abth. 1. B. p. 276. — Denne Art ligner endel den almindelige *Dromius truncatellus* og er vistnok ogsaa fra gammel Tid sammenblandet med denne Art; men efterat Entomologerne herhjemme (først Conserv. Løvendahl) ere blevne opmærksom paa den, har det viist sig, at den vistnok er udbredt over største Delen af Landet. Som Steder, hvor dens Forekomst allerede nu er constateret, kunne nævnes Amagerfælled, i Slutningen af Marts, i stort Antal, Ørholm Fælled, i Juli, Boserup, i Octob., ved Hillerød, paa Bornholm, D'Hrr. Conserv. Løvendal og Cand. Schlick; ved Horsens, O. G. Jensen; paa Møn, o. s. v.
24. **Cymindis basalis** Gyll. — Hammer Bakker N. f. Aalborg, Juli—Aug., en Række, P. Johansen og Asmusen.
- 25a. **Masoreus Wetterhallii** Gyll. — Fedet udf. Præstø, Forf.; Fanø, i Sandet, 2 St., Rosenkrantz; Hoyer, Aug., L. Andersen.
39. **Diachromus germanus** Linn. — Hostrup Sø, mellem Aabenraa og Flensborg, Juli, nogle St., L. Andersen.
40. **Ophonus punctatulus** Duft. — Aalholm Hestehave, Juli, en større Række, Engelhart; Fyen, flere Steder, især ved Odense, dog enkeltvis, Jørgensen.
49. **Harpalus rubripes** Duft. — Sandegnene mellem Ryomgaard og Grenaa, almindelig, Rosenkrantz.
52. **Harpalus seriepunctatus** Gyll. — Gjerup i Fyen, i Mai, samt Silkeborg, i Aug., et Par St., Jørgensen.
56. **Harpalus servus** Duft. — Forekommer hist og her paa Fyen saa langt N. paa som til Odense, Jørgensen.
61. **Harpalus honestus** Duft. — Gjerup, Aug., Jørgensen.
63. **Harpalus Froelichii** St. — Silkeborg-Egnen, ikke sjeldent, Rosenkrantz.
65. **Harpalus hirtipes** Panz. — Feldballe, ved Kaløvig, enkelte Aar almindelig, Rosenkrantz.

88. **Amara patricia** Duft. — Agdrup Bakker i Vendsyssel, 1 St., Johansen.
90. **Amara municipalis** Duft. — Aalborg, solaabne, tørre Steader, Johansen.
93. **Amara maritima** Schiö. — Aarhus, Grenaa, Fano, enkeltvis, Rosenkrantz.
104. **Amara spreta** Dej. — Sandegnene ved Silkeborg og Grenaa, almindelig, Rosenkrantz.
111. **Amara brunnea** Gyll. — Teglstruphegn, under Birkeløv, April og Aug., en Række, Løvendal.
115. **Pterostichus dimidiatus** Oliv. — Agdrup Bakker i Vendsyssel, 1. St., Johansen.
129. **Pterostichus angustatus** Duft. — Møen, Juni, 1 St., Løvendal.
131. **Pterostichus metallicus** Fabr. — Ved Hyttenbjergene, mellem Slesvig og Rendsborg, Juli, 5 St., L. Andersen.
135. **Sphodrus leucophthalmus** Linn. — Aalborg, i et Bageri, i Mængde, Johansen.
137. **Calathus rotundicollis** Dej. — Munkebjerg, Aug., 1 St., Jørgensen; Marselisborg Skov, under Mos paa en Skraent, 1880 i Mængde, i de senere Aar enkeltvis, Rosenkrantz; Tranum Strandgaard i Vendsyssel, paa Havstokken, Johansen.
139. **Calathus ochropterus** Duft. — Klitterne ved Blokhus, Johansen; Fanø, ved Roden af Marehalm, Juli—Aug. 1885, skarevis, Rosenkrantz; Hjærpsted Strand, N. f. Højer, Aug., L. Andersen.
146. **Anchomenus quadripunctatus** de G. — Aalborg, ved Nedbrydning af et gammelt Hus, Johansen.
152. **Anchomenus lugens** Duft. — Damhus Mose, 1 St., Engelhart.
157. **Anchomenus micans** Nicol. — Marskengene ved Højer, Aug. 1886, i større Antal, L. Andersen.
168. **Chlaenius cælatus** Web. — Sorgenfri, April, 1 St., Løvendal.
169. **Chlaenius sulcicollis** Payk. — Gravlev Enge ved Aalborg, 1 St., Johansen.
170. **Chlaenius holosericeus** Fabr. — Rødby Fjord, ikke almindelig, og Maribo Sø, Bøgh.

172. **Chlaenius vestitus** Fabr. — Marsken udfor Diget ved Højer, Aug., L. Andersen.
176. **Badister humeralis** Bon. — Omkring Aarhusbugten, i de fleste Skove, almindelig, Rosenkrantz.
177. **Badister peltatus** Panz. — Hø Skov ved Aarhus, enkelte Aar almindelig, Rosenkrantz.
183. **Carabus glabratus** Fabr. — Silkeborg- og Aarhus-Egnen, ikke sjeldent, mellem Skinnerne paa Skanderborg—Silkeborg Banen, 1882, en større Række, Rosenkrantz.
189. **Carabus intricatus** Linn. — Skovene ved Glücksborg, Mai 1882, L. Andersen.
190. **Carabus arvensis** Fabr. — Aarhus- og Randers-Egnen, ikke sjeldent, af og til i Mængde ved Randers, Rosenkrantz.
194. **Carabus nitens** Linn. — Silkeborg-Egnen, temmelig almindelig, og kan her tages mellem Jærnbaneskinnerne, Rosenkrantz.
196. **Calosoma sycophanta** Linn. — Ordrup, Cand. Meldahl; Taarbæk, Cand. Collin; paa Sild ved Blankenhof, i Stursbøl Plantage, L. Andersen.
197. **Calosoma reticulatum** Fabr. — N.V. f. Kolding, paa en Sandmark V. f. Skovene, siddende i Toppen af en Tidsel, Terp; nogle Mile V. f. Veile, et Par St., Fabritius; Jersdal, Froslev, Reus og Løgumkloster, enkeltvis, L. Andersen.
198. **Calosoma sericeum** Fabr. — Paa Amagerfælled, udfor Taarnby, Sept. 1886, i stort Antal, Forf.; Hyllekrog ved Lungholm paa Lolland, Holstebroe; Fanø, Aug. 1885, almindelig under Kornneg, Rosenkrantz; Haderslev, L. Andersen.
202. **Nebria livida** Linn. — Marselisborg Skov, under Skrænten. Juni—Aug. 1879, i Mængde, sammen med Varieteten Nebr. lateralis, Rosenkrantz.
208. **Pogonus halophilus** Nicol. — Fanøs Østkyst, under Tang og Lyngtørv, 1885, i Mængde, Rosenkrantz.
210. **Trechus discus** Fabr. — Haderslev, Eng ved Bøgehoved og ved Eibøl, enkeltvis, L. Andersen.
214. **Trechus rubens** Fabr. — Inddæmning ved Randersfjord, Aug., Jacobsen; Rugballegaard, ketset om Aftenen ved Aaen, Schlick; Haderslev, Rævkjær Skov, i en Skovmose, L. Andersen.

216. **Bembidium quinquestriatum** Gyll. — Haderslev, Pamhol (udtørret Sø), L. Andersen.
221. **Bembidium marinum** Schiö. — Inddæmning ved Randersfjord, Aug., Jacobsen; Fanø Østkyst, under Tang, 1885, almindelig, Rosenkrantz; Højer, Marskleret, Aug., L. Andersen.
224. **Bembidium lunatum** Duft. — Inddæmning ved Randersfjord, Aug., Jacobsen; Husum, udenfor Diget, Juli, L. Andersen.
230. **Bembidium saxatile** Gyll. — Marselisborg, under Skrænten, meget almindelig, Rosenkrantz.
232. **Bembidium brunnipes** Dej. — Sammesteds, meget almindelig, Rosenkrantz.
233. **Bembidium rufipes** Illig. — Sammesteds, meget almindelig, Rosenkrantz.
- 233a. **Bembidium decorum** Panz. — Carabus decorus Panzer, Faun. Germ. p. 73. 4. Bembidium decorum Sturm, Ins. Deutschl. VI. p. 122. 9; Redtenbacher, Faun. austr. p. 76; Schaum, Naturg. Ins. Deutschl. I. Abth. I. B. p. 711. — Haderslev, ved Ulfslyst, Mai 1881, nogle Stykker, L. Andersen.
235. **Bembidium pallidipenne** Illig. — Fanø Østkyst, under Tang, 1885, almindelig, Rosenkrantz.
240. **Bembidium pusillum** Gyll. — Sammesteds, almindelig, Rosenkrantz.
241. **Bembidium normannum** Dej. — Sammesteds, almindelig, Rosenkrantz; Husum, udenfor Diget i Marskleret, meget almindelig, L. Andersen.
- 243b. **Bembidium gilvipes** St. — Bemb. gilvipes Sturm, Deutschl. Ins. VI. p. 149. 81. t. 159. f. d. D.; Redtenbacher, Faun. austr. p. 74; Thomson, Skand. Coleopt. I. p. 205; Schaum, Naturg. Ins. Deutschl. I. Abth. I. B. p. 727. — Amager, 2 St., Løvendal.
261. **Omophron limbatum** Fabr. — Bredderne af Ravn Sø ved Ry, Aug. 1886, skarevis, Rosenkrantz.

Dytiscidæ.

Schiödte: Tillæg til Danmarks Karaber og Dytisker, Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 402—34.

Tillæg til Fortegnelsen over de i Danmark levende Dytisker, 7 B. p. 539.

1. **Haliplus elevatus** Panz. — Hornbækaa, ved Randers, Juli, 1 St., Jacobsen.
46. **Hydroporus parallelogrammus** Ahr. — Fanø, almindelig, Rosenkrantz.
57. **Agabus agilis** Fabr. — Utterslev Mose, i April og Mai, undertiden i stort Antal, Schlick.
59. **Agabus nebulosus** Schiö. — Fanø, skarevis, Rosenkrantz.
62. **Agabus fuscipennis** Payk. — Damhus Mosen, April 1868, i stort Antal, Schlick.
70. **Agabus guttatus** Payk. — Ry Skov, i en Skovbæk under Stene, almindelig, Rosenkrantz; Aarhus, Rosenkrantz og Holstebroe.

Gyrinidæ.

Siden Schiödtes Danmarks Eleutherata udkom 1841, er der ikke rørt ved Hvirvernes eller Gyrinernes lille Familie, uagtet der gjentagne Gange, naar Schiödte publicerede Fortegnelser over Karaber med Dytisker eller alene over Dytisker, var al Anledning til ogsaa at tage Gyrinerne med. Det er nu utvivlsomt, at Schiödte den Gang, han i sine Eleutherata bearbeidede denne Familie, indsnævrede Artsbegrebet mere eller, hvad der er det samme, antog flere Arter end de samtidige og senere Entomologer troede at kunne anerkjende. Schiödte selv har ikke paa Tryk udtaalt sig om dette Spørgsmaal, men her paa Museet findes en Sammenstilling af Gyrinerne, foretagen af Schiödte og etiketteret med hans egen Haand. Herefter viser det sig, at han ialtfald i de senere Aar har sluttet sig til Nutidens Opfattelse af Artsbegrebet indenfor denne Familie, og istedenfor 7 Arter Gyrini kun har antaget 4; og det bliver derfor nødvendigt for hver af de fire Arter her at opstille Synonym-Rækken.

1. **Gyrinus natator** Scop. — *Dytiscus natator* Scopoli, Entom. carn. p. 99. 299. *Gyrinus natator* Gyllenhal, Ins. suec. I. p. 141; Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 1. B. 2. H. p. 139. *Gyrinus mergus* Ahrens, N. Schr. Hall. Naturh. Ges. II. 2. p. 43. *Gyrinus cercurus* og *natator*, Danm. Eleuth. p. 564 og 65. — Meget almindelig, udbredt over største Delen af Landet, fra Kjøbenhavn til Fanø, Forf.
2. **Gyrinus bicolor** Payk. — *Gyrinus bicolor* Paykull, Faun. suec. I. p. 239; Gyllenhal, Ins. Svec. I. p. 142; Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 1. B. 2. H. p. 140. *Gyrinus celox* Schiödte, Danm. Eleuth. p. 565. — Især i rindende Vand, ikke ret almindelig.
3. **Gyrinus marinus** Gyll. — *Gyrinus marinus* Gyllenhal, Ins. Svec. I. p. 143; Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 1. B. 2. H. p. 142. *Gyrinus lembus*, *marinus* og *opus* Schiödte, Damm. Eleuth., p. 563—64. — Dette er vor almindeligste Hvirvler-Art, og udbredt over hele Landet, saaledes ogsaa i de vestjyske Aaer, Forf.
4. **Gyrinus minutus** Fabr. — *Gyrinus minutus* Fabricius, Entom. syst. suppl. p. 65; Syst. Eleuth. I. p. 276; Gyllenhal, Ins. Svec. I. p. 143; Schiödte, Danm. Eleuth. p. 566; Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 1. B. 2. H. p. 138. — Denne Art er langt sjeldnere end nogen af de foregaaende; forholdsvis hyppigst er den maaske taget lige i Nærheden af Kjøbenhavn, saaledes i Ladegaardsaaben, Schlick og Forf.
5. **Orectochilus villosus** Müll. — Foruden det gamle Findested ved den østlige Bredde af Fursoen, hvor den fremdeles, om ikke hvert Aar, saa dog som oftest endnu kan tages i Antal eller Mængde, er den taget ved Esrom Sø, i Aug. 1869, i Mængde, Schlick; under Stene ved Bredderne af Sorø Sø, ofte i Mængde, Past. Jacobsen. Desuden er den ketset i nogle vestjyske Aaer, Thim- og navnlig Storaaen, i Nærheden af dennes Udløb i Nissumfjord; den sad her under de steile Brinker skjult af Vandplanterne; ogsaa i Nærheden af Storaaen, i en Mudderpol, fandtes et Par Stykker, Juni—Juli 1852, Forf.

Hydrophilidæ.

Schiödte: Fortegnelse over de i Danmark levende Hydrophili, Nat. Tidsskr. 3. R. 7. B. p. 523—30.

2. ***Helophorus tuberculatus*** Gyll. — Sigtegods fra Randers, 1 St., Løvendal.
6. ***Helophorus arvernicus*** Muls. — Sigtegods fra Gudenaas ved Randers, samt ved Dronninglund, Juni, Løvendal.
16. ***Ochthebius bicolon*** Germ. — Fanø, Juli, Budde-Lund.
17. ***Ochthebius rufomarginatus*** Er. — Damhus Mosen og Kagsmose, sightet i Marts og April, enkeltvis eller i ringe Antal, Løvendal og Schlick; i Jylland ved Nørre Sø, Randers, og ved Aarhus, enkeltvis, Schlick.
- 26^a. ***Limnebius nitidus*** Marsh. — *Hydrophilus nitidus* Marsham, Entom. Brit. p. 407. *Limnebius nitidus* Mulsant, Coleopt. Franc. Palpic. p. 94; Gerhardt, Berl. Entom. Zeitschr. X. 1866 p. 402. — Kjøbenhavns Omegn, et enkelt Stykke, Han, Schlick. — Hr. Schlicks Samling.
- 28^a. ***Laccobius nigriceps*** Thoms. — *Laccobius nigriiceps* Thomson, Øfv. Vet. Akad. Förh. 1853 p. 50; Skand. Coleopt. II. p. 93. — *Lacc. nigric.* er fra gammel Tid sammenblandet med *Lacc. minutus*, og saaledes er der ogsaa paa Museet Stykker af denne Art tagne af Prof. Schiödte. Conserv. Løvendal har først udskilt den og bestemt den. — Hvor almindelig denne Art er, er vanskeligt at sige, dog synes den at være ikke videre sjeldent og temmelig udbredt; paa Museet haves der Exemplarer fra Amager, Schiödte; Hareskovene og Donse, April, Løvendal; Sorø, Forf.; Falster, Schiödte.
34. ***Hydrobius oblongus*** Hrbst. — (Udgaaer, som indkommen i Faunaen ved en Feiltagelse.) *H. Dol.*
- 37^a. ***Hydrobius globulus*** Ksw. — *Anacæna globulus* Kiesenwetter, Deutsch. Entom. Zeitschr. IX. 1875 p. 230. — Kiesenwetter er den første, som har udskilt denne Art, som hidtil og saaledes ogsaa i Schiödttes Fortegnelse, 1871, var optaget i den collective Art, *Hydr. limbatus*. Iøvrigt forekommer det mig, at der ikke var Grund for Kiesenwetter til just at betragte Paykulls og Thomsons *Hydrophilus* (*Anacæna*) *globulus* som Type for den nye Art, thi Thomsons *An. glo-*

bulus er liig med og ialtfald ligesaa collectiv som Erichsons eller Schiödtes *Hydrobius limbatus*, omend Thomson (dog først i sine Opuscula) af sin gamle *An. globulus* har udskilt en ny Art, *An. carinata*. — Arten er vistnok temmelig udbredt, omend ikke saa almindelig som *Hydr. limbatus*, og træffes fortrinsvis i Skovbække eller kolde Vande, saasom ved Lethraborg, April til Mai, Løvendal; Echodalen paa Bornholm, Schlick; men ogsaa nær Kjøbenhavn ved Fuglevad, October, og Stråndmølleaaen, Løvendal; Lolland, Bergsøe; Fruens Bøge ved Odense, Jørgensen.

**Silphidæ, Scaphidiidæ, Trichopterygidæ,
Scydmænidæ og Pselaphidæ.**

Schiödte: Fortegnelse over de i Danmark levende Silpher, Scaphidier, Ptilier, Scydmæner og Pselapher, Nat. Tidsskr. 3. R. 7. B. p. 187 til 216.

Silphidæ.

1. **Necrophorus germanicus** Fabr. — Selchousdal ved Tiissø, 2 St., Hammeleff.
3. **Necrophorus sepultor** Charp. — Tebbestrup Sandmarker, ved udlagt Aadsel, Aug.—Sept., Jacobsen.
6. **Necrophorus interruptus** Steph. — Sammesteds, Jacobsen.
21. **Sphaerites glabratus** Fabr. — Greisdalen ved Veile, Jørgensen; Buderuplund og Hobro, paa Bøgestubbe med gjærende Saft, Mai—Juni, enkeltvis, Johansen og Asmussen; Aalborg, Johansen.
- 21a. **Hydnobius punctatus** St. — Hun: *Anisotoma punctatum* Sturm, Deutschl. Ins. II. p. 42. t. 25. f. a. A. Hun og Han: *Hydnobius punctatus* Schmidt, Germ. Zeitschr. f. d. Entom. III. p. 196; Erichson, Naturg. Ins. Deutschl. III. p. 48; Thomson, Skand. Coleopt. IV. p. 27. — Dronninglund, September, 2 St., Løvendal.
- 21b. **Hydnobius punctatissimus** Steph. — *Leiodes punctatissimus* Stephens, Ill. Brit. Entom. Mand. II. p. 172. t. 15. f. 3. *Hydnobius punctatissimus* Erichson, Naturg. Ins. Deutschl. III. p. 47. *Hydnobius tarsalis* Schmidt, Germ. Zeitschr. f.

- d. Entom. III. p. 194. — S. f. Aalborg, paa en Lyngbakke i en Sandgrav, 1 St., en Hun, Johansen.
25. **Agathidium nigripenne** Kug. — Tommerup i Fyen, i en Træstub, Mai, Jørgensen; Buderuplund, paa en Bøgestub, sammen med *Sphærites glabratus*, Johansen.
26. **Agathidium silesiacum** Kraatz. — Lundby Bakker, S. f. Aalborg, Aug., Johansen.
- 27a. **Anisotoma furvum** Er. — *Anis. furva* Erichson, Naturg. Ins. Deutschl. III. p. 64; Thomson, Skand. Coleopt. IV. p. 40. — Dronninglund Bakker, ketset, 18. Sept. 1871, et Par Stykker, Løvendal.
58. **Colon serripes** Sahlb. — Aalborg, Johansen.
70. **Choleva angustata** Kraatz. — Vendsyssel, Johansen.
71. **Choleva intermedia** Kraatz. — Sundby Hedebakke, ved Aalborg, Johansen.
75. **Choleva Wilkinii** Spence. — Marienlund ved Odense, i Skovbunden, Sept., Jørgensen; Sigtegods fra Viby Krat, Marts, Løvendal.
- 82a. **Choleva alpina** Gyll. — *Catops alpinus* Gyllenhal, Ins. Svec. IV. p. 312. *Sciodrepa alpina* Thomson, Skand. Coleopt. IV. p. 67. *Choleva subfusca* Kellner, Stett. entom. Zeit. 1846, p. 177. — Odense, paa Aadsel, Mai 1886, 3 St., Toldass. Hansen. — Hr. Jørgensens Samling.
83. **Choleva grandicollis** Er. — Odense, paa Aadsel, Mai, en halv Snæ, Toldass. Hansen.

Scaphidiidæ.

1. **Scaphidium quadrimaculatum** Oliv. — Skovene ved Brahetrolleborg og Gjerpup ved Faaborg, i Stubbe og Svampe, Mai, Jørgensen; Lindum Skov S. f. Hobro, Asmussen; Rosenholm Skov ved Randers, Rosenkrantz; Styding V. f. Haderslev og Kollund Skov N. f. Flensborg, Mai, L. Andersen.
- 2a. **Scaphisoma boleti** Panz. — *Scaphidium boleti* Panz, Faun. Germ. p. 12. *Scaphisoma boleti* Erichson, Naturg. Ins. Deutschl. III. p. 9. — Arten er vistnok overseet paa Grund af sin Lighed med Slægtens to andre danske Arter, men synes hverken at være stedegen eller sjeldent. Gamle Finde-

steder for den nye Art er Maribo og Møen, Schiödte; i de senere Aar er den blandt andre Steder taget ved Lethborg, Næsbyholm, Aalholm og Orehoved, i hule Træer og under store Hjortetaksvampe, Mai—Juni, Løvendal.

Scydmænidæ og Pselaphidæ.

Af disse to Familier er der tilkommet ikke saa lidt i de senere Aar, saaledes blandt andre en ny Scydmæn og fire nye Pselapher, men da der her trænges til en ny Revision af vore Arter, vil det være bedre, at Tilkæget til de gamle Fortegnelser over disse Dyr opstættes noget; men forhaabentligt vil det kunde gives i Forbindelse med den Fortegnelse over forskjellige smaa kollehornede Biller, som er under Arbeide.

Histeridæ.

Schiödte: Fortegnelse over de i Danmark levende Histri,
Nat. Tidsskr. 3. R. 7. B. p. 531—38.

2. **Hister quadrinotatus** Scriba. — Isted Hede, N. f. Slesvig, Mai 1882, 2 St., L. Andersen.
8. **Hister fimetarius** Hrbst. — Froslev, N. f. Flensborg, i Hestegjødning, Mai 1882, 2 St., L. Andersen.
20. **Carcinops pumilio** Er. — Bageri paa Nørrebro, i gjærende Brødeig, Imagines og Larver i hundredvis, Schlick og Koch.
30. **Saprinus conjungens** Payk. — Tranum Strand i Vendsyssel, Johansen.
39. **Ontophilus sulcatus** Fabr. — Randers, i en Kompostdynge, Foraar og Efteraar, i Antal, Jacobsen; Husum, i Gjødning, Juli, L. Andersen.
40. **Ontophilus striatus** Fabr. — Merrits Skov, i Gjødning-svamp, Juli, Christianssæde, ketset, Schlick.
42. **Abræus granulum** Er. — Dyrehaven, i fugtigt, bladet og trosket Bøgetræ sammen med Abr. globosus og særdeles mange Plegaderus dissectus, September, Schlick.

Lamellicornia.

Schiödte: Fortegnelse over de i Danmark levende Scarabæer, Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 435 til 56.

8. **Euchlora Frischii** Fabr. — Fanø, sværmende i Skarer paa Marehalm, Juli 1885, Rosenkrantz.
9. **Hoplia farinosa** L. — Fra den 1—6. Juli 1882 viste den sig i stor Mængde paa den Eng, der strækker sig langs Guldborg Sund udenfor Roden Skov, kaldet Rodenfed, omrent ligeoverfor Flato. Dyrne kom frem i den tidlige Morgenstund; og i Solskinnet fløi saavel Hanner som Hunner omkring fremragende Gjenstande, saasom Landmaalerstokke, hvor der ofte kunde sees en 6—7 Stykker paa en gang sværmende rundt og fra og til, ofte ogsaa flyvende lige paa Mennesker; mellem Kl. 8 og 9 iagttoget de ofte i Parring, hængende paa høje Græsstraa. Hannerne vare tilstede i meget større Antal end Hunnerne, omrent som 4 : 1. Kl. 9 ophørte Dyrne med deres Sværmen, og efter meget kort Tids Forløb var der ikke et eneste Dyr at see. De to følgende Aar søgtes den forgjæves fra sidst i Juni til ind i Juli, saa ofte Leilighed gaves, paa samme Tid om Morgen, Engelhardt; Fanø, sværmende paa en Eng mellem Klitterne, 1 St., Rosenkrantz; N. f. Husum, paa Tidsler, Juli 1883, 7 St., L. Andersen.
10. **Cetonia marmorata** Fabr. — Bognæs, en stor Del Puppecoconer, sammenslæbte i en hul Bøg, Løvendal.
13. **Valgus hemipterus** Linn. — Christianssæde, Juni, 1 Hun, samt Tranekær paa Langeland, paa Hvidtjørn, Juni—Juli, mange Hanner, Schlick.
15. **Gnorimus variabilis** Linn. — Vinstrup Overdrev ved Fuglebjerg, i Eg og El, tildels klækket en større Række, Løvendal og Schlick.
16. **Osmoderma eremita** Linn. — Bognæs, August, med Larver i Antal, Løvendal, Fabritius, Koch og Bachevold; Præstø, Holstebroe; Bremersvold, Løvendal.

23. **Odontæus mobilicornis** Fabr. — Falconeralleen ved Kjøbenhavn, 1 St. fløjet ind ad Vinduet, Juni, Løvendal; Fortunen, Cand. Meldahl; Gribskov, en Hun, Cand. Vedel; ved Vordingborg, en Hun; Knuthenborg, 1 St., Skovgaard; Rugballegaard i Greisdalen, fanget om Aftenen i Flugten, Fabritius.
30. **Copris lunaris** Linn. — Skanderborg, af og til almindelig, Rosenkrantz.
37. **Aphodius fœtens** Fabr. — Kjøbenhavns Omegn, 1 St., Dohlmann.
41. **Aphodius putridus** St. — Klitter ved Blokhus, i Faare-gjødning, Mai 83, 2 St., Johansen.
45. **Aphodius immundus** Creutz. — Bognæs, i Hestegjødning, Juni, en Række, Løvendal.
47. **Aphodius niger** Panz. — Artens Forekomst her i Landet er tvivlsom.
52. **Aphodius pictus** St. — Tebstrup ved Randers, Sandmark i Kogjødning, Sept., Jacobsen og Løvendal; Robild Bakker ved Skørping Stat., Juni 82, enkeltvis, Johansen.
54. **Aphodius porcus** Fabr. — Dyrehaven ved Kjøbenhavn, flere Gange i Sept., Løvendal; Ottestrup i Nordfyen, Holstebroe; Tebstrup, Sandmark i Kogjødning, Jacobsen; Agdrup Bakker og Lundby Bakker ved Aalborg, Sept., enkeltvis, Johansen.
69. **Heptaulacus villosus** Gyll. — Tidsvilde Overdrev, i Sandgrotter, Juni—Juli, i Mængde, Schlick.
70. **Plagionus arenarius** Oliv. — Aalborg, paa høi Sand- og Grusbund, især i Menneskeexcremente, April—Mai, Johansen.
72. **Ammœcius brevis** Er. — Læsø, Cand. Jørgensen.
73. **Psammodius sulcicollis** Illig. — Flere Steder i Vend-syssels Klitter, saaledes ved Skagen, Løkken, Blokhus, ogsaa i Sandgrave N. og S. for Aalborg, Mai—Juni, Johansen.
- 73a. **Psammodius vulneratus** St. — Aphodius vulneratus Sturm, Deutschl. Ins. I. p. 175. t. 15. f. D. Psammodius vulneratus Gyllenhal, Ins. Svec. IV. p. 244; Erichson, Ins. Deutschl. III. p. 914; Thomson, Skand. Ccleopt. V. p. 71.
Entom. Medd. H. 2.

- Hvorup ved Nørre-Sundby, sammen med *Ps. sulcicollis*, i større Antal, Asmussen.
74. **Ægialia sabuleti** Payk. — Vendsyssels Sandegne og Klitter, Mai—Juni, ikke sjeldent, Johansen.
- 76a. **Trox hispidus** Laich. — *Trox hispidus* Laicharting, Tyrol. Ins. I. p. 30; Fabricius, Syst. Eleuth. I. p. 110; Sturm, Deutschl. Ins. III. p. 148; Mulsant, Lam. p. 330; Erichson, Naturg. Ins. Deutschl. III. p. 928; Thomson, Skand. Coleopt. V. p. 76. *Trox arenosus* Gyllenhal, Ins. Svec. I. p. 11. — Fanø, ved Stranden, Juni, i Antal, Fabritius og Budde-Lund.
78. **Lucanus cervus** Linn. — Bornholm, Juli, Dr. H. J. Hansen; Balskov ved Odder, Rosenkrantz og Holstebroe; Haderslev, ved Erløv S. f. Byen og ved Mangstrup V. f. samme, L. Andersen.

Buprestidæ og Elateridæ.

Schiödte: Danmarks Buprestes og Elateres, Nat. Tidskrift, 3. R. 3. B. p. 441—568.

Tillæg til Danmarks Cerambyces, Buprestes og Elateres, ibid. 5. B. p. 543—44.

Buprestidæ.

3. **Melanophila cyanea** Fabr. — Kjøbenhavn, Tømmerpladse paa Fyr, August, en Række, Løvendal.
4. **Melanophila appendiculata** Fabr. — Kjøbenhavn, sammested, August, Løvendal og Asmussen.
13. **Agrilus laticornis** Illig. — Svenstrup ved Borup, paa Eg, Juli, i større Mængde, Løvendal.
15. **Trachys minuta** Linn. — Ornedalen ved Hobro, paa blomstrende *Salix cinerea*, Juni 86, 2 St., Johansen.

Elateridæ.

1. **Melasis buprestoides** Linn. — Hald Nørreskov, under Egebark, Juli, et levende Stykke, Koch.

2. **Xylobius alni** Fabr. — Frijsenborg, et Par døde, defecte Stykker, Løvendal.
3. **Eucnemis capucinus** Ahr. — Christianshavn, 1 St., Løvendal.
4. **Microrhagus pygmæus** Fabr. — Bornholm, Dr. H. J. Hansen; Roden Skov paa Lolland, Juni—Juli, et Par Stykker, samt Laurberg, Juni, i større Antal, Løvendal og Engelhart; Lundby Krat, ketset 2 Stykker, Johansen.
6. **Throscus obtusus** Curt. — Redsle Skov paa Falster, ketset paa Stranden, Slutningen af Mai, 1 St., Løvendal; Orehoved, Koch.
8. **Cardiophorus asellus** Er. — Lindum Skov S. for Hobro, samt Klitter ved Blokhus, Johansen.
10. **Cryptohypnus sabulicola** Bohem. — Vemmetofte Strand, Juni, 1 St., Cand. Jørgensen.
21. **Agriotes pallidulus** Illig. — Svenstrup ved Borup Stat., Juni, i Mængde, Løvendal.
28. **Ampedus sanguineus** Schiö. — Skanderborg og Silkeborg, almindelig, Rosenkrantz.
31. **Ampedus cardinalis** Schiö. — Dyrehaven, i Eg, samt Bognæs, Løvendal.
40. **Ludius ferrugineus** Linn. — Klækket af Eg fra Bognæs, Bremersvold og Christianssæde, Larven ogsaa truffet i Bøg ved Næsbyholm, Løvendal.
41. **Ischnodes sanguinicollis** Panz. — Bognæs, i Bøg, Juni, klækket af Bøg fra Thureby, Løvendal.
44. **Hypolithus riparius** Fabr. — Hobro, nogle Stykker, samt ved Skanderborg Sø, en større Række, Rosenkrantz; Buderupholm, i en Bladdynge ved en Vandgrøft, Mai, en Række, Johansen.
55. **Diacanthus metallicus** Payk. — Bremersvold Kjeldskov, Juni, Løvendal; Lindum Skov ved Hobro, Forf.
59. **Athous mutilatus** Rosenk. — Dyrehaven, Juli, en Række, Løvendal.
61. **Athous rhombaeus** Oliv. — Klækket af Træ fra Bremersvold, samt Bognæs, et større Antal Larver, Løvendal.

66. **Campylus denticollis** Fabr. — Marselisborg Skov, 1 St., Rosenkrantz; Frijsenborg, Juni, 1 St., Løvendal.

Malacodermata, Cleridæ, Ptinidæ og Anobiidæ.

Schiödte: Fortegnelse over de i Danmark levende Malacodermi, Cleri, Ptini og Anobia, Nat. Tidsskr., 3. R. 8. B. p. 1—22.

Malacodermata.

3. **Helodes marginata** Fabr. — Aarhus, af og til almindelig, Rosenkrantz.
12. **Prionocypphon serricornis** Ph. Müll. — Rosenholm, 1 St., Rosenkrantz.
17. **Dictyopterus Cosnardi** Guér. — Thureby, i en gammel Bøg, Juni, Løvendal og Fabritius.
21. **Podabrus alpinus** Payk. — Thureby, Juni, talrig, Løvendal; Aarhus, ikke sjeldent, Rosenkrantz; Hobro, paa Egebuske, Juni 86, i Mængde, Johansen
22. **Telephorus violaceus** Payk. — Thureby, Juni, flere Stykker, Løvendal; Hesberg og Tommerup i Fyen, af og til paa blomstrende Hvidtjørn, Jørgensen; Aarhus, ikke sjeldent, Rosenkrantz.
- 22a. **Telephorus oculatus** Gebler — Cantharis oculata Gebler, Mém. d. Moscou V. p. 316; Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutsch. IV. p. 476. — Veile, Edv. Løvendal.
30. **Telephorus sudeticus** Letzn. — Voergaard i Vendsyssel, Juni, Løvendal.
- 34a. **Telephorus pilosus** Payk. — Cantharis pilosa Paykull, Faun. Svec. I. p. 264; Gyllenhal, Faun. Svec. I. p. 354; Thomson, Skand. Coleopt. VI. p. 187; Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. IV. p. 497. — Greisdalen, Juni 1879, 2 St., Jørgensen.
61. **Drilus concolor** Oliv. — Boserup, Fabritius; Roskilde, en Larve, Adj. Traustedt.
65. **Malachius marginellus** Oliv. — Læsø, Juli, Dr. H. J. Hansen; Klitter ved Blokhus, Juni—Juli, Johansen.

73. **Dasytes obscurus** Gyll. — Svenstrup, Juni, Løvendal.
75. **Dolichosoma lineare** Rossi — Hornbæk i Sjælland, paa Klitgræs, mange, Johansen; Veile-Sande, nogle Mil V. f. Veile, Fabritius; Blokhus, i Klitterne paa Blomster af Hieraceum, Juli, Budde-Lund; Agdrup Bakker i Vendssyssel, Johansen.
- 76a. **Julistus floralis** Oliv. — Melyris floralis Olivier, Encycl. méth. V. p. 657. Dasytes floralis Gyllenhal, Ins. Svec. I. p. 326. Julistus floralis Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. IV. p. 646. Trichoceble floralis Thomson, Skand. Coleopt. VI. p. 156. — Svenstrup, nedbantet af Eg, d. 21. Juli 1881, Løvendal.
77. **Phloeophilus Edwardsii** Steph. — Dronningborg Skov, under Mos paa gamle Træer, April, enkeltvis, Johansen.

Cleridæ.

- 81a. **Clerus rufipes** Brahm. — Clerus rufipes Brahm, Hoppe Taschenb. 1797 p. 136; Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. IV. p. 685. Maaskee kun en Varietet af Cl. formicarius. — Kjøbenhavn, paa en Tømmerplads, d. 11. Sept. 1881, Løvendal. — Hr. Løvendals Samling.
85. **Necrobia ruficollis** Fabr. — Kjøbenhavn, i et Garveri, skarevis, Løvendal.
86. **Necrobia rufipes** Fabr. — Sammesteds, i Antal, Løvendal; Aarhus, Palmeoliefabriken, flokkevis, Rosenkrantz.

Ptinidæ.

- 89a. **Ptinus bicinctus** St. — Ptinus bicinctus Sturm, Deutschl. Ins. XII. p. 56. t. 251. f. C. Vistnok hidtil sammenblandet med nærstaende Arter, navnlig vel med Pt. rufipes; den har viist sig at være udbredt og er taget af forskjellige baade ældre og nyere Samlere. — Dyrehaven, Mai, Thureby, Juni, Løvendal; Antvorskov, Forf.; Falster og Lolland, Schiödte; Bornholm, Bergsøe; Veile, Fabritius; Aarhus, Marselisborg Tærskelade, almindelig om Efteraaret, Rosenkrantz.
95. **Niptus hololeucus** Falderm. — Aarhus, i Tobak, 1885,

skarevis, Skafføgaard (angreb 1885 Stovler, Seletøi, Silke-stoffer) i uhyre Mængde, Rosenkrantz; Aalborg, i et Bageri, mange, Johansen.

97. **Mezium sulcatum** Fabr. — Kjøbenhavn, Zoologisk Museum, i gamle Skeletter, en lille Række, Løvendal.

Anobiidæ.

99. **Lymexylon navale** Linn. — Svenstrup, paa Eg, Juli 1880, i Antal, samt Bremersvold, i en angreben Egestamme, Løvendal.
110. **Xestobium plumbeum** Illig. — Svenstrup, Løvendal.
112. **Liozoum abietis** Fabr. — Ravnsnæsskov ved Hørsholm, klækket af Grankogler, Octbr.—Novbr., i Mængde, Løvendal.
116. **Trypopitys carpini** Hrbst. — Kjøbenhavn, Juli og Aug., Løvendal.
117. **Xyletinus ater** Payk. — Marselisborg Skov, ketset, 1885, 1 St., Rosenkrantz.
- 118a. **Dorcatoma serra** Panz. — Dermestes serra Panzer, Faun. Germ. fasc. 26. f. 10 Dorcatoma serra Mulsant et Rey, Téréd. p. 349. t. X. f. 10; Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. V. p. 159. — Dyrehaven, Eg, Juli, Løvendal.
119. **Dorcatoma chrysomelinum** St. — Lindum Skov S. f. Hobro, klækket af Larver i en trøsket Egestamme, sammen med Imagines af Amblystoma rubens, Johansen og Jacobsen.
- 119a. **Dorcatoma flavicorne** Fabr. — Bruchus flavicornis Fabricius, Syst. Eleuth. II. p. 401. Dorcatoma flavicorne Sturm, Deutschl. Ins. XII. p. 10. t. 245. f. a. A.; Thomson, Skand. Coleopt. V. p. 172; Mulsant et Rey, Téréd. p. 363. — Dyrehaven af Eg, Juni—Juli, Løvendal.
120. **Enneatoma bovistæ** Ent. Heft. — Gjedserodde, i Bovister, Aug. 1877, i stort Antal, Koch; Roden Skov, Engelhart.
121. **Amblystoma rubens** Ent. Heft. — Lindum Skov, trøsket Egestamme, Juni, i stort Antal sammen med Dore. chrys., Johansen og Jacobsen.
122. **Cathorama tabaci** Fabr. — Engestofte paa Lolland,

mellem Nudler, samt Aarhus, Palmeoliefabriken, enkeltvis, Rosenkrantz.

125. ***Bostrychus capucinus*** Linn. — Kjøbenhavn, klækket af Laurbærstokke, Løvendal.
- 126a. ***Rhizopertha pusilla*** Fabr. — *Sinodendron pusillum* Fabricius, Entom. syst. suppl. p. 156. *Rhizopertha pusilla* Stephens, Ill. Brit. Entom. III. p. 354. Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. V. p. 41. — Kjøbenhavn, i en Rismølle, i stort Antal, Løvendal.
128. ***Lyctus brunneus*** Steph. — *Xylotrogus brunneus* Stephens, Ill. Brit. Entom. III. p. 117. t. 18. f. 4. *Lyctus brunneus* Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. V. p. 17. — Kjøbenhavn, fremkommen af forskjellige Sorter Træ, navnlig Vinranker og Myrther, til forskjellig Aarstid, i stor Mængde, Løvendal.
129. ***Lyctus impressus*** Com. — *Lyctus impressus* Comolli, Coleopt. nov. Novoc. p. 40; Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. V. p. 17. — Kjøbenhavn, af Vinranker, i langt ringere Antal end foregaaende Art, Løvendal.

Coleoptera heteromera.

Schiödte: Fortegnelse over de i Danmark levende heteromere Eleutherater, Nat. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 23—46.

Tillæg til Fortegnelsen over de i Danmark levende heteromere Eleutherater, ibid. 13. B. p. 474.

Tenebrionidæ.

1. ***Blaps mortisaga*** Linn. — Randers, i en Bagerkjælder, Aug. 1881, i Mængde, Jacobsen.
4. ***Heliopathes gibbus*** Fabr. — Fanø, ikke sjeldent, Rosenkrantz; Hjærpsted Strand N. f. Høyer, Aug., L. Andersen.
6. ***Microzoum tibiale*** Fabr. — Aalborg, flokkevis i Sandegnene, Johansen.
7. ***Phaleria cadaverina*** Fabr. — Tidsvilde Strand, under

Tang, Juni—Juli 1886, i stort Antal, Schlick og Engelhart; Tranum Strand i Vendsyssel ved Vesterhavet, nedgravede under Tang, 6 St., Johansen.

8. **Bolitophagus reticulatus** Linn. — Skørping Skov, Fyrsvamp, Juni, Johansen.
9. **Bolitophagus armatus** Panz. — Søholt paa Lolland, klækket i Mængde af Svamp fra en hul Bøg, Schlick.
13. **Platydema violaceum** Fabr. — Bremersvold, under Mos paa Naur, Holstebroe; Sødringholm ved Randers, Rosenkrantz.
- 15a. **Pentaphyllus testaceus** Fabr. — Brede, i en gammel Eg, i Mængde, Schlick og Løvendal; Dyrehaven, klækket af Eg, Løvendal.
16. **Upis cerambooides** Linn. — Kjøbenhavn, 1 St., Løvendal.
- 16b. **Gnathocerus cornutus** Fabr. — Kjøbenhavn, i Bagerier, Juli 86, i stort Antal, Schlick.
18. **Palorus depressus** Fabr. — Aarhus, Palmeoliefabriken, almindelig, Rosenkrantz; Aalborg, i et Bageri, Johansen.
- 18a. **Latheticus oryzae** Waterh. — Lath. oryzæ Waterhouse, Ann. nat. hist. ser. 5. vol. IV (1880) p. 147. — Kjøbenhavn, i en Dampmølle, Sept., samt i Risoplag, Octob., i Antal, Løvendal og Fabritius.
19. **Hypophlœus castaneus** Fabr. — Skørping Skov, sædvanlig i Stubbe af Bøg, men ogsaa i Gran, i Mængde, Johansen.
20. **Hypophlœus bicolor** Oliv. — Udgaaer indtil videre af Faunaen, og det opførte Findested henføres til Hyp. fasciatus Fabr.
23. **Alphitobius diaperinus** Panz. — Aarhus, Palmeoliefabriken, almindelig, Rosenkrantz.
24. **Alphitobius piceus** Oliv. — Sammesteds, almindelig, Rosenkrantz.
- | 27. **Tenebrio opacus** Duft. — Vinstrup Overdrev ved Fuglebjerg, samt Lolland, i gamle Ege, Løvendal.
- 29b. **Allecula Lövendalii** Reitt. — All. Lövendalii Reitter, Wien. entom. Zeit. 1886. p. 140. — Den af Schiödte udtalte Tivl om, at den af ham som Allecula Rhenana

Bach betegnede Art var sikkert bestemt, har viist sig at være vel begrundet, idet Arten af Reitter er erkjendt og opstillet som ny og benævnt efter Finderen her i Landet, Conserv. Løvendal, jfr. Nat. Tidsskr. 3. R. 13. B. p. 474.

31. **Mycetocharis axillaris** Payk. — Frederiksdal, af Bøg, Juni, samt Lorup Overdrev, i et hult Æbletræ, Løvendal.

Cistelidæ.

37. **Cteniopus sulphureus** Linn. — Vosnedgaard Skov ved Aarhusbugten, enkeltvis, Rosenkrantz.

Salpingidæ.

- 39a. **Salpingus mutilatus** Bech — Salp. mutilatus Bech, Beitr. bayr. Ins. 1817 p. 19. t. 5. f. 27. Salpingus virescens Mulsant et Rey, Rostrif. p. 14. — En overseet Art, funden saavel i Nordsjælland som paa Lolland; af specielle Localiteter kan jeg anføre Dyrehaven, Schlick; Ravnsnæs Skov ved Hørsholm samt Boserup, Løvendal; Maglemer Havløkke, Schlick; Christianssæde, Løvendal.
 40. **Salpingus foveolatus** Ljungh — Strandveien, Dr. Münster og Fabritius.
 45. **Rhinosimus viridipennis** Latr. — Nysted Mark, Roden og Freilev Skov paa Risgjærder, jævnlig, men i ringe Antal, Engelhart.

Melandryidæ.

- 46a. **Tetratoma Desmarestii** Latr. — Charlottenlund, paa Eg, Sept. og Octob., enkeltvis, Schlick.
 47. **Tetratoma ancora** Fabr. — Roden og Freilev Skove, paa Risgjærder, Juli og Sept., en lille Række, Løvendal og Engelhart; Bremersvold Kjeldskov, sigtet under Mos, Juli, Engelhart; Tørning Skov, 1 Mil V. for Haderslev, L. Andersen.
 48. **Orchesia micans** Illig. — Agdrup Krat, klækket af Svamp paa Ellestubbe, Johansen.
 49. **Orchesia sepicola** Rosenh. — Suserup Skov, paa Eg,

- Løvendal og Cand. Jørgensen; Roden og Freilev Skove, paa Risgjærder, Juni og Sept., i stort Antal, Løvendal.
50. **Orchesia fasciata** Payk. — Roden Skov, paa Risgjærder, Sept., 1 St., Løvendal; Treldeskov, paa en Egestamme, Juli, Fabritius; Hald Nørreskov, under Egebark, Juli, Koch.
51. **Hallomenus humeralis** Hellen. — Aalborg, paa Svampe, et Par Stykker, Johansen; Eisbøl ved Haderslev, i Træsvampe, Mai, L. Andersen.
53. **Anisoxya fuscula** Illig. — Roden og Freilev Skove, paa Risgjærder, Løvendal.
54. **Abdera affinis** Payk. — Agdrup Krat i Vendsyssel, klækket af Swamp paa Ellestubbe, Johansen.
55. **Abdera flexuosa** Payk. — Agdrup Krat, sammen med den foregaaende, Johansen.
56. **Hypulus quercinus** Quens. — Christianssæde Skove, Mai, i større Antal, Schlick og Løvendal; Lindum Skov, i Eg, nogle Stykker, Asmussen.
59. **Melandrya canaliculata** Fabr. — Bremersvold Kjeldskov, paa Avnbøg og Eg, i større Antal, samt Christianssæde og Roden Skove, Juni, Løvendal og Engelhart.
60. **Conopalpus testaceus** Oliv. — Lindum Skov ved Hobro, Juni, og Sæbygaard Skov, Juli, Forf.

Pedilidæ.

64. **Xylophilus oculatus** Payk. — Drewsens Klækkehus, af Eg, Juli 73, i stort Antal, Løvendal.

Anthicidæ.

67. **Anthicus humilis** Germ. — Husum, Juli, L. Andersen.
69. **Anthicus bimaculatus** Illig. — Klitterne ved Lønstrup, Juni, faa Stykker, Johansen.
72. **Anthicus bifasciatus** Rossi — Amager, Sept., i Antal, Schlick; Stranden ved Kjøge, Sept. 83, Johansen.
76. **Anthicus ater** Panz. — Stranden ved Kjøge, sammen med foregaaende Art, Johansen.

Pyrochroidæ.

79. **Pyrochroa pectinicornis** Linn. — Thureby, paa Stubbe, efterhaanden en større Række, Løvendal; sammested, Mai, Schlick; Hals Nørreskov, paa en Ellestub, Juni 86, 1 St., Johansen.

Mordellidæ.

80. **Tomoxia bucephala** Cost. — Skørping Skov, paa Bøgestubbe, Johansen.
81. **Mordella aculeata** Linn. — Rosenholm Skov, ikke sjeldent, Rosenkrantz; i Skoven paa Øland, paa Ranunkler, Larven i Birkestubbe, Juni 86, Johansen.
- 88a. **Anaspis ruficollis** Fabr. — Mordella ruficollis Fabricius, Syst. Eleuth. II. p. 126. Anaspis ruficollis Mulsant, Longip. p. 412. — Bremersvold, Juni 86, en lille Række, Engelhart.
91. **Anaspis maculata** Fourer. — Flødstrup Præstegaard, i Spiræablomster, Juli, i talrige Skarer, Forf.; Tranekjær, paa Blomster, Juni, i stor Mængde, Schlick.

Rhipiphoridæ.

- 91a. **Metœcus paradoxus** Linn. — Mordella paradoxa Linné, Faun. Svec. ed. II. p. 228. Rhipiphorus paradoxus Fabricius, Syst. Eleuth. II. p. 119; Gyllenhal, Ins. Svec. II. p. 619. Metœcus paradoxus Redtenbacher, Faun. austr. ed. II. p. 649; Mulsant, Longip. p. 453; Thomson, Skand. Coleopt. VI. p. 347. — Af denne for vor Fauna nye Slægtsgruppe eller Familie er et enkelt Stykke, en Hun, fundet ihjeltraadt og noget beskadiget paa Strandveien i Taarbæk By, Sept. 81, Engelhart; Exemplaret blev velvilligt skjænket Museet.

Meloidæ.

94. **Meloë brevicollis** Panz. — Aalborg, i hvis Omegn den synes at være den hyppigste Meloë-Art, Johansen.

95. **Meloë variegatus** Donov. — Rødby Mark, Bøgh; Feldballe ved Kaløvig, samt Randers og Samsø, enkeltvis, Rosenkrantz; Viuf, 17. Mai 87, 3 St., Terp.

Œdemeridæ.

97. **Nacerdes melanura** Linn. — Aarhus, Havnemoloen, flokkevis, Rosenkrantz; Aalborg, hyppig i Egetømmeret i Bindingsværksbygninger, sværmende i Juli Maaned jævnligt paa Gaderne, Johansen.
102. **Œdemera croceicollis** Gyll. — Lyngby Sø, paa Blomster, Juni-Juli, enkeltvis, Engelhart og Koch.

Cerambycidæ.

Schiödte: Danmarks Cerambyces, Nat. Tidsskr. 3. R. 2. B. p. 483—576.

Tillæg til Danmarks Cerambyces, Buprestes og Elateres, ibid. 5. B. p. 543—44.

1. **Spondylis buprestoides** Linn. — Aabenraa i Slesvig, paa Tømmerpladsen, Juli, en Snæ Stykker, L. Andersen.
5. **Criocephalum rusticum** Linn. — Hüttenbjergene, L. Andersen.
6. **Criocephalum epibata** Schiö. — Kjøbenhavn, Juli, Løvendal; Odense, Jørgensen.
11. **Clytus liciatus** Linn. — Pindstrup Skov, paa Bøgestubbe, Juni 86, 4 St., Jacobsen.
16. **Gracilia minuta** Fabr. — Haderslev, flere Steder temmelig almindelig i Aarene 1876—78, senere kun enkeltvis, L. Andersen.
20. **Callidium undatum** Linn. — Kjøbenhavns Nørrebro, Gartn. Hauschild.
21. **Callidium alni** Linn. — Lindum Skov, 1 St., Johansen.
25. **Callidium clavipes** Fabr. — Rødby, Juli, Bøgh.
30. **Rhagium bifasciatum** Fabr. — Marselisborg Skov, i Lærkestubbe, tidligt om Foraaret almindelig, i Juni paa Hvidtjørn, Rosenkrantz.

31. **Toxotus quadrimaculatus** Linn. — Hüttenbjergene ved Slesvig, Juli, en større Række, L. Andersen.
36. **Leptura livida** Fabr. — Glücksborg, Langesø ved Slesvig og Sorup i Angel, Juli, temmelig hyppig, L. Andersen.
- 37a. **Leptura analis** Panz. — Lept. analis Panzer, Faun. Germ. fasc. 118. f. 6. Grammoptera analis Mulsant, Col. Fr. Longic. ed. I. p. 298. — Hald Nørreskov, under Egebark, Juli, 1 St., Koch. — Hr. Kochs Samling.
38. **Leptura præusta** Fabr. — Lindum Skov, en større Række, Løvendal o. fl. Saml.
40. **Leptura octomaculata** Fabr. — Sophiendal ved Ry, 1 St., Rosenkrantz.
- 40a. **Leptura sexguttata** Fabr. — Ulslev i Jylland, Juli, 1 St., Koch.
- 43a. **Leptura cincta** Fabr. — Lept. cincta Fabricius, Syst. Eleuth. II. p. 356; Gyllenhal. Ins. Svec. IV. p. 19; Thomson, Skand. Coleopt. VIII. p. 72. — Paa Museet findes to Stykker, nemlig en Hun fra Hørsholm, Drewsen, og en Han, signeret Nordsjælland.
51. **Leptura revestita** Linn. — Sorø, Løvendal; Bremersvold, Juni, Løvendal; Rødby, Juni-Juli, Bøgh; Hald Nørreskov, 1 St., hel rød Varietet, Koch; Lindum Skov, Juni 87, enkeltvis, Løvendal og Engelhart; Trinderup Krat, Johansen.
65. **Monochamus sartor** Fabr. — Kjøbenhavn, Tømmerplads, Juli, 1 St., Løvendal.
71. **Saperda scalaris** Linn. — Dyrehaven, klækket, Drewsen og Løvendal; klækket af El fra Næsbyholm og Sorø, Larven ved Svenstrup, Løvendal; Lindum Skov, Jacobsen, Johansen og Asmussen.
75. **Oberea linearis** Linn. — Rørvig, August, Budde-Lund.

Curculionidæ.

Schiödte: Fortegnelse over de i Danmark levende Curculiones, Nat. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 47—110.

5. **Cneorhinus exaratus** Marsh. — Hobro, Johansen.
10. **Strophosomus faber** Hrbst. — Aalborg, stundom skare-

vis paa hoi Sandbund i Omegnen, navnlig hyppig i Mai – Juni 82, Johansen.

11. **Strophosomus limbatus** Fabr. — Aalborg, i Hedeegnene, men kun enkeltvis, Johansen.
13. **Brachyderes incanus** Linn. — Silkeborg, Juni, i Mængde, Fabritius, Koch o. fl.
16. **Sitona humeralis** Steph. — Kastrup paa Amager, Juni, Løvendal.
19. **Sitona puncticollis** Steph. — Aalborg, paa Bakkerne i Omegnen, jævnligt, Johansen.
- 25a. **Polydrosus flavipes** de G. — Curculio flavipes de Geer, Hist. d. ins. V. p. 245; Gyllenhal, Ins. Svec. III. p. 271. Polydrosus flavipes Gyllenhal, Schönh. Gen. Spec. Curc. II. p. 141; Thomson, Skand. Coleopt. VII. p. 105. — Karise og Svenstrup i Sjælland samt paa Lolland, paa Eg, Juni - Juli, Løvendal.
27. **Polydrosus pterygomalis** Schönh. — Kjøbenhavn, Have ved Bülowsvei, paa Lind, i Slutningen af Mai, en lille Række, Forf.
31. **Tanymecus palliatus** Fabr. — Aarhus, krybende paa en Vei, 1 St., Rosenkrantz; N. for Husum, paa Tidsler, Juli, i Antal, L. Andersen.
32. **Chlorophanus viridis** Linn. — Husum, Juli, i Mængde, samt N. for Husum, paa Tidsler, L. Andersen.
39. **Otiorhynchus sulcatus** Fabr. — Aalborg, hyppig i Haverne, Johansen.
44. **Otiorhynchus ligneus** Oliv. — Fanø, en større Række, Rosenkrantz; Sæbygaards Marker, under Sten, nogle Stykker, Forf.
48. **Orias brunnipes** Oliv. — Aalholm Have, paa Poppelstød, en Række, Løvendal og Engelhart.
- 49a. **Trachyphlœus spinimanus** Germ. — Trach. spinimanus Germar, Ins. Spec. p. 405; Thomson, Skand. Coleopt. VII. p. 133. — Dronninglund, i Sandhuller, Sept., Løvendal.
50. **Trachyphlœus scabriculus** Linn. — Vendsyssels Hedeegne, i Mængde, Johansen.

51. **Trachyphlœus aristatus** Gyll. — Agdrup Bakker i Vendsyssel, sammen med den foregaaende Art, Johansen.
62. **Gronops lunatus** Fabr. — Lindum, i en Sandgrav, Løvendal; nær Hobro, i en Grusgrav, Rosenkrantz; Lundby Bakker, sightet en Række i en Agerren, Sept. 83, samt Agdrup Bakker i Vendsyssel, Mai, Johansen.
63. **Orthochætes setiger** Bech — Svenstrup, Sept., 1 St., Schlick.
64. **Molytes germanus** Linn. — Grenaa, 1 St., Rosenkrantz; Angeln samt Hüttenbjergene ved Slesvig, L. Andersen.
66. **Liosomus ovatus** Clairv. — Odense, taget i betydeligt Antal, Jørgensen.
67. **Trachodes hispidus** Linn. — Skovlund og Vang Skov i Vendsyssel, enkeltvis, Johansen.
77. **Hypera trilineata** Marsh. — Buderupholm, paa blomstrende Lotus corniculatus, Juni 82, enkeltvis, Johansen.
79. **Hypera plantaginis** de G. — Høskov ved Aarhus, i Udkanten af Skoven, ikke sjeldent, Rosenkrantz.
81. **Hypera mutabilis** Germ. — Aarhus, Mølleaa, sightet, enkeltvis, Rosenkrantz.
83. **Cleonus marmoratus** Fabr. — Holk Strand, Juli, L. Andersen.
86. **Cleonus albidus** Fabr. — Samsø, paa Strandbredden, ikke sjeldent, Rosenkrantz.
88. **Cleonus nebulosus** Linn. — Lindum Skov, i Plantehuller, Mai, Jacobsen.
89. **Larinus planus** Fabr. — Aarhus, flokkevis, Rosenkrantz; Restrup Enge ved Aalborg, Juni 85, i Mængde, Johansen.
91. **Lixus turbatus** Gyll. — Sophiendal ved Ry, Rosenkrantz.
93. **Lepyrus binotatus** Fabr. — Silkeborg Jernbane ved Sveibæk, mellem Skinnerne, April, 1 St., Jacobsen; Ry, 1 St., Rosenkrantz.
94. **Lepyrus colon** Fabr. — Klitter ved Blokhus, Mai 82, i Mængde, Johansen.
103. **Erirhinus festucæ** Hrbst. — Braband Sø, undertiden flokkevis, Rosenkrantz.

106. **Erirhinus pilumnus** Schönh. — Amager, paa Grøftevolde, Sept.—Octob., i større Antal, Schlick.
108. **Erirhinus æthiops** Fabr. — Geelskov, Begyndelsen af Juni 87, 1 St., Schlick.
112. **Dorytomus tremulæ** Fabr. — Aarhus, almindelig i October, Rosenkrantz.
117. **Dorytomus majalis** Payk. — Sundby Bakker ved Aalborg, Blokhus, Lindum S. for Hobro, paa Salix cinerea, Mai—Juni, Johansen.
118. **Dorytomus salicinus** Gyll. — Lindum Skov, paa Salix cinerea, Juni 86, i Mængde, Johansen; Sophiendal, Mai, i Mængde, samt Løvenholt Skov ved Salten Langsø, Juni, i temmelig stort Antal, Rosenkrantz.
122. **Dorytomus dorsalis** Hrbst. — Det indre Fyen, paa Graapil, Mai—Juni, ikke sjeldent, Jørgensen; Buderuplund, paa Pil, Juli, faa Stykker, Johansen.
124. **Mecinus collaris** Germ. — Fanø Østkyst, i Opskyl, en større Række, Rosenkrantz.
136. **Bagous frit** Hrbst. — Lekkende, Mai, Løvendal.
155. **Apion stolidum** Germ. — Høskov ved Aarhus, enkeltvist, Rosenkrantz.
159. **Apion difficile** Hrbst. — Restrup ved Aalborg, Lyngbakkerne, Johansen.
- 160a. **Apion flavofemoratum** Hrbst. — Ap. flavofemoratum Herbst, Naturg. all. bekannt. Ins. VII. p. 115. t. 103. f. 2; Germar, Mag. Entom. II. p. 163. t. IV. f. 10. a. b. — Hedenbakkerne ved Restrup Plantage, paa Genista tinctoria, Juni 83, en lille Række, Johansen.
161. **Apion genistæ** Kirb. — Laurberg, paa Genista, i Mængde, Onsild Bakker og ved Lindum, paa Genista pilosa, Juni, Løvendal og Johansen.
162. **Apion pallipes** Kirb. — Aarhus, sparsomt, Rosenkrantz.
175. **Apion dissimile** Germ. — Blegkilde ved Aalborg, sigtet nogle Stykker, Johansen.
190. **Apion minimum** Hrbst. — Søndervig, August, Rosenkrantz; Lindum ved Hobro, Restrup 1 Mil S. f. Aalborg,

- Ø. Svenstrup i Vendsyssel og i Klitterne ved Blokhus, paa
Salix repens, Mai—Juni, Johansen.
192. ***Apion sorbi*** Fabr. — Høskov, sparsomt, Rosenkrantz.
194. ***Apion columbinum*** Germ. — Gjerup i Fyen, paa *Lathyrus silvestris*, Juli—August, et større Antal, Jørgensen.
196. ***Apion Sundevalli*** Schönh. — Høskov, enkelte Aar almindelig, Rosenkrantz.
208. ***Magdalinus duplicatus*** Germ. — Hornbæk, paa Fyr, Juni, Johansen.
209. ***Magdalinus carbonarius*** Linn. — Sødringholm Skov, i Mængde, Rosenkrantz.
212. ***Magdalinus barbicornis*** Latr. — Agdrup Krat i Vendsyssel, paa Røn, Juli, Johansen.
215. ***Balaninus venosus*** Germ. — Aarhus og Rosenholm, enkeltvis, Rosenkrantz.
218. ***Balaninus crux*** Fabr. — Tved Skov Ø. for Flensborg, Juli, samt ved Slesvig, L. Andersen.
223. ***Anthonomus sorbi*** Germ. — Marselisborg Kro, enkelte Aar flokkevis, Rosenkrants.
224. ***Anthonomus spiloti*** Redt. — Roden Skov, ketset, Juni, Løvendal og Engelhart; Sigtegods fra Odense, April, Løvendal.
- 225a. ***Anthonomus incurvus*** Panz. — Curculio incurvus Panzer, Faun. Germ. fasc. 36. f. 17. *Rhynchænus incurvus* Gyllenhal, Ins. Svec. IV. p. 586. *Anthonomus incurvus* Thomson, Skand. Coleopt. VII. p. — Marselisborg Skov, paa Hæg, flokkevis, Rosenkrantz; Vang Skov i Vendsyssel, 28. Juni 87, 1 St., Forf.; et gammelt Stykke fra Ry havdes paa Museet.
227. ***Acalyptus carpini*** Hrbst. — Viby Krat ved Aarhus, ikke sjeldent, Rosenkrantz; Buderuplund, Juni, Johansen.
- 230a. ***Orchestes iota*** Fabr. — Curculio Jota Fabricius, Syst. Eleuth. II. p. 495. *Rhynchænus Jota* Gyllenhal, Ins. Svec. IV. p. 598. *Orchestes Jota* Thomson, Skand. Coleopt. VII. p. 284. — Lindum Skov, paa Pil, Juli—Aug., Jacobsen. — Hr. Jacobsens Samling.
- 232a. ***Orchestes semirufus*** Gyll. — *Rhynchænus semirufus* Entom. Medd. H. 2.

Gyllenhal, Ins. Svec. IV. p. 597. *Orchestes semirufus*
 Gyllenhal, Schönh. Gen. Spec. Curc. III. p. 492. *Orchestes scutellaris* var. c. Thomson, Skand. Coleopt. p. 285. —
 Thomson og Schiödte med ham, jfr. Naturh. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 84, have Gyllenhals Rhynch. semirufus som
 Synonym til *O. scutellaris*, men Thomson har maaske ikke
 havt denne Form til Sammenligning, da den vistnok er
 sjeldent i Skaane eller Sverrig (Gyllenhal angiver den kun
 som funden paa Gotland), og Schiödte har vistnok heller
 ikke seet den, ialtfald findes den ikke nu opstillet her paa
 Museet; dog er det sikkert en god og distinct Art. Iovrigt
 kan ogsaa Dækvingernes røde Farve svinde, og hele Dyret
 er da sort med hvidlig Behaaring. — Lindum ved Hobro,
 nedbanket af Pil eller Birk (sandsynligvis det sidste),
 18. Juni 87, 2 St., Løvendal; samme steds, nedbanket af
 Birk, 29. Juni 87, 4 St., deriblandt 2 af den mørke Varietet,
 Forf.; allerede det foregaaende Aar taget samme steds og
 ved Thiele, enkeltvis, Jacobsen.

- 233. ***Orchestes ioniceræ*** Fabr. — Slesvig By, Juli, L. Andersen.
- 236. ***Orchestes decoratus*** Germ. — Veile, August, i Antal, Fabritius og Jørgensen.
- 240. ***Coryssomerus capucinus*** Bech — Tidsvilde Overdrev, i Sandhul, Juni 87, 1 St., Schlick.
- 241. ***Elleschus scanicus*** Payk. — Høskov, i Udkanten af Skoven, paa Bæverasp, 1885 en større Flok, 1886 forsvunden, Rosenkrantz.
- 242. ***Elleschus bipunctatus*** Linn. — Aalborg, hyppig paa *Salix cinerea*, Johansen.
- 245. ***Tychius polylineatus*** Germ. — Udenfor Bastbjerg Skov, mellem Borup Station og Skjoldnæsholm, paa en Bakke, Sept., en Række, Løvendal, Engelhart og Schlick; Frijsborg, Mai, 1 St., Løvendal.
- 250. ***Sibinia viscariae*** Linn. — Nykjøbing p. Sj., Budde-Lund; Dronninglund, under Gyvelbuske, Sept., en lille Række, Løvendal; Aalborg, paa Bakkerne, ikke sjeldent, Johansen.
- 251. ***Sibinia primita*** Hrbst. — Fanø, ketset, 1 St., Rosenkrantz.
- 254. ***Cionus thapsus*** Fabr. — Det synes, som om der her har

fundet en Sammenblanding Sted af denne Art og den følgende Cion. hortulanus. — Den virkelige C. thapsus er foruden paa Lolland og Falster taget paa Langeland, paa Verbascum nigrum, Juli, i stort Antal, Schlick.

- 254a. **Cionus hortulanus** Marsh. — Curculio hortulanus Marsham, Entom. Brit. I. p. 278. Rhynchænus hortulanus Gyllenhal, Ins. Svec. III. p. 215. Cionus hortulanus Thomson, Skand. Coleopt. VII. p. 293. — Lolland, paa forskjellige Steder af denne Ø, Schiödte, Bergsøe, Schlick.
255. **Cionus pulchellus** Hrbst. — Haderslev og Tørring, temmelig almindelig, L. Andersen.
- 259a. **Gymnetron graminis** Gyll. — Rhynchænus graminis Gyllenhal, Ins. Svec. III. p. 210. Gymnetron graminis Rosenschiöld, Schönh. Gen. Spec. Curr. IV. p. 772. Miarus graminis Thomson, Skand. Coleopt. VII. p. 316. — Dybdal ved Aalborg, i Frøkapslerne af Campanula persicifolia (?), Sept. 86, i Antal, Johansen; samme steds, i Blomsterne af Campanula, Centaurea Scabiosa og Scabiosa sp., 30. Juni 87, flokkevis in copula, Johansen, Asmussen og Forf.
- 259b. **Gymnetron linariæ** Panz. — Curculio linariæ Panzer, Faun. Germ. ed. I. fasc. 26. f. 18. Gymnetron Linariæ Rosenskjöld, Schönh. Gen. Spec. Curr. IV. p. 769; Thomson, Skand. Coleopt. VII. p. 309. — Den er taget for adskillige Aar siden paa Vestkysten af Jylland ved Nørre-Vosborg og i den nordlige Del af Sønderjylland, enkeltvis, Forf.; Tidsvilde, paa Linaria, Juni 87, i større Antal, Schlick; Aalborg, klækket af Galler paa Rodhalsen af Linaria vulgaris (Billen fremkom om Foraaret af de i October f. A. indsamlede Galler), nogle Stykker, Johansen.
261. **Gymnetron collinus** Gyll. — Svendstrup ved Aalborg, klækket af Frøkapsler paa Linaria vulgaris, Sept., en Række, Johansen.
- 262a. **Gymnetron concinnus** Gyll. — Gymn. concinnus Gyllenhal, Schönh. Gen. Spec. Curr. IV. p. 749. — Arten ligner meget G. veronicae og betragtes ofte som en Varietet af denne. — Sorø, Løvendal; paa Museet fandtes enkelte Stykker fra Nordsjælland og Vendsyssel.
- 265a. **Gymnetron melanarius** Germ. — Curculio melanarius

- Germar, Mag. Zool. IV. p. 307. *Gymnetron melanarius*
 Boheman, Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII. pars 2. p. 183.
 — Kjøbenhavns Omegn, Løvendal og Engelhart; Sorø, i
 Antal, Løvendal.
268. **Acalles ptinoides** Marsh. — Dronninglund, under Lyng,
 Juni 71, 1 St., Løvendal.
270. **Acalles roboris** Curt. — Kattinge Mølle ved Roskilde,
 paa et Risgjærde, Fabritius; Langeland, paa Risgjærder,
 Juni - August, i større Antal, Schlick.
273. **Cœliodes geranii** Payk. — Boserup, Fabritius; Bremers-
 vold, Løvendal.
288. **Ceutorhynchus querceti** Gyll. — Randers Enge, paa
 Nasturtium palustre, i Antal, Jacobsen; Vendsyssel, faa
 Stykker, samt Agdrup Krat, paa Barbarea vulgaris, en
 Række, Johansen.
295. **Ceutorhynchus rugulosus** Hrbst. — Af Synonymi-Rækken
 udgaar C. figuratus, da denne vistnok maa betragtes som
 en selvstændig Art.
- 295a. **Ceutorhynchus figuratus** Gyll. — Ceut. figuratus Gyllen-
 hal, Schönh. Gen. Spec. Curc. IV. p. 526. Ceut. rugulosus
 var. c. Thomson, Skand. Coleopt. VII. p. 265. — Paa
 Museet findes der adskillige Stykker af denne Art fra
 Nordsjælland, Lolland og Falster, Ry og Torning; i de
 senere Aar er den samlet paa Amager og i Dyrehaven,
 Løvendal; Geelskov, enkeltvis, Engelhart.
301. **Ceutorhynchus angulosus** Schönh. — Dyrehaven ved
 Kjøbenhavn, Juli, samt Veile, Fabritius.
- 302a. **Ceutorhynchus scapularis** Gyll. — Ceut. scapularis
 Gyllenhal, Schönh. Gen. Spec. Curc. IV. p. 555. Ceut.
 obscurecyaneus Gyllenhal, ibid. p. 556; Weise, Deutsche
 Entom. Zeitschr. 1883. p. 328. — Mose S. f. Hareskovene,
 April, Løvendal; Donse, sightet i Opskyl, Mai, Løvendal og
 Engelhart.
303. **Ceutorhynchus cyanipennis** Germ. — Veile, paa Kaal,
 i Antal, Fabritius.
306. **Ceutorhynchus apicalis** Gyll. — Aalborg, enkeltvis,
 Johansen.

314. **Poophagus sisymbrii** Fabr. — Skanderborg Sø, almindelig, Rosenkrantz.
315. **Tapinotus sellatus** Fabr. — Lekkende ved Vordingborg, sigtet, Mai, Løvendal; Skanderborg Sø, enkelte, Rosenkrantz.
318. **Rhinoncus comari** Hrbst. — Skovlund i Vendsyssel, Johansen.
320. **Rhinoncus notula** Germ. — Aarhus og Sondervig, enkeltevis, Rosenkrantz.
322. **Rhinoncus granatus** Schönh. — Donse Mose, enkelte Stykker. Engelhart.
332. **Baridius picinus** Germ. — Aalborg, i Sandgrave, om Foraaret, nogle Stykker, Johansen.
337. **Phloeophagus sculptus** Schönh. — Aalborg, en Gang i stor Mængde i en gammel Stolpe af Fyr, ellers kun enkeltevis i Bygninger, Johansen.
338. **Rhyncolus truncorum** Germ. — Bognæs, af Bøg, Juli, Løvendal.
342. **Rhyncolus elongatus** Gyll. — Kjøbenhavn, Tømmerpladser, paa Fyr, Sept., Løvendal; Husum, Hansen.
349. **Hylurgus minor** Hart. — Kjøbenhavn, Tømmerpladse, paa Fyr, Aug.—Sept., i Antal, Løvendal.
350. **Dendroctonus micans** Kug. — Ravnsnæs Skov ved Hørsholm, i Gran. April—Mai, i stort Antal, Løvendal; Geelskov, i Begyndelsen af Juni 87, i større Antal, Schlick.
- 351a. **Phloeophthus spartii** Nördl. — Hylesinus spartii Nördlinger, Jahresber. Ver. vaterl. Naturk. Würtemb. III. p. 217. t. I. f. 9; Stett. entom. Zeit. IX (1848). p. 250. t. II. f. 7. Polygraphus tarsalis Förster, Verh. Ver. Preuss. Rheinl. VI, (1849). Nachtr. p. 38. — Veile, i Stammen af en Gyvel, Juni, en Række, Fabritius.
352. **Phloeophthus rhododactylus** Marsh. — Geelskov, Juni, i Antal, Schlick og Løvendal.
354. **Hylesinus oleiperda** Fabr. — Næstved, Juli, et Par Stykker, Løvendal; Eisbøl, i Ask, 1 St., L. Andersen.
362. **Tomicus stenographus** Duft. — Kjøbenhavn, Tømmerplads, Fyr, Sept., en Række, Løvendal.

363. **Tomicus typographus** Linn. — Ravnholmene, Gran, Juni, et Par Stykker, Løvendal.
- 367a. **Xylocleptes bispinus** Duft. — Bostrichus bispinus Duftschmidt, Faun. Austr. III. p. 92; Ratzeburg, Forstins. I. p. 187, t. XIII. f. 5. — En Han ketset i Dyrehaven, 29. Mai 84, Løvendal.
368. **Pityophthorus micrographus** Gyll. — Roden og Freilev, paa de Skovene omgivende Risgjærder, en større Række, Engelhart.
370. **Dryocetes villosus** Fabr. — Gribskov, i Eg, April, samt Skarritsø, i Eg, Mai, Løvendal.
372. **Dryocetes alni** Georg — Svenstrup, i El, Mai, i Antal, Løvendal.
374. **Xyloborus dispar** Fabr. — Svenstrup, Vallø, Thureby, Løvendal; Vemmetofte, i Bøgestød, sammen med Hylecoetus dermestoides-Larver og sværmende (Hunnerne) flere Steder i Skoven, Juni - Juli 84, i stort Antal, et Par Hanner klækket senere i August, Forf.; Vemmetofte, Hannen i stort Antal i Aug. 85, Løvendal; Aalholm, 2 Hanner og Hunner, August, Engelhart.
376. **Xyloborus Saxesenii** Ratz. — Vemmetofte, i Bøg, Juni—Aug., enkelItvis, Løvendal.
379. **Eccoptogaster Ratzeburgii** Jans. — Lindum Skov, Birk, i Antal, Løvendal, Johansen o. fl. Saml.
380. **Eccoptogaster destructor** Oliv. — Bognæs Vesterskov og Næsbyholm Skov, i Elmestammer, Løvendal.
381. **Eccoptogaster pruni** Ratz. — Københavns Omegn, i Æblestammer, Juni, Løvendal.
382. **Eccoptogaster intricatus** Ratz. — Jægerspris, sværmende omkring de gamle Ege i Nordskoven, Juni, et Par Stykker, Løvendal; Lindum Skov, Løvendal og Forf.; Trinderup Krat, Johansen.
383. **Eccoptogaster multistriatus** Marsh. — Drewsens Klækkehus paa Strandmøllen, i Antal, Løvendal; Hadsund, 4—5 Stykker, Jacobsen. Localiteten »Falster« udgaaer af Hovedfortegnelsen.
384. **Eccoptogaster rugulosus** Ratz. — Vemmetofte, Juli 84, Forf.

387. **Attelabus curculionoides** Linn. — Skanderborg, ikke sjeldent; Lindum Skov, Juni, Johansen; Tved Skov Ø. f. Flensborg, Beftoft Plantage, L. Andersen.
389. **Rhynchites megacephalus** Germ. — Marselisborg Skov, skarevis, Rosenkrantz.
391. **Rhynchites sericeus** Hrbst. — Lindum, paa Eg, Mai—Juni 86, en Række, Jacobsen og Løvendal; sammesteds i stort Antal, Juni 87, Jacobsen o. fl. Saml.
- 391a. **Rhynchites pubescens** Fabr. — Curculio pubescens Fabricius, Syst. entom. I. p. 131. Rhynchites pubescens Herbst, Naturg. Käf. VII. p. 139. t. 105. f. 3; Gyllenhal, Schönh. Gen. spec. Curcul. I. p. 225. — Lindum, paa Eg, Mai—Juni 1886, en lille Række, Jacobsen; sammesteds, Begyndelsen til Midten af Juni 87, i stort Antal, Jacobsen o. fl. Samlere; Veile, et gammelt Stykke paa Museet.
393. **Rhynchites uncinatus** Thoms, — Tved Skov, Juli, L. Andersen.
394. **Rhynchites pauxillus** Germ. — Redsle paa Falster, Slutningen af Mai, nogle Stykker, Løvendal; Ulfslyst ved Haderslev, L. Andersen.
- 395a. **Rhynchites alliariæ** Payk. — Attelabus alliariæ Paykull, Faun. Svec. III. p. 175. Rhynchites alliariæ Gyllenhal, Ins. Svec. III. p. 26; Thomson, Skand. Coleopt. VII. p. 35. Rhynchites punctatus Stephens, Ill. Brit. Entom. IV. p. 201. — Lindum Skov, Eg, en lille Række, Asmussen; et Par Hanner og Hunner fra Veile fandtes paa Museet; Redsle Skov paa Falster, Slutningen af Mai, Schlick.
397. **Rhynchites aeneovirens** Marsh. — Lindum Skov, Eg, Johansen; Laurberg, ikke sjeldent, og Hobro, Rosenkrantz.
400. **Rhynchites populi** Linn. — Ørnedalen i Lindum Skov, paa Bæverasp, Juni, Johansen og Jacobsen.
402. **Rhinomacer attelaboides** Fabr. — Geelskov, paa fældede blomstrende Graner, Mai 1885, i Antal, Schlick; Ruderhegn, Ravnsnæs Skov, paa blomstrende Graner, Mai—Juni, Løvendal.
404. **Anthribus albinus** Linn. — Skjoldnæsholm, Løvendal, Jacobsen og Bachevold; Silkeborg, Birk, Jacobsen og Fabricius; Himmelbjerget, Bøgestød, enkeltvis, Jacobsen.

405. **Tropideres niveirostris** Fabr. — Halk, paa gamle Ris-gjærder, L. Andersen.
406. **Tropideres sepicola** Fabr. — Halk, ligeledes, mere sparsomt, L. Andersen.
- 409a. **Aræocerus fasciculatus** de G. — Curculio fasciculatus de Geer, Hist. d. ins. V. p. 276. t. 16. f. 2; Bruchus cacao Fabricius, Syst. entom. I. p. 64. Anthribus Coffeæ Fabricius, Syst. Eleuth. II. p. 411. Aræcerus Coffeæ Gyllenhal, Schönh. Gen. spec. Currel. I. p. 175. — Aarhus, Palmeolie-fabrikken, flokkevis, Rosenkrantz.
410. **Bruchus rufimanus** Schönh. — Bremersvold Kjeldskov, Løvendal og Holstebroe; Vordingborg, klækket af Hestebønner, i Antal, Løvendal; Gjedsergaards Lade, i Slutningen af September, i større Antal (Dyrene sad indeni Hestebønnerne og kom næste Aar ud i Mængde), Engelhart.
413. **Bruchus villosus** Fabr. — Ørbæklunde ved Nyborg, paa Gyvel, en Række, Koch.

**Chrysomelidæ, Erotylidæ, Endomychidæ
og Coccinellidæ.**

Schiödte: Fortegnelse over de i Danmark levende Chrysomelæ, Erotyli, Endomychi og Coccinellæ, Nat. Tidsskr., 3. R. 8. B. p. 111—159.

Chrysomelidæ.

4. **Donacia spargani** Ahr. — Aarhus, almindelig, Rosenkrantz.
17. **Donacia nigra** Fabr. — Aarhus, enkeltvis, Rosenkrantz; Gravlev Enge ved Aalborg, paa Typha, ufarvede Hunner med brune Dækvinger forekomme sammen med den mørkere Form, Juni, Johansen.
28. **Zeugophora frontalis** Suffr. — Aarhus, ikke sjælden om Efteraaret, Rosenkrantz.
31. **Crioceris duodecimpunctata** Linn. — Husum og Slesvig By, paa Asparges, Juli, L. Andersen.

37. **Hispa atra** Linn. — Paa en sandet Vei fra Aarhus til Risskov, 1849—51, skarevis, senere ikke fundet, O. G. Jensen.
48. **Cassida hemisphærica** Hrbst. — Randers, Engene, sigtet flere Steder, April, Jacobsen; Eishol, paa Inula, Juli, L. Andersen.
51. **Clythra laeviuscula** Ratz. — Sørup i Angeln, L. Andersen.
54. **Labidostoma tridentata** Linn. — Laurberg, Eg, Juni, en større Række, Løvendal og Jacobsen; Lindum Skov, i Antal, Jacobsen o. fl. Saml.
59. **Cryptocephalus coryli** Linn. — Bækkeskov ved Præstø, Juni, Holstebroe.
65. **Cryptocephalus decempunctatus** Linn. — Lyngby Sø, paa Pil, Juli, i stort Antal, Smith, Gædeken, Løvendal o. fl.
67. **Cryptocephalus flavilabris** Fabr. — Aarhus, enkelte Aar flokkevis, Rosenkrantz.
68. **Cryptocephalus pallifrons** Gyll. — Lindum Skov, paa Pil, August, en Række, Jacobsen.
69. **Cryptocephalus bipunctatus** Linn. — Frøslev Skov N. f. Flensborg, Tved Skov O. f. Flensborg, Beftoft Plantage, L. Andersen.
70. **Cryptocephalus vittatus** Fabr. — Laurberg, Fabritius; Skørping, paa Hieracium pilosella, Johansen; Mark N. f. Tved ved Flensborg, paa Hieracium, Juli, en lille Række, L. Andersen.
71. **Cryptocephalus bilineatus** Linn. — Bremersvold paa Digerne udfor Kjeldskov, Juni, i stort Antal, Løvendal; udfor Roden Skov paa Strandenge, Juli, i større Mængde, Engelhart.
- 74a. **Cryptocephalus querceti** Suffr. — Cryptoc. querceti Suffrian, Linn. entom. III. p. 96; Thomson, Skand. Coleopt. VIII. p. 309. Cryptoc. labiatus var. Gyllenhal, Ins. Svec III. p. 628. — Bremersvold Kjeldskov, paa Eg, en større Række, Løvendal og Engelhart; Bognæs Skov, mellem Egene, August, ketset 2 St., Engelhart. Det i Hovedfortegnelsen over Chrysomelinerne, Naturh. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 128, opførte Fund af Crypt. pallifrons fra Freilev paa Lolland bør henføres til denne Art.

- 76a. **Lamprosoma concolor** St. — Byrrhus concolor, Sturm, Deutsch. Ins. II. p. 109. t. 35. f. a. A. Oomorphus concolor Curtis, Brit. Entom. VIII. p. 347. Lamprosoma concolor Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI. p. 282. — Udkanten af Freilev Skov, nedbanket, Juni, 1 St., Løvendal. — Hr. Løvendals Samling.
77. **Eumolpus obscurus** Linn. — Udbredt i Skovene N. f. Kjøbenhavn, især Geelskov, de fleste yngre Samlere.
78. **Colaphus Sophiae** Schall. — Haderslev, Sommeren 1876, senere søgt forgjæves, L. Andersen.
86. **Chrysomela limbata** Fabr. — Grenaa, 1 St., Rosenkrantz; paa en Mark N. f. Vøjens, meget almindelig, L. Andersen.
92. **Chrysomela cerealis** Linn. — Fredericia, Fabritius.
94. **Chrysomela lamina** Fabr. — Eishøl ved Haderslev, 5 St., L. Andersen.
95. **Chrysomela duplicata** Zenk. — Vistnok temmelig udbredt paa Fyen, Middelfart, Hunderup, Killerup, Seden, Tommerup, paa Hypericum, oftest om Efteraaret til ind i November, flere Steder i Mængde, Jørgensen.
100. **Lina collaris** Linn. — Den rødbenede Varietet er taget i stor Mængde i Klitterne ved Grenaa, Mai, og ved Sødringsholm, Rosenkrantz; i Klitterne ved Blokhus, Mai, Johansen.
101. **Gonioctena rufipes** de G. — Sødringsholm og Sophiendal, af og til almindelig, Rosenkrantz.
105. **Gonioctena pallida** Linn. — Tommerup, paa Eg, Juni, i Antal, og Brahetrolleborg, Mai, Jørgensen; Sæbygaards Skov, Juli, i Antal, Forf.
- 112a. **Phyllolecta laticollis** Suffr. — Phyllolecta laticollis Suffrian, Linn. entom. V. p. 262; Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI. p. 520. Phyllolecta cavifrons Thomson, Skand. Coleopt. VIII. p. 278. — Kjøbenhavns Omegn, Løvendal; Redsle Skov paa Falster, Dohlmann; Aalholm, Bremersvold o. fl. St., især paa Bæverasp, Løvendal og Engelhart; Marselisborg Skov, i stort Antal, Rosenkrantz.
120. **Adimonia fontinalis** Boh. — Veile, Septemb., Fabritius.
122. **Adimonia interrupta** Illig. — Randers, i en Sandgrav, en Række, October, Jacobsen.

144. **Psylliodes marcida** Illig. — Gilleleie, paa Cakile maritima, Jørgensen; Esberg, ligeledes, Jørgensen.
186. **Apteropeda orbiculata** Marsh. — Marselisborg Skov, enkeltvis, Rosenkrantz; Ulfslyst, L. Andersen.
188. **Mnophila muscorum** Ent. Hft. — Dyrehaven, under Mos paa Træer, October, i stort Antal, og Skjoldnæsholm, Mai, Løvendal; Store Hareskov, Engelhart; Buderuplund, sigtet under Mos, Johansen.
196. **Chalcoides nitidula** Linn. — I Udkanten af Marselisborg Skov, skarevis, Rosenkrantz.

Erotylidæ.

1. **Engis sanguinicollis** Fabr. — Pindstrup Skov, Mai, 1 St., Jacobsen; Tørning Skov, paa en Bakke med gamle Bøgestubbe, Mai, 1 St., og Langsø ved Slesvig, Juli, 1 St., L. Andersen.
2. **Engis rufifrons** Fabr. — Eisbøl, i Svampe, L. Andersen.
8. **Tritoma bipustulata** Fabr. — Skorping Skov, Johansen; Eisbøl og Ulfslyst ved Haderslev, i Træsvampe, L. Andersen.

Endomychidæ.

1. **Lycoperdina succincta** Linn. — Pindstrup Skov, i Bo-vister, Juli, Jacobsen.
- 2a. **Mycetina cruciata** Schall. — Chrysomela cruciata Schaller, Abh. d. Hall. Naturf. Ges. I. p. 273. Lycoperdina cruciata Gyllenhal, Ins. Svec. IV. p. 219; Thomson, Skand. Coleopt. V. p. 303. — Langeland, Bukkeskov ved Tranekær, ved Foden af et Bøgetræ under en lille Fyrsvamp, 7 Stykker, Schlick.

Coccinellidæ.

1. **Rhizobius litura** Fabr. — N. f. Haderslev Dam, i Tørning og Eisbøl, ikke sjeldent, L. Andersen.
2. **Coccidula scutellata** Hrbst. — Skanderborg, almindelig, Rosenkrantz; Haderslev Dam, temmelig almindelig, L. Andersen.

9. **Adalia bipunctata** Linn. — De sorte Varieteter ved Kjøbenhavn, Helsingør, Lolland, Juni—Septemb., Løvendal.
14. **Coccinella hieroglyphica** Linn. — De sorte Varieteter ved Hald, Dr. H. J. Hansen; Dronninglund og Silkeborg, Juni, Løvendal.
15. **Coccinella quattuordecimpustulata** Linn. — Roden Skov, paa Stranden, Juni, Løvendal.
19. **Myrrha octodecimguttata** Linn. — Tidsvilde, Juni, og Billeskov, paa Fyr, Løvendal.
- 24a. **Vibidia duodecimguttata** Poda. — Redsle Skov, i Antal, Koch; Bremersvold Kjeldskov, Juni, Løvendal; Søholt, Holstebroe.
31. **Exochomus auritus** Scriba. — Munkebjerg ved Veile, en Række, Fabritius.
35. **Platynaspis bisbipustulatus** Fabr. — Sandkroen ved Tidsvilde, Engelhart.
- 42a. **Scymnus bipunctatus** Kug. — Scymn. bipunctatus Kugelann, Schneid. Mag. V. p. 547; Weise, Bestimm. eur. Coleopt. Cocc. ed. II. p. 81. Kun den sorte Varietet, var. nigricans Weise, er hidtil fundet her i Landet. — Paa Museet fandtes et Stykke fra Serup i Jylland, Prof. Schiödte; iøvrigt taget paa Bornholm ved Hasle og Allinge, Septbr., og paa Falster, Løvendal.
- 42b. **Scymnus pulchellus** Hrbst. — Scymn. pulchellus Herbst, Naturg. all. bek. Ins. VII. p. 345. t. 116. f. 10. K.; Weise, Bestimm. eur. Coleopt. Cocc. ed. II. p. 81. Scymnus bisbipustulatus Panzer, Faun. Germ. fasc. 13. f. 5. Coccinella 4-lunulata Illiger, Käf. Preuss. p. 416. — Esbønderup, Past. Jacobsen; Randers, Juni, enkeltvis, Løvendal.
- 45a. **Clambus minutus** St. — Agathidium minutum Sturm, Deutschl. Ins. II. p. 64. t. 28. f. e. E. Anisotoma minutum Gyllenhal, Ins. Svec. IV. p. 514. Clambus minutus Thomson, Skand. Coleopt. IV. p. 121. Clambus armadillus Redtenbacher, Faun. Austr. ed. II. p. 298. — Sigtet forskjellige Steder paa Sjælland af Løvendal, saaledes i Kjøbenhavn, Rosenborg Have i en Plantemødding, Dyrehaven, Lyngby Sø, Lethraborg, Næsbyholm samt i Ruderhegn hos Formica rufa.

46. **Comazus enhamensis** Steph. — Ydermuren af Marselisborg Tærskelade, om Efteraaret, temmelig almindelig, Rosenkrantz.

Antallet af de for den danske Fauna nye Arter, som ere tilkomne i den her givne Tillæggsfortegnelse til Danmarks Biller, er 53. I og for sig er dette Tal jo ganske betydeligt, men foruden disse nye Arter findes der ogsaa adskillige Insekter i de forskjellige Samlinger, og saaledes et ikke ringe Antal paa det zoologiske Museum, som staae ubestemte hen, og som det hidtil ikke har været muligt sikkert at henføre til ældre Arter. Som en Familie, hvor der findes et saadant større Antal af ubestemte Former, er allerede ovenfor anført Scydmænerne og Pselapherne, og kan her yderligere føjes Curculion-Slægten Bagous. De ny tilkommende Arter ere følgende:

Carabidæ.

- 17a. *Blechrus maurus* St.
- 233a. *Bembidium decorum* Panz.
- 243b. *Bembidium gilvipes* St.

Hydrophilidæ.

- 26a. *Limnebius nitidus* Marsh.
- 28a. *Laccobius nigriceps* Thoms.
- 37a. *Hydrobius globulus* Ksw.

Silphidæ.

- 21a. *Hydnobius punctatus* St.
- 21b. *Hydnobius punctatissimus* Steph.
- 28a. *Choleva alpina* Gyll.

Scaphididæ.

- 2a. *Scaphisoma boleti* Panz.

Lamellicornia.

- 76a. *Trox hispidus* Laick.

Malacodermata.

- 22a. *Telephorus oculatus* Gyll.
 34. *Telephorus pilosus* Payk.
 76. *Julistus floralis* Oliv.

Cleridæ.

- 81a. *Clerus rufipes* Brahm.

Ptinidæ.

- 89a. *Ptinus bicinctus* St.

Anobiidæ.

- 118a. *Dorcatoma serra* Panz.
 119a. *Dorcatoma flavigorne* Fabr.
 126a. *Rhizopertha pusilla* Fabr.
 128. *Lyctus brunneus* Steph.
 129. *Lyctus impressus* Com.

Tenebrionidæ.

- 18a. *Latheticus oryzæ* Waterh.
 29b. *Allecula Lövendalii* Reitt. (for All. Rhenana Bach).

Salpingidæ.

- 39a. *Salpingus mutillatus* Bech.

Mordellidæ.

- 88a. *Anaspis ruficollis* Fabr.

Rhipiphoridæ.

- 91a. *Metœcus paradoxus* Linn.

Cerambycidæ.

- 37a. *Leptura analis* Panz.
 43a. *Leptura cincta* Fabr.

Curculionidæ.

- 25a. *Polydrosus flavipes* de G.
 49a. *Trachyphlœus spinimanus* Germ
 225a. *Anthonomus incurvus* Panz.
 230a. *Orchestes iota* Fabr.
 254a. *Cionus hortulanus* Marsh.
 259a. *Gymnetron graminis* Gyll.

- 259b. *Gymnetron linariæ* Panz.
 262a. *Gymnetron concinnus* Gyll.
 265b. *Gymnetron melanarius* Germ.
 295a. *Ceutorhynchus figuratus* Gyll.
 302a. *Ceutorhynchus scapularis* Gyll.
 351a. *Phlœophthorus spartii* Nördl.
 367a. *Xylocleptes bispinus* Duft.
 391a. *Rhynchites pubescens* Hrbst.
 395a. *Rhynchites alliariæ* Payk.
 409a. *Aræocerus fasciculatus* de G.

Chrysomelidæ.

- 74a. *Cryptocephalus querceti* Suffr.
 76a. *Lamprosoma concolor* St.
 112a. *Phyllolecta laticollis* Suffr.

Erotylidæ.

- 2a *Mycetina cruciata* Schall.

Coccinellidæ.

- 42a. *Scymnus bipunctatus* Kug.
 42b. *Scymnus pulchellus* Hrbst.
 45a. *Clambus minutus* St.

Derimod udgaae af de ældre Fortegnelser:

34. *Hydrobius oblongus* Hrbst.
 20. *Hypophlœus bicolor* Oliv.
 29b. *Allecula Rhenana* Bach.

Følgende Arter findes ikke repræsenterede paa det zoologiske Museum:

- Miscodera arctica* Payk. — Hr. Schlicks Samling.
Anchomenus tristis Illig. — Exemplaret er gaaet til Grunde
 for mange Aar siden.
Bembidium ruficolle Illig.
Limnebius nitidus Marsh. — Hr. Schlicks Samling.

- Hydnobius punctatissimus* Steph. — Hr. Johansens Samling,
Aalborg.
- Choleva umbrina* Er.
- Choleva alpina* Gyll. — Hr. Jørgensens Samling, Odense.
- Choleva Kirbyi* Sp.
- Epuræa neglecta* Heer. — Hr. Løvendals Samling.
- Meligethes parvulus* Er. — Ligeledes.
- Meligethes erythropus* Gyll. — Ligeledes.
- Aphodius niger* Panz.
- Chrysobothris chrysostigma* Linn.
- Buprestis mœsta* Fabr. — Hr. Gerickes Samling?
- Trichodes apiarius* Linn.
- Clerus rufipes* Brahm. — Hr. Løvendals Samling.
- Dinoderus elongatus* Payk. — Hr. Jespersens Samling, Randers?
- Tenebrio obscurus* Fabr.
- Helops striatus* Fourer.
- Toxotus interrogationis* Linn.
- Leptura analis* Panz. — Hr. Kochs Samling.
- Astynomus griseus* Fabr. — Hr. Løvendals Samling.
- Astynomus costatus* Fabr. — Hr. Gerickes Samling?
- Orchestes iota* Fabr. — Hr. Jacobsens Samling.
- Platypus cylindrus* Fabr.
- Rhynchites auratus* Scop.
- Lamprosoma concolor* St. — Hr. Løvendals Samling.
- Thyamis pratensis* Panz. — Typen til denne Art er ikke til at
finde paa Museet.
- Thyamis lycopi* Foudr. — Ligeledes.
- Thyamis rubiginosa* Foudr. — Ligeledes.
- Thyamis pellucida* Foudr. — Ligeledes.
- Sospita tigrina* Linn.