

## Mindre Meddelelser.

I internationale Entomologische Zeitschrift Guben Nr. 51 d. 22. Marts 1913 refereres følgende fra Berliner Entomologischer Vereins Møder d. 5. Decbr. 1912 & 9. Januar 1913.

<sup>5/12</sup> 12. Herr Fässig demonstriert einige interessante Formen bekannter Arten, unter anderen:

*Lycaena argus* L. aus Bornholm; was dort häufig, alle ♀♀ oberseite blau mit dunklem Rande und roten Randflecken auf den Hinterflügeln, ebenso gehörten alle ♀♀ von *L. icarus* Rott zur f. *amethystina* Gillen. Herr Ziegler fing ähnliche Stücke auf dem Kullengebirge in Schweden.

<sup>9/1</sup> 13. Herr Fässig hat noch einmal die schon früher gezeigten blauen *Lycaena* ♀♀ aus Bornholm, über deren Zugehörigkeit zu *L. argus* L. oder *argyrognomon* Bergstr. Zweifel bestehen konnten, mitgebracht, nebst Vergleichsstücken dieser beiden Arten, darunter *L. argyrognomon* aus Woltersdorf bei Berlin. Die Bornholmer Stücke gehören offenbar zu *argus* L., sie zeigen auch den Mittelpunkt auf den Vorderflügeln. Diese bis gegen den Vorderrand der Vorderflügel hin ganz schwarzblauen ♀♀ flogen, und zwar nur in dieser Form, zu Hunderten im August, leider wurde nicht ein einziges ♂ mehr erbeutet.

Weiter bemerkt Votr., dass er *Larentia picata*, Hb. am gleichen Fundort und zu gleicher Zeit gefunden habe, während z. B. Berge-Rebel p. 353 angeben: »in 2 Generationen im Maj und Juli oder Juni und September«. Möglicherweise kommen dort aber die Thiere nur im August vor, da Pfützner für Brandenburg und Bartel-Herz schon für Berlin nur Juni und Juli als Flugzeit angeben.

Ved Undersøgelsen af mine *Lycaena argus* ♀ og *icarus* ♀ fra Bornholm viste det sig, at de ligeledes tilhøre de ovennævnte Former, hvorimod mine ♂ ♂ ikke afvige synderligt fra mine andre ♂ ♂ af disse 2 Arter.

Desværre er mit Materiale af disse Arter fra denne Lokalitet kun ringe, men sandsynligvis vil senere Fangster bekræfte Hr. Fässig's Meddelelser.

*L. picata* findes her i Danmark vist kun i Juli og August. Faaborg, 24. Marts 1913.

C. S. Larsen.

† **Rhizophagus perforatus Er.** Af denne for vor Fauna nye Art har jeg sigtet 4 Stkr. ved Roden af gamle Piletræer ved Damhussøen <sup>5</sup>/<sub>3</sub> 1911. Endvidere fandt jeg blandt nogle magasinerede Dyr i min Samling 2 Stkr., signerede København 1903, uden at jeg nærmere kan erindre, hvor jeg har fundet dem.

† **Montoma brevicollis Aubé.** 1 Stk. sigtet af en Kompostdyng i Valby <sup>21</sup>/<sub>10</sub> 1910. Maaske overset paa Grund af nogen Lighed med *picipes Hrbst.*, som den staar meget nær.

**Odacantha melanura L.** Virum Mose, talrig i April og Maj.

**Batrisus venustus Reich.** Kjeld Skov <sup>16</sup>/<sub>6</sub> 1913, sigtet 13 Stkr. af Muld fra en hul Eg.

**Pselaphus dresdensis Hbst.** Kætset 1 Stk. ved Højbjergshus Sø, Øst for Rude Hegn <sup>11</sup>/<sub>5</sub> 1913.

**Euplectus bicolor Denny.** Kjeld Skov <sup>18</sup>/<sub>6</sub> 1913 enkelt i Muld under Egebark.

**Euthia plicata Gyll.** Christianssæde Skov, kætset 3 Stkr. omkring smaa Tuer af *Formica rufa* <sup>8</sup>/<sub>6</sub> 1913.

**Euthia Schaumi Kiesw.** I Lersøen, hvor denne Art tidligere er taget enkeltvis ved Kætsning, optraadte den i Aar i stort Antal over hele det med Skraldedyngner opfyldte Terræn mellem Tagensvej og Lyngbyvej, idet man kort før Solnedgang i Dagene fra 5—20 Septbr. kunde kætse den paa lave Planter og nedbanke den af Buske.

**Neuraphes rubicundus Schaum.** Kætset 1 Stk. ved Malmlosevej i Holte <sup>2</sup>/<sub>6</sub> 1913.