

same outbreak which gave a top year for Holland, and reached the northernmost part of Jutland than to consider them having been incidentally introduced, or having followed the usual direction of flight towards Spain to the British Isles.

The fact that 6 m.v. lamps placed in different parts of Denmark (Bornholm, Falster, Møen) have been able to attract a total of 23 specimens (the lamps attracting 4-8-5-4-1-1 specimens, respectively) at the same time (Aug. 2nd) shows that the number of individuals crossing Denmark that night must have been considerable.

---

### Berichtigung.

---

In meiner Aufsatz "Agromyziden aus Island" (Ent. Medd. XXVI 1953) sind folgende Zeilen hinzuzufügen (Seite 467, *Phytomyza Hedingi* nov. sp.):

Thorax matt, acr unregelmässig 2-3reihig. 2 ia-Härchen hinter der Naht. 2., 3. und 4. Flügelrandabschnitt verhalten sich wie 50:15:20.  $r_5$  gerade.

Die neue Art ist in Hendels Tabelle so einzuordnen:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 146. 3. Fühlerglied distal auffällig länger pubesziert.....                | 146a.                   |
| 146a. $r_5$ im ganzen allmählich zurückgebogen, an der Mündung gerade..... | <i>penicilla</i> Hend.  |
| — $r_5$ gerade.....  | <i>Hedingi</i> nov. sp. |

Nils Rydén.

---