

Fortegnelse
over de i Danmark levende
Cryptophagidae og Lathridiidae.

Af
E. A. Løvendal.

Cryptophagidae.

Telmatophilus.

*Heer Fauna Col. Helv. I. 417 *).

1. Caricis Oliv.

Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 393. — Thoms. Scand. Col. V.
243. — Reitter Bestimmtab. I. Ed. 2. 21.
Ips Caricis. Oliv. Ent. II. 18. 15. 23. Tab. 3. Fig. 23 a-b.
Cryptoph. Caricis. Gyll, Ins. Suec. II. Add. IV. 12.

Funden i Foraarsmaanederne fra Marts til Juni.
Nord- og Sydsjælland. Amager. Falster, ved
Lindeskov. Møen. Lolland, Bremersvold. Jylland,
Borreskov ved Randers. Alle vore 3 Arter faaes bedst
ved Sigtning af Opskyl fra Bredden af Sører.

2. Typhae Fall.

Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 393. — Thoms. Scand. Col. V.
244 — Reitter Bestimmtab. I. Ed. 2. 21.

^{*)} De med * betegnede Værker eller enkelte Bind af disse, der omhandle Cryptophagerne og Lathridierne, mangle paa Bibliothekerne; Citaterne her ere derfor paa anden Haand.

Cryptoph. Typh. Fall. Obs. Ent. I. 16. — Gyll. Ins. Suec. I. 174.

Paa samme Tid som den foregaaende. Nord- og Sydsjælland. Falster. Lolland, ved Freilev Skov og Bremersvold. Fyen, ved Hesbjerg. Jylland, ved Skjørping.

3. *Schønherri* Gyll.

Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 393. — Thoms. Scand. Col. V. 244. — Reitter Bestimmtab. I. Ed. 2. 21.

Cryptoph. Schønh. Gyll. Ins. Suec. I. 173.

Forekommer noget sparsommere end de to foregaaende Arter; den findes paa samme Tid som disse. Sjælland, ved Ladegaardsaaen, Dyrehaven, Lyngby Mose, Ørholm, Funkevang ved Hillerød, Hellebæk. Falster. Lolland, ved Bremersvold.

Antherophagus.

Latreille Règn An. IV. Éd. 2. 507.

1. *Nigricornis* Fabr.

Er. Naturg. Ins. D. III. 344. — Jacq. Duval Gen. Col. II. t. 51. fig. 251. — Thoms. Scand. Col. V. 246. — Reitter Bestimmtab. XVI. 18.

Mycetoph. nigric. Fabr. Syst. El. II. 569. 24.

Antheroph. silaceus Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 73. 2.

Cryptoph. silac. Gyll. Ins. Suec. I. 175. 13. — Schønh. Syn. II. 98. 14.

Funden i Juni, Juli og August. Sjælland, ved Kjøbenhavn af Dohlmann, Charlottenlund Koch, Dyrehaven Forf. Falster Schiødte. Lolland Schiødte. Fyen, ved Vejstrup Meinert, ved Faaborg paa Spiræa Ulmi Schiødte. Jylland, ved Skjørping Johansen. Alle 3 Arter af denne Slægt leve i Humlereder.

2. Silaceus Herbst.

Er. Naturg. Ins. D. III. 344. *Sturm Deutschl. Ins. XVIII. 65. Taf. 339. Fig. a. A. — Thoms. Scand. Col. V. 246. — Reitter Bestimmtab. XVI. 18.

Ips silacea Herbst Natursyst. Ins. IV. 169. 6. Taf. 42. Fig. 7.

Sjælden og hidtil ikke funden i mange Exemplarer. Sjælland, Ørholmsfælled Forf. Amagerfælled 7/1860 Forf. Falster Schiødte. Bornholm Schiødte. Jylland, Skagen Schiødte, Fanø 7/1885, Rosenkrantz.

3. Pallens Oliv.

Er. Naturg. Ins. D. III. 345. — *Sturm Deutschl. Ins. XVIII. 67. Taf. 340. Fig b. B. — Thoms. Scand. Col. V. 247. — Reitter Bestimmtab. XVI. 18.

Tenebrio pall. Oliv. Ent. III. 57. 19. 26. Tab. II. Fig. 25. — Herbst. Natursyst. Ins. VII. 257. 24. — VIII. 9. Taf. 117. Fig. 10.

Cryptoph. pall. Gyll. Ins. Suec. I. 177. — Schønh. Syn. II. 99. 15.

Den hyppigst forekommende Art, funden fra Mai til til ind i September. Sjælland, ved Kjøbenhavn, Lyngby Mose, Frederiksdal, Geel Skov, Strandmøllen. Lolland, ved Bremersvold og i Faursted Skov. Fyen, ved Odense og paa Fænø. Bornholm, ved Rønne, Rø og i Almindingen. Jylland, ved Veile, Rye, Aalborg og Hals Nørreskov.

Emphylus.

Erichson Naturgesch. Ins. Deutschl. III. 346.

1. Glaber Gyll.

Er. Naturg. Ins. D. III. 346. — Thoms. Scand. Col. V. 248. — Reitter Bestimmtab. XVI. 18.

Cryptoph. glab. Gyll. Ins. Suec. I. 178. — *Sturm

Deutschl. Ins. XVI. 110. 25. Taf. 319. Fig. F. c.
Antheroph. glab. Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. 73. 3.

Denne Art lever i Tuerne hos *Formica rufa*
og de med denne beslægtede Arter og forekommer i
Foraarsmaanederne. Sjælland, ved Bagsværd, Geel
Skov, Tokkekjøb Hegn, Teglstrup Hegn. Falster.
Møen, ved Marienborg. Fyen, ved Gjerup. Jylland,
ved Rye og Skjørping.

Cryptophagus.

Herbst Natursystem all. Insekten IV. 172.

(*Kryptophagus* hos Herbst).

De talrige Arter af denne Slægt ere for den største
Del Skimmelædere.

1. *Lycoperdi* Herbst.

Herbst Natursyst. Ins. IV. 176. 5. Taf. 142. Fig. 18. — Payk.
Fn. Suec. III. 355. 5. — Gyll. Ins. Suec. I. 166. —
Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 75. 6. — *Sturm
Deutschl. Ins. XVI. 74. Taf. 314. Fig. B. — Er.
Naturg. Ins. D. III. 349. — Thoms. Scand. Col. V.
251.

Dermestes Lycoperdi Fabr. Syst. El. I. 315. 17.

Ikke almindelig; den lever i Bovister og er funden
i Maanederne Juni, Juli, August og September. Sjælland,
Dyrehaven, især i Bøllemosen, ved Fuglevad
Mølle, Grib Skov. Møen. Falster og Lolland.
Jylland, ved Veile, Rye, Sophiendal, Lindum Skov ved
Onsild, og i Grindsted ved Aalborg.

2. *Pilosus* Gyll.

Gyll. Ins. Suec. IV. 287. — *Sturm. Deutschl. Ins. XVI.
64. 1. Taf. 313. Fig. A. — Er. Naturg. Ins. D. III.
352. — Thoms. Scand. Col. V. 252. — Reitter
Bestimmtab. XVI. 21.

Temmelig almindelig og udbredt; i Kompostmøddinger i Haver, i Bagerier, paa Fyrvampe o. s. v. Den er funden hele Sommeren igjennem ligefra Marts til October. Nord og Midtsjælland. Falster. Lolland. Jylland, fra Veile til Aalborg. Findes ogsaa i Nordamerika (efter Reitter).

3. *Schmidti* Sturm.

*Sturm Deutschl. Ins. XVI. 93. 16. Taf. 316. Fig. C. — Er. Naturg. Ins. D. III. 350. — Reitter Bestimmtab. XVI. 23.

Temmelig sjælden; den er funden fra Mai til October. Som oftest sigtes den i Løv ved Foden af større Træer, men er ogsaa funden i Bagerier og i Rosenborg Champignonhus. Sjælland, København, Dyrehaven, Ørholm, Lethraborg, Vallø og Thureby af Forf. Falster Schiødte. Lolland, ved Aalholm, Maglemer Havløkke og Bremersvold Forf. Fyen, ved Marienlund N. P. Jørgensen. Jylland, ved Skjørping og Aalborg Johansen.

4. *Setulosus* Sturm.

*Sturm Deutschl. Ins. XVI. 92. 15. Taf. 316. Fig. B. — Er. Naturg. Ins. D. III. 351. — Thoms. Scand. Col. V. 251. — Reitter Bestimmtab. XVI. 23.

Temmelig sjælden; den er funden fra Marts til November. Sjælland, ved Lyngby Mose Jacobsen, Søborg Sø N. P. Jørgensen, Tidsvilde og Hornbæk Forf., Boserup Skov Schiødte. Møn Schiødte. Falster ved Risørup og Horbeløv Koch og Schiødte. Lolland, i Sundby Storskov Schiødte og Holstebroe. Fyen, ved Marienlund N. P. Jørgensen. Jylland, ved Taps Holstebroe, ved Veile N. P. Jørgensen, ved Rye Schiødte.

5. *Affinis* Sturm.

*Sturm Deutschl. Ins. XVI. 79. 8. Taf. 314. Fig. C. c. — Er. Naturg. Ins. D. III. 360. — Thoms. Scand. Col. V. 262. — Reitter Bestimmtab. XVI. 24.

Almindelig og udbredt over hele Landet; den forekommer fra Marts til October, saavel i Huse, saaledes i Møller og Bagerier, som i det Frie i gammel Halm, i Svanpe eller i Kompostmøddinger i Haver.

6. Cellaris Scop.

Er. Naturg. Ins. D. III. 361. — Thoms. Scand. Col. V. 261. — Reitter Bestimmtab. XVI. 24.

Derm. cell. Scop. Ent. Carn. 16. 42. Herbst Arch. d. Insekten gesch. von Füessly IV. 22. 12. Taf. 20. Fig. 5.

Kryptophagus crenatus Herbst Natursyst. Ins. IV. 177.

6. Taf. 42. Fig. 14. — *Sturm Deutschl. Ins. XVI. 70. 4. Taf. 13. Fig. D.

Ikke saa almindelig som den foregaaende Art; den forekommer paa samme Tid og paa lignende Steder som denne. Sjælland, Kjøbenhavn oftere i Møller og Bagerier, Dyrehaven, Ørholm. Falster. Jylland, ved Taps, Horsens, Rye, Randers, Aalborg og i Vendssyssel. Findes ogsaa i Nord og Sydamerika (efter Reitter).

7. Acutangulus Gyll.

Gyll. Ins. Suec. IV. 285. 3—4. — *Sturm Deutschl. Ins. XVI. 72. 5. Taf. 314. Fig. A. — Er. Naturg. Ins. D. III. 362. — Thoms. Scand. Col. V. 257. — Reitter Bestimmtab. XVI. 25.

Var. Waterhousei *Rye Ent. Monthl. Mag. III. 1866. 101.

Var. Heydenii Reitter Bestimmtab. XVI. 24. Mangler Midtertand paa Thorax.

Meget almindelig og udbredt over hele Landet; den forekommer lige fra Foraaret til langt hen paa Eftersommeren. Varieteten Heydenii er taget i Dyrehaven af Forf. Funden ogsaa paa Cuba (efter Reitter).

8. Populi Payk.

Payk. Fn. Suec. III. 355. 4. — Gyll. Ins. Suec. I. 165. 1.

— Thoms. Scand. Col. V. 257. — Reitter Bestimmtab. XVI. 25.

Cryptoph. grandis Kraatz Stett. ent. Zeitschr. 17. Jahrg. 1856. 240.

En af de sjældnere Arter. Sjælland, klækket i stort Antal i Juli 1869 af en gammel Pil fra Strandmøllen ved Drewsen. Falster, Riserup $\frac{24}{3}$ 1875 Koch. Lolland, klækket i Antal i Juli og August 1888 af Træ fra Bremersvold Forf., Roden Skov paa Risgjærder Juli 1884 Forf., Faursted Skov ved Nakskov Juli 1886 Holstebroe; desforuden er den tagen af Schiødte paa Lolland, Falster og Fyen.

9. *Fumatus* Marsh.

Gyll. Ins. Suec. I. 167. 3. — IV. 285. 3. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 76. 7. — Er. Naturg. Ins. D. III. 363. — Thoms. Scand. Col. V. 257. — Reitter Bestimmtab. XVI. 25.

Corticaria fumata. Marsh. Ent. Brit. I. 110.

Sjælden. Et Stykke i Dyrehaven 7/1869 Forf., et andet i Dronninglund Storskov i Vendsyssel $\frac{10}{9}$ 1871, ligeledes af Forf.

10. *Quercinus* Kraatz.

Kraatz Stett. ent. Zeitschr. 13. Jahrg. 1852. 228. — Reitter Bestimmtab. XVI. 25.

Kun to Stykker, begge fundne paa en Tømmerplads i Kjøbenhavn $\frac{21}{8}$ 1881 og 9/1886 af Forf.; det sidste Stykke fandtes under Fyrrebark.

11. *Badius* Sturm.

*Sturm Deutschl. Ins. XVI. 96. 17. Taf. 317. Fig. A. — Er. Naturg. Ins. D. III. 357. — Thoms. Scand. Col. V. 254. — Reitter Bestimmtab. XVI. 25.

Hører til de sjældnere, men udbredte Arter. Sjælland, Kjøbenhavn i Vinkjælder Meinert, Dyre-

haven $\frac{26}{5}$ 1870, $\frac{21}{6}$ 1877, $\frac{7}{9}$ 1873, $\frac{23}{11}$ 1881 Koch og Forf., Brede $\frac{9}{4}$ 1882 hos Form. fulig. Forf., Lethraborg $\frac{22}{4}$ 1886, $\frac{18}{5}$ 1886 i Pil med Form. fulig. Forf., Jægerspris $\frac{28}{6}$ 1880 Forf., ved Valsølille Sø i Eg $\frac{10}{5}$ 1887 Forf., Suserup Skov Jacobsen. Lolland, Søholt $\frac{28}{6}$ 1881 Forf., Christianssæde $\frac{27}{6}$ 1881 Forf., Bremersvold $\frac{15}{7}$ 1888 Forf. Fyen, Fruens Bøge ved Odense $\frac{24}{5}$ 1889, $\frac{10}{10}$ 1886 N. P. Jørgensen, Killerup $\frac{3}{9}$ 1889 N. P. Jørgensen. Jylland, Rugballegaard ved Veile $\frac{10}{6}$ 1889 Fabritius de Tengnagel, Silkeborg hos Form. fulig. Schiødte, Dronninglund i Vendsyssel $\frac{10}{9}$ 1871 Forf.

12. *Ruficornis* Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 78. 12. — Reitter Bestimmtab. XVI. 26.

Cryptophag. umbratus Er. Naturg. Ins. D. III. 355. — Thoms. Scand. Col. V. 254.

Ogsaa temmelig sjælden. Funden Sommeren igjen nem fra Marts til September. Sjælland, Rosenborg Have Forf., Dyrehaven Forf., Brede Jacobsen, Lethraborg i en hul Bøg og under Løv Forf., Vallø Forf., Thureby Forf., Jægerspris Koch. Falster, Nykøbing Fabritius de Tengnagel. Lolland, Christianssæde Skov Forf. Jylland, ved Horsens.

13. *Distinguendus* Sturm.

*Sturm Deutschl. Ins. XVI. 90. 14. Taf. 316. Fig. A. — Er. Naturg. Ins. D. III. 365. — Thoms. Scand. Col. V. 258. — Reitter Bestimmtab. XVI. 26.

Funden fra Marts til Juli. Sjælland, Kjøbenhavn i Møller Forf., i Vinkjældere Meinert, Rosenborg Have Forf., Dyrehaven i gml. Halm Forf. Falster, Nykøbing Fabritius de Tengnagel. Jylland, Rugballegaard ved Veile Fabritius de Tengnagel, Randers, Valby ved Aalborg og i selve Aalborg i Bladjord Johansen.

14. Labilis Er.

Er. Naturg. Ins. D. III. 359. — Thoms. Scand. Col. V. 255. — Reitter Bestimmtab. XVI. 28.
En af de sjældnest forekommende Arter. Sjælland, Dyrehaven under Bark $\frac{28}{4}$ 1879, $\frac{7}{8}$ 1874, $\frac{19}{10}$ 1872 Forf., Vallø $\frac{21}{5}$ 1886 Forf.

15. Scutellatus Newm.

Newm. Ent. Mag. II. 1834. 202. — Reitter Bestimmtab. XVI. 29.

Cryptoph. bicolor *Sturm Deutschl. Ins. XVI. 107. 23.
Taf. 319. Fig. A. (Cr. rufipennis). — Er. Naturg. Ins. D. III. 366.

Dermestes crenatus Fabr. Syst. El. I. 319. 41.

Cryptoph. crenat. Gyll. Ins. Suec. I. 171. 6. — Thoms. Scand. Col. V. 263.

Funden fra April til September og ikke almindelig.
Sjælland, Kjøbenhavn i en Stald og i Vinkjælder Meinert og Forf., Dyrehaven, klækket af Pil fra Ørholm Drewsen, Jægerspris Nordskov i en gammel Eg Forf. Jylland, Randers i en Kjælder Jacobsen, Aalborg i en Kompostmødding Johansen.

16. Dentatus Herbst.

*Sturm Deutschl. Ins. XVI. 67. 2. Taf. 313. Fig. B. —
Er. Naturg. Ins. D. III. 364. — Thoms. Scand. Col. V. 256. — Reitter Bestimmtab. XVI. 29.

Kateretes dentatus Herbst Natursyst. Ins. V. 15. 6. Taf. 45. Fig. 6.

En af de almindeligste Arter, der forekommer hele Sommeren igjennem, saavel i det Frie, som i Kjældere, Bagerier, Møller, Lader og lignende Steder.

17. Saginatus Sturm.

*Sturm Deutschl. Ins. XVI. 88. 13. Taf. 315. Fig. D. —

Er. Naturg. Ins. D. III. 354. — Thoms. Scand. Col. V. 254. — Reitter Bestimmtab. XVI. 29.

Almindelig hele Sommeren igjennem; hyppigst findes den i Bagerier, Møller og Lader, men forekommer ogsaa i det Frie, især ved Svampe. Som Følge af denne Arts Levemaade tages den altsaa hyppigst i Byerne. Sjælland, Kjøbenhavn. Falster, Nykøbing. Jylland, Rugballegaard ved Veile, Aarhus, Randers og Aalborg, sidstnævnte Sted saavel i Bagerier, som i tørrede Kirsebær. Funden ogsaa i Chili (efter Reitter).

18. *Subfumatus* Kraatz.

Kraatz Stett. ent. Zeitschr. 17 Jahrg. 1856. 241. — Reitter Bestimmtab. XVI. 30.

Hører til de sjældnere Arter. Sjælland, Dyrehaven $\frac{24}{9}$ i Hatsvampe Schiødte, 5/1878 og $\frac{9}{5}$ 1886 sigtet ved Foden af Træer Forf., Kjøbenhavn $\frac{22}{6}$ 1880 paa en Tømmerplads Forf. Falster, Orehoved Forf.

19. *Scanicus* Linn.

*Sturm Deutschl. Ins. XVI. 82. 10. Taf. 315. Fig. A. — Er. Naturg. Ins. D. III. 356. — Thoms. Scand. Col. V. 253. — Reitter Bestimmtab. XVI. 31.

Dermestes scanicus Linn. Fn. Suec. 146. 457.

Dermestes cellaris Fabr. Syst. El. I. 319. 40.

Cryptoph. cell. Payk. Fn. Suec. III. 356. 6. — Gyll. Ins. Suec. I. 168. 4.

Var. *Totus pallide testaceus*.

Cryptoph. cell. *Sturm Deutschl. Ins. XVI. 84. 11. Taf. 315. Fig. B.

Temmelig almindelig. Forefindes fra Foraarsmaanedene til ind i October. Sjælland. Bornholm. Møn. Falster. Lolland. Jylland.

Den røde Varietet er funden i Dyrehaven 5/1878 og $\frac{1}{7}$ 1872 Forf. Arten findes ogsaa i Mexico (efter Reitter).

20. Validus Kraatz.

Kraatz Stett. ent. Zeitschr. 17 Jahrg. 1856. 240.

Cryptoph. scanicus Var. Reitter Bestimmtab. XVI. 31.

Ikke almindelig. Sjælland, Kjøbenhavn i Vin-kjælder Meinert, 7/1884 Forf., Boserup i Svamp Forf. Jylland, Horsens $\frac{7}{4}$ O. G. Jensen, Randers $\frac{1}{4}$ 1883 og $\frac{14}{8}$ 1886 Jacobsen, Aalborg 5/1889 i tørrede Kirsebær Johansen.

21. Subdepressus Gyll.

Gyll. Ins. Suec. IV. 287. 4—5. — *Sturm Deutschl. Ins.

XVI. 99. 19. Taf. 317. Fig. C. — Er. Naturg. Ins.

D. III. 368. — Reitter Bestimmtab. XVI. 31.

Cryptoph. depressus Thoms. Scand. Col. V. 259.

Sjælden. Arten lever ligesom Micrambe abietis paa Gran og Fyr, hvorfra den kan nedbankes. Sjælland, Geel Skov $\frac{16}{6}$ 1889, $\frac{13}{7}$ 1888, $\frac{16}{7}$ 1889 Jacobsen, Holstebroe og Forf., Rudehegn $\frac{26-28}{5}$ 1871 Forf., Billesborg Skov ved Kjøge $\frac{13}{7}$ 1879 Forf. Falster, Nykjøbing $\frac{12}{8}$ 1891 Fabritius de Tengnagel.

22. Corticinus Thoms.

Thoms. Scand. Col. V. 260. — Reitter Bestimmtab. XVI. 31.

Et enkelt Stykke i Kjøbenhavn $\frac{13}{8}$ 1879 paa en Tømmerplads Forf.

23. Pubescens Sturm.

*Sturm Deutschl. Ins. XVI. 103. 21. Taf. 318. Fig. B. —

Er. Naturg. Ins. D. III. 370. — Thoms. Scand. Col. V. 362. — Reitter Bestimmtab. XVI. 32.

En sjælden og interessant Art, der især er mærkelig ved, at det første Antenneled i Køllen er ganske lille, omrent af Størrelse som det 8de Antenneled, hvorved det ser ud, som om Køllen kun var toleddet.

Imidlertid har jeg ogsaa en Form af denne Art, der tydelig viser 3 Led i Køllen; af begge Former har jeg begge Kjønnene i Antal, men jeg har ikke kunnet paapege nogen virkelig Formforskjel eller andet, der kunde berettige til at opstille den med de 3 Led i Køllen som en egen Art, hvorfor jeg blot opstiller den som en Form af *Cr. pubescens*, uagtet alle Forfattere angive Antennekøllen hos *Cr. pubescens* som kun 2-leddet.

Der forekommer tillige en Varietet af denne Art med mørke Dækvinger og rødt Thorax, altsaa nærmest en Farvetegning som hos Hovedformen af *Cr. scanicus*; heller ikke denne Varietet har jeg set omtalt nogetsteds.

Formen med 2-leddet Antennekølle.

Sjælland, Dyrehaven 8/1875 Forf., Brede $\frac{5}{10}$ 1872 i en Vesperede Forf., Geel Skov $\frac{27}{6}$ 1888 Jacobsen, Ørholm $\frac{29}{6}$ 1875 klækket af Pil Drewsen, Svenstrup ved Borup Station $\frac{12}{7}$ 1881 Forf. Falster, Riserup 8/1891 Koch. Fyen, Tommerup N. P. Jørgensen. Jylland, Lindum Skov ved Onsild Station $\frac{30}{5}$ 1886 paa Eg Jacobsen.

Formen med 3-leddet Antennekølle.

Sjælland, Kjøbenhavn $\frac{19}{6}$ 1887 paa Tømmerplads Forf., Dyrehaven $\frac{15}{6}$ 1876 i en Humlerede, $\frac{9}{5}$ 1886, $\frac{30}{5}$ 1878, $\frac{30}{8}$ 1875 sightet ved Foden af Træer Forf., Ørholm $\frac{29}{6}$ 1875 klækket af Pil Drewsen. Lolland, Roden Skov $\frac{6}{7}$ 1884 Forf. Jylland, Lindum Skov 6/1885 paa Svamp.

Micrambe.

Thomson Scandinav. Coleopt. V. 263.

1. *Bimaculata* Panz.

Reitter Bestimmtab. XVI. 33.

Cryptoph. bimaculatus. Gyll. Ins. Suec. I. 172. 8. —

*Sturm Deutschl. Ins. XVI. 105. 22. Taf. 318. Fig. C.

— Er. Naturg. Ins. D. III. 366. — Thoms. Scand.
Col. V. 280.

Dermestes bimac. Panz. Fn. Germ. 57. 7.

Funden hele Sommeren igjennem fra April til langt ind i November. Sjælland, Lyngby Mose, Dyrehaven, Brede, Rudehegn, Selsølund, Bognæs, Lethraborg, Vallø. Fyen, Fænø. Jylland, Floes Skov ved Randers, Buderuplund, Skjørping, Restrup og Strandby ved Aalborg, i selve Aalborg og ved Skagen.

2. *Villosus* Heer.

Reitter Bestimmtab. XVI. 33.

Cryptoph. *vilosus*. *Heer Fn. Col. Helv. I. 425.

Paramecosoma *pilosula*. Er. Naturg. Ins. D. III. 373.

Micrambe *pilos*. Thoms. Scand. Col. V. 264.

Fra April til ind i October og funden under de forskjelligste Forhold, saasom i Bagerier, paa blomstrende Gyvel, paa Risgjærder og under Løv. Sjælland, Kjøbenhavn, Borreveile Skov ved Roeskilde, Tidsvilde, Hornbæk, Svenstrup ved Borup Station. Falster. Lolland, Roden Skov. Fyen, Killerup. Jylland, Veile, Rye, Funder Bakker, Onsild Krat, Lindum Skov, Aalborg, Dronninglund Storskov og Skagen.

3. *Abietis* Payk.

Thoms. Scand. Col. V. 264. — Reitter Bestimmtab. XVI. 34.

Cryptoph. *abiet*. Payk. Fn. Suec. III. 356. 7. — Gyll.

Ins. Suec. I. 170. 5. — IV. 288. 5. — Steph. Ill.

Brit. Ent. Mand. III. 77. 9. — *Sturm Deutschl. Ins. XVI. 86. 12. Taf. 315. Fig. C.

Paramecosoma *abiet*. Er. Naturg. Ins. D. III. 372.

Fra April til September paa Gran. Nord- og Midtsjælland. Lolland, Roden Skov. Jylland, ved Veile og Skjørping.

Henoticus.

Thomson Scandinav. Coleopt. X. 67.

1. Serratus Gyll.

Thoms. Scand. Col. X. 67. — Reitter Bestimmtab. XVI. 34.

Cryptoph. serratus. Gyll. Ins. Suec. I. 171. 7. — *Sturm Deutschl. Ins. XVI. 109. 24. Taf. 319. Fig. B. — Thoms. Scand. Col. V. 250.

Paramecosoma serrata. Er. Naturg. Ins. D. III. 374.
Et enkelt ældre Stykke fra Nordsjælland Forf.

Paramecosoma.

Curtis i Newman Entomol. Magazine I. 1833. 186. —
Brit. Ent. II. Tab. 606.

1. Melanocephalum Herbst.

Er. Naturg. Ins. D. III. 373. — Thoms. Scand. Col. V. 266. — Reitter Bestimmtab. XVI. 19.

Latridius melanoc. Herbst Natursyst. Ins. V. 9. 9. Taf. 44. Fig. 9.

Cryptoph. fungorum Gyll. Ins. Suec. I. 172. 9.

Sjælden og enkeltvis forekommende især paa fugtige Steder. Sjælland, ved Lellinge Aa $\frac{2}{4}$ 1889 Forf., Sus Aa ved Næstved $\frac{2}{7}$ 1872 Forf.; desforuden haves et enkelt Stykke, hvortil Lokaliteten ikke er absolut sikker, men som dog efter al Rimelighed skriver sig fra Omegnen af København Forf. Fyen ved Odense $\frac{2}{4}$ 1889 N. P. Jørgensen.

Caenoscelis.

Thomson Scandinav. Coleopt. V. 266.

1. Ferruginea Sahlb.

Thoms. Scand. Col. V. 267. — Reitter Bestimmtab. XVI. 35.

Cryptoph. ferrug. Sahib. Ins. Fenn. I. 58. 11. — Gyll.

Ins. Suec. IV. 290. 12—13.

Atom. ferrug. Er. Naturg. Ins. D. III. 377.

Denne hører til de sjældneste Arter af Atomarie. Sjælland, et enkelt Stykke rimeligvis fra Omegnen af København Schlick, et andet Stykke fra Boserup Skov $\frac{26}{4}$ 1874 Koch. Fyen, ved Odense $\frac{6}{4}$ 1890, en lille Række, N. P. Jørgensen.

Agathengis.

*Gozis Recherche de l'espèce typique 1886. 10.

1. *Fimetarii* Herbst.

Reitter Bestimmtab. XVI. 36.

Dermestes fimet. Fabr. Syst. El. I. 316. 20.

Kateretes fimet. Herbst Naturs. Ins. V. 14. 4. Taf. 45. Fig. 4.

Cryptoph. fimet. Gyll. Ins. Suec. I. 181. 20. — Schønh.

Synonym. II. 99. 21.

Atom. fimet. Er. Naturg. Ins. D. III. 377. — Thoms.

Scand. Col. V. 268.

Hører ogsaa til de sjældne Arter. Sjælland, Sorø et enkelt Stykke Schlick. Jylland, ved Sjørring Sø $\frac{5}{10}$ 1889 Fabritius de Tengnagel, Thisted $\frac{14}{1}$ 1890 Samme.

2. *Umbrina* Gyll

Reitter Bestimmtab. XVI. 37.

Cryptoph. umbr. Gyll. Ins. Suec. IV. 291. 20—21.

Atom. fumata Er. Naturg. Ins. D. III. 378. — Thoms.

Scand. Col. V. 270.

Forekommer fra Marts til September. Sjælland, Ler Sø, Dyrehaven, Lyngby Mose, Geel Skov, Sorø. Falster, Orehoed, Nykjøbing. Fyen, Marienlund ved Odense, Tommerup, Langensø, Faaborg. Jylland, Rye, Frijsenborg, Dronningborg Skov ved Randers, Restrup ved Aalborg, Dronninglund i Vendsyssel.

3. Nigriventris Steph.

Reitter Bestimmtab. XVI. 38.

Atom. nigriv. Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 69. 20.

Atom. nana Er. Naturg. Ins. D. III. 379. — Thoms.
Scand. Col. V. 271.

Som den foregaaende fra Marts, men funden indtil i December. Sjælland, Ler Sø, Charlottenlund, Dyrehaven, Lyngby Mose, Søborg Sø, Sorø, Hulemose Sø ved Vordingborg. Amager. Falster, Horbelev, Risrup, Lindeskov, Nykøbing. Lolland, Bremersvold. Fyen, Marienlund ved Odense, Killerup, Gjerup, Langensø. Jylland, Frijsenborg, Viby Krat ved Aarhus, Lundbjerg Skov ved Randers.

4. Fuscicollis Mannh.

Reitter Bestimmtab. XVI. 41.

Atom. fuscic. Mannh. Bull. Soc. Imp. Natural. Mosc. 1852. 338.

Atom. umbrina Er. Naturg. Ins. D. III. 380. — Thoms.
Scand. Col. V. 273.

Funden fra Marts til September. Sjælland, Utterslev Mose, Damhusmosen, Ermelund, Dyrehaven, Lyngby Mose, Fuglevad, Frederiks dal, Sæl Sø, Boserup, Lethraborg, Aunø ved Hvalsø Station, Lellinge Skov, Sorø, Hulemose Sø ved Vordingborg. Falster, Ravnstrup Eng, Nykøbing. Lolland, Lysemose, Bremersvold. Fyen, Fruens Bøge. Jylland, Munkebjerg, Braband Sø, Randers, Aalborg, Dronninglund.

5. Diluta Er.

Reitter Bestimmtab. XVI. 39.

Atom. dilut. Er. Naturg. Ins. D. III. 380.

Et Stykke fra Arreskov ved Faaborg Schiødte.

6. Prolixa Er.

Reitter Bestimmtab. XVI. 40.

Atom. prol. Er. Naturg. Ins. D. III. 381.

Nordsjælland. Jylland, Hals Nørreskov $\frac{4}{6}$
1890 Forf., Restrup ved Aalborg 5/1891 Johansen.

7. *Procerula* Er.

Reitter Bestimmtab. XVI. 40.

Atom. proc. Er. Naturg. Ins. D. III. 382.

Atom. longicornis? Thoms. Scand. Col. V. 269.

Sjælden, enkeltvis i Dyrehaven $\frac{23}{5}$ 1871 Forf.

8. *Alpina* Heer.

Reitter Bestimmtab. XVI. 39.

Atom. alp. *Heer Fn. Col. Helv. I. 430.

Atom. elongatula Er. Naturg. Ins. D. III. 383. — Thoms. Scand. Col. V. 271.

Sjælland, ved København $\frac{13}{3}$ 1871 i en Have Schlick; Ler Sø $\frac{8}{3}$ 1872 Schlick. Lolland, Bremersvold 6/1888 Forf. Jylland, Aalborg Johansen, Hals Nørreskov $\frac{2}{6}$ 1891 Forf.

9. *Pulchra* Er.

Atom. pulch. Er. Naturg. Ins. D. III. 383.

Agathengis prolixa var. pulchra Reitter Bestimmtab. XVI. 41.

Viby Krat ved Aarhus $\frac{3}{4}$ 1884 i Sigtegods meddelt af Rosenkrantz.

10. *Linearis* Steph.

Reitter Bestimmtab. XVI. 38.

Atom. lin. Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 70. 21. — Er. Naturg. Ins. D. III. 384. — Thoms. Scand. Col. V. 273.

Funden i April, Mai, Juni og i October. Sjælland, ved København, Dyrehaven, Hulemose Sø ved Vordingborg. Amager. Falster, Nykøbing. Lolland, Aalholm og Bremersvold. Fyen.

Efter forskjellige Beretninger i tydske og østerrigske landøkonomiske Tidsskrifter skal Arten gjøre Skade paa Roer.

Atomaria.

Stephens Ill. Brit. Entom. Mandib. III. 64.

Anchicera Thoms. Scand. Col. V. 274.

1. *Mesomelas* Herbst.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 67. 11. — Er. Naturg.
Ins. D. III. 386. — Reitter Bestimmtab. XVI. 43.

Dermestes mesomelus Herbst Natursyst. Ins. IV. 143.
24. Taf. 41. Fig. 7. — Payk. Fn. Suec. III. 448.
20—21.

Cryptoph. mesomelus Gyll. Ins. Suec. I. 180. 19. —
Schønh. Syn. II. 99. 20.

Anchic. mesomelas Thoms. Scand. Col. V. 283.

Almindelig over hele Landet og funden fra Foraar til Efteraar. Der findes forskjellige Varieteter af denne Art; der forekommer saaledes Individer med helt sorte, eller helt gule Vingedækker, dels Varieteter med rødt Thorax.

2. *Reitteri* n. sp.

Oblonga, convexa, nigra, nitida, tenuiter ac breviter griseo-pubescent. Thorax valde fornicatus, pæne latitudinis coleoptrorum, lateribus pæne angulatis, post leviter impressus, obscure marginatus. Elytra manifesto punctata, ad apicem læviuscula. Antennæ rufo-testaceæ, clava picea. Pedes fusci, tibiarum basi tarsisque rufo-testaceis.

Long. 1,5 Mm.

Descriptio uberior: Atom. mesomelati proxima, (nigra) concolor, statura longior ac angustior. Caput ut in Atom. mesomelate, subtiliter punctatum. Antennæ

breviores, multo crassiores quam in Atom. mesom., rufo-testaceæ, clava magis expressa, picea, articulis 4, 6, 8 quam ceteris minoribus, articulo tertio quam secundo breviore, vix tenuiore (in Atom. mesomelate articulus tertius productus tenuis, articulo secundo multo tenuior). Thorax pæne gibber, multo magis fornicatus quam in Atom. mesomelate, dense manifesto punctatus, pæne latitudinis coleoptrorum, large sesqui latior quam longior, in medio latior, ante angustatus, lateribus pæne angulatis, angulis anticis obtusis, angulis baseos pæne rectis, basi leviter impressus, margine medio leviter elevato. Scutellum punctatum. Coleoptra longiora quam in Atom. mesomelate, fornicata, lateribus fere parallelis, pæne duabus partibus cum dimidia thorace longiora; elytra ante densius, manifesto, post tenuius, parcus punctata. Pedes fusci, tibiis basi tarsisque rufo-testaceis.

Sjælden; en lille Række Individer fra Aunsø i Valsø Skov ved Hvalsø Station $\frac{1}{5}$ 1885 Forf.; en anden lille Række fra Valsølille Sø ved Borup Station $\frac{14}{5}$ 1881 Forf.

3. *Gutta* Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V. 407. 12 a. — Er. Naturg.

Ins. D. III. 387. — Reitter Bestimmtab. XVI. 43.

Anthic. gutta Thoms. Scand. Col. V. 284.

Temmelig sjælden. Arten er funden fra Marts til October. Sjælland, Ler Sø, Ladegaards Aa, Christianshavns Vold, Lyngby Mose, Skodsborg Strand, Søborg Sø. Amager, paa Østerstranden. Falster, Nykjøbing. Den er funden af Schiødte, Meinert, Schlick, Koch, N. P. Jørgensen, Fabritius de Tengnagel og Forf. Der forekommer ogsaa en rustrød Varietet af denne Art.

4. *Rhenana* Kraatz.

Atom. Rhenonum (sic) Kraatz Stett. ent. Zeit. 14 Jahrg. 1853. 96.

Atom. gutta var. Rhenana Reitter Bestimmtab. XVI. 43.

Funden Sommeren igjennem fra April til October. Oftere findes den i Haver i Plantemøddinger. Sjælland, Ler Sø, Slukefter Have, Vesterfælled. Amager. Falster, Horbelev. Lolland, Bremersvold. Jylland, Randers, Aalborg og ved Frederikshavn i Flyvesand.

5. *Gravidula* Er.

Er. Naturg. Ins. D. III. 395. — Reitter Bestimmtab. XVI. 44.

Hører til de sjældnere Arter. Sjælland, Lyngby Mose $\frac{1}{4}$ 1871, $\frac{11}{4}$ 1875 og $\frac{19}{4}$ 1878 Koch og Forf., Geel Skov $\frac{26}{4}$ 1886 Forf., Dyrehaven $\frac{30}{5}$ 1878 Forf., Aldershvile 7/1879 Forf., Selsølund $\frac{14}{5}$ 1874 Koch.

6. *Fuscata* Schønh.

Er. Naturg. Ins. D. III. 394. — Reitter Bestimmtab. XVI. 44.

Cryptoph. fuscatus Schønh. Syn. II. 100. 26.

Anchic. fuscata Thoms. Scand. Col. V. 284.

Temmelig sjælden. Sjælland, ved Ladegaardsaaen $\frac{27}{3}$ 1874 Koch, Lyngby Mose 5/1876 Forf., Tidsvilde $\frac{18}{5}$ 1891 Forf., Skarritsø $\frac{23}{5}$ 1844, Pastor Jacobsen, Hulemose Sø ved Vordingborg $\frac{20}{5}$ 1888 Forf. Fyen, Fruens Bøge $\frac{20}{6}$ 1886 N. P. Jørgensen, Marienlund $\frac{22}{4}$ 1886 N. P. Jørgensen, Faaborg $\frac{7}{7}$ 1870 Schlick.

7. *Atricapilla* Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 66. 6. — Reitter Bestimmtab. XVI. 45.

Anchic. atric. Thoms. Scand. Col. V. 282.

Atom. nigriceps Er. Naturg. Ins. D. III. 396.

Især i Føraarsmaanederne; almindelig over hele Landet.

Ogsaa funden i Mexico (efter Reitter).

8. *Tumulorum* Villa.

*Villa Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. 48. — Reitter Bestimmtab. XVI. 45.

Atom. bicolor Er. Naturg. Ins. D. III. 390.

Atom. Berolinensis? Kraatz Stett. ent. Zeit. 14 Jahrg. 1853. 94.

Anchic. Berolinensis? Thoms. Scand. Col. X. 72.

Sjælland, Christianshavns Vold $\frac{8}{4}$ 1875 Koch,
Lethraborg $\frac{15}{5}$ 1886 Forf., Søborg Sø N. P. Jørgensen.
Falster, Nykøbing Fabritius de Tengnagel, Riserup
 $\frac{27}{3}$ 1875, $\frac{26}{12}$ 1875 Koch. Lolland, Bremersvold $\frac{6}{4}$
1888 Forf. Fyen, Fruens Bøge $\frac{15}{4}$ 1886, $\frac{19}{4}$ 1891 og
 $\frac{23}{7}$ 1890 N. P. Jørgensen, Hesbjerg $\frac{15}{6}$ 1890 Jørgensen,
Faaborg $\frac{7}{7}$ 1870 Schlick. Jylland, Randers Jacobsen.

9. *Atra* Herbst.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 67. 13. — Er. Naturg. Ins. D. III. 392. — Reitter Bestimmtab. XVI. 45.

Kateretes ater Herbst Natursyst. Ins. V. 15. 5. Taf. 45.
Fig. 5.

Cryptoph. ater Gyll. Ins. Suec, I. 179. 18. — Schönh.
Syn. II. 99. 19.

Sjælland, Ørholm $\frac{27}{10}$ 1867 i Halmstakke Schlick,
Bøllemosen $\frac{16}{5}$ 1871 Forf. Amager Forf. Fyen,
Marienlund $\frac{20}{4}$ 1886 N. P. Jørgensen. Jylland, Viby
Krat ved Aarhus $\frac{19}{3}$ 1884 Rosenkrantz.

10. *Peltata* Kraatz.

Kraatz Stett. ent. Zeit. 14 Jahrg. 1853. 95. — Reitter Bestimmtab. XVI. 46.

Anchic. pelt. Thoms. Scand. Col. V. 280.

Sjælland, Ørholm $\frac{25}{10}$ 1871 Forf., Hulemose Sø
ved Vordingborg $\frac{20}{5}$ 1888 Forf.

11. Cognata Er.

Er. Naturg. Ins. D. III. 392.

Et Par ældre Stykker, det ene fra Kjøbenhavns Omegn, det andet fra Amager Forf.

12. Fuscipes Gyll.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 68. 15. — Er. Naturg.

Ins. D. III. 388. — Reitter Bestimmtab. XVI. 46.

Cryptoph. fuscip. Gyll. Ins. Suec I. 182. 21.

Anthic. fuscip. Thoms. Scand. Col. V. 280.

Fra Foraar til Efteraar; almindelig over hele Landet.

13. Pusilla Schönh.

*Heer Fn. Col. Helv. I. 432. 15. — Er. Naturg. Ins. D. III. 397. — Reitter Bestimmtab. XVI. 46.

Dermest. pusillus Payk. Fn. Suec. I. 292. 23.

Cryptoph. pusillus Gyll. Ins. Suec. I. 183. 22. — Schönh.
Syn. II. 100. 23.

Anthic. pusilla Thoms. Scand. Col. V. 281.

Forekommer hele Sommeren igjennem og er almindelig over hele Landet.

14. Munda Er.

Er. Naturg. Ins. D. III. 388 — Reitter Bestimmtab. XVI. 42.

Anthic. mund. Thoms. Scand. Col. V. 275.

Sjælland, Kjøbenhavn $\frac{20}{3}$ 1874, $\frac{1}{4}$ 1877 og $\frac{26}{9}$ 1868 paa Lossepladser og i Kjældere Schlick, Dyrehaven $\frac{28}{5}$ 1871 og $\frac{3}{8}$ 1874 Forf. Jylland, Rugballegaard ved Veile 4/1885 Fabritius de Tengnagel, Randers 9/1884 Forf.

15. Nigripennis Payk.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 67. 10. — Er. Naturg. Ins.

D. III. 390. — Reitter Bestimmtab. XVI. 47.

Dermest. nigrip. Payk. Fn. Suec. I. 292. 20.

Cryptoph. nigrip. Gyll. Ins. Suec I. 179. 17. — Schönh.

Syn. II. 99. 18.

Anchic. nigrip. Thoms. Scand. Col. V. 275.

Sjælland, Kjøbenhavn $\frac{21}{4}$ 1871 i en Have Schlick,
i Kjældere $\frac{9}{6}$ 1874 Koch, Meinert; Forf., paa en Losse-
plads $\frac{5}{9}$ 1868 Schlick, Dyrehaven $\frac{12}{11}$ 1886 Forf. Jyl-
land, Aarhus 9/1884 i Kjældere Rosenkrantz, Randers
 $\frac{29}{4}$ 1885 i Kjældere Jacobsen.

16. *Gibbula* Er.

Er. Naturg. Ins. D. III. 393. — Reitter Bestimmtab. XVI. 51.

Sjælland, Dyrehaven $\frac{1}{5}$ 1879 Forf. Lolland,
Bremersvold $\frac{6}{4}$ 1888 Forf.

17. *Morio* Kolen.

Kolenati Meletemata Entom. Fasc. V. 55. 236. — Reitter
Bestimmtab. XVI. 47.

Anchic. castanea Thoms. Scand. Col. V. 276.

Sjælden. Sjælland, Donse $\frac{14}{5}$ 1874 Forf., Lethra-
borg $\frac{18}{4}$ 1889 Forf. Lolland, Søholt $\frac{23}{6}$ 1875 Schlick,
Bremersvold $\frac{6}{4}$ 1888 Forf. Jylland, Viby Krat ved
Aarhus i Sigtegods tilsendt fra R. senkrantz, Aalborg
6/1887 i Bladjord Johansen.

18. *Apicalis* Er.

Er. Naturg. Ins. D. III. 395. — Reitter Bestimmtab. XVI. 49.

Anchic. apic. Thoms. Scand. Col. V. 278.

Sjælland, Dyrehaven $\frac{10}{4}$ 1870, $\frac{23}{4}$ 1876 Schlick,
Lyngby Mose $\frac{23}{4}$ 1889 Forf., Rudehegn $\frac{5}{5}$ 1872 Schlick,
Hornbæk 6/1861 Forf. Fyen, Fruens Bøge $\frac{26}{6}$ 1886
N. P. Jørgensen. Jylland, Aalborg 5/1887 Johansen,
 $\frac{2}{6}$ 1891, $\frac{4}{6}$ 1890 Hals Nørreskov Forf.

Findes ogsaa i Nordamerika (efter Reitter).

19. *Turgida* Er.

Er. Naturg. Ins. D. III. 397. — Reitter Bestimmtab. XVI. 49.

Anchic. turg. Thoms. Scand. Col. V. 277.

Sjælland, Geel Skov $\frac{6}{6}$ 1886, $\frac{13}{7}$ 1887 Forf.
Falster, Schiødte.

20. *Testacea* Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 66. 8. — Reitter Bestimmtab. XVI. 50.

Atom. analis Er. Naturg. Ins. D. III. 398.

Anthic. analis Thoms. Scand. Col. V. 279.

Almindelig over hele Landet og forekommer hele Sommeren igjennem.

21. *Ruficornis* Marsh.

Atom. rufic. Reitter Bestimmtab. XVI. 49.

Silpha rufic. Marsh. Ent. Brit. I. 125.

Anthic. rufic. Thoms. Scand. Col. V. 279.

Cryptoph. terminatus *Comolli Col. nov. ac. rar. Prov. Novocom. 20.

Atom. terminata *Heer Fn. Col. Helv. I. 428. 4. — Er. Naturg. Ins. D. III. 399.

Ligesom den foregaaende hele Sommeren igjennem, endnu hyppigere end denne og udbredt overalt.

Ephistemus.

Stephens Ill. Brit. Entom. Mandib. II. 167.

1. *Nigriclavus* Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. II. 168. 2. — Reitter Bestimmtab. XVI. 54.

Epist. globosus. Waltl Isis 1838. 271. — *Sturm Deutschl. Ins. XVIII. 82. Taf. 344. Fig. A. — Er. Naturg. Ins. D. III. 401. — Thoms. Scand. Col. V. 287.

Sjælden og hidtil kun funden i faa Exemplarer.

Sjælland, Kjøbenhavns Omegn Forf., Boserup Skov $\frac{2}{4}$ 1869 Schlick, Faxe Schlick. Falster, Orehoved $\frac{27}{5}$

1882 Forf., Nykøbing Schiödte. Jylland, Aalborg?
Johansen.

2. *Globulus* Payk.

Dermest. glob. Payk. Fn. Suec. I. 295. 28.

Cryptoph. glob. Gyll. Ins. Suec. I. 184. 24.

Epist. dimidiatus og ovulum Er. Naturg. Ins. D. III. 401
og 402.

Almindelig over hele Landet hele Sommeren igjen-
nem, især hyppig i Haver og Plantemøddinger.

Hypocoprus.

*Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Natural. Mosc. 1839. 72.

1. *Quadricollis* Reitt.

Reitter, Verhand. zool. bot. Ges. Wien 1877. 180. —

Reitter Bestimmtab. I. Ed. 2. 14.

Sjælland, Jægerspris Nordskov $\frac{8}{8}$ 1871, en større
Række funden i tørre Kokasser Schlick. Falster, Ore-
hoved $\frac{27}{5}$ 1882 et enkelt Stykke Forf.

Lathridiidae.

Myrmecoxenus.

*Chevrolat, Silbermanns Revue entomol. III. 1835. 267.

1. *Subterraneus* Chevr.

*Chevrol. Silbm. Rev. ent. III. 268. — Redtb. Fn. Aust.
Ed. 3. 428. — Thoms. Scand. Col. V. 132. — Reitter
Bestimmtab. I. Ed. 2. 29.

Denne Art lever i Tuerne hos *Formica rufa* eller
andre nærstaaende Arter. Funden baade For- og Efter-
sommer. Sjælland, Geel Skov, Brede, Ørholm, Rude-
hegn, Præstevang ved Hillerød, Fredensborg, Krogenberg

Hegn ved Kvistgaard, Jægerspris, Skarritsø. Bornholm, Almindingen. Fyen, Gjerup. Jylland, Rye og Skjørping.

2. *Vaporariorum* Guér.

Guérin Meneville Annal. Soc. Entom. France sér. 2. I. 1843. 70. pl. 2. I. fig. 1. — Reitter Bestimmtab. I. Ed. 2. 29.
Et enkelt Stykke kætset i Græs ved Faxe Schlick.

Holoparamecus.

Curtis i Newman. Entomol. Magazine I. 1833. 186.
Calyptobium *Villa Col. eur. dupl. Suppl. 1833.

De tre til denne Slægt hørende Arter ere alle Kosmopoliter, der med forskjellige Varer gjennem Handelen indføres hertil.

1. *Bertouti* Aub.

Aubé Annal. Soc. Entom. France sér. 4. I. 1861. 198.
— Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 12.
Kjøbenhavn 27/9 1869 og 10/1869 paa Asiatisk Compagnies Plads Budde-Lund.

2. *Caularum* Aub.

Aubé Annal. Soc. Entom. France sér. 2. I. 1843. 244.
pl. 10. I. fig. 2. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 13.
Kjøbenhavn 26/7 1879 i Ris Forf.

3. *Kunzei* Aub.

Aubé Annal. Soc. Entom. France sér. 2. I. 1843. 245.
pl. 10. I. fig. 4. — Allibert Revue Zool. Cuvierienne 1847. 18. — Coquerel Annal. Soc. Entom. France

sér. 2. VI. 1848. 181. pl. 7. IV. fig. 5a—d. —
Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 13.

Kjøbenhavn 26/7 1879, 3/10 1878 i Ris Forf.

Monotoma.

Herbst Natursystem all. Insekten V. 22.

1. *Conicicollis* Aub.

Aubé Annal. Soc. Entom. France VI. 1837. 455. pl.
17. fig. 1. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 414.

Cerylon angusticolle Gyll. Ins. Suec. IV. 634. 2—3.

Gyrocecis angust. Thoms. Scand. Col. V. 213.

Funden baade i Foraarsmaanederne og i September.
Den lever i Tuerne hos Formica rufa og de denne nær-
staaende Arter. Sjælland, Geel Skov, Rudehegn, Ravns-
næs Skov, Tokkekjøb Hegn, Krogenberg Hegn, Jyderup.
Møen. Bornholm, Almindingen. Lolland, Guldborgland.
Fyen, Gjerup. Jylland, Skjørping.

2. *Angusticollis* Aub.

Aubé Annal. Soc. Entom. France VI. 1837. 457. pl. 17.
fig. 2. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 414.

Gyrocecis formicetorum Thoms. Scand. Col. V. 213.

Lever som den foregaaende hos de samme Arter
af Myrer. Sjælland, Geel Skov, Rudehegn, Ravnsnæs
Skov, Herthadalen ved Lethraborg. Møen. Born-
holm, Almindingen. Lolland, Guldborgland. Fyen,
Gjerup. Jylland, Skjørping og ved Asaa i Vendsyssel.

3. *Picipes* Herbst.

Herbst Natursyst. Ins. V. 24. 2. Taf. 46. Fig. 2. — Redtb.
Fn. Aust. Ed. 3. 415. — Thoms. Scand. Col. V. 211.

Lyctus picipes Payk. Fn. Suec. III. 337. 7.

Cerylon picipes Gyll. Ins. Suec. III. 417. 2.

Som oftest findes denne Art i Kompostmøddinger i

Haver; den er funden i Mai, Juli og i August. Sjælland, Kjøbenhavn, Strandmøllen, Lyngby. Jylland, ved Aarhus og Aalborg.

4. Brevipennis Kunze.

Kunze Germ. Zeitschr. f. Ent. I. 383. 1. — Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 1845. I. 95. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 415.

Temmelig almindelig navnlig i Kompostmøddinger i Haver hele Sommeren igennem. Sjælland, Rosenborg Have, ved Søborg Sø, Hulemose Sø ved Vordingborg. Møen, Klinteskoven. Falster, Nykøbing. Lolland, Aalholm, Roden Skov. Fyen, Fruens Bøge, Hunderup, Odense. Jylland, Randers, Aalborg.

5. Quadricollis Aub.

Aubé Annal. Soc. Entom. France VI. 1837. 465. pl. 17. fig. 7. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 414.

Almindelig i Haver, Halmstakke, Lader eller lignende Steder, hvor den forekommer hele Sommeren igennem. Sjælland, Kjøbenhavn, Dyrehaven. Møen. Jylland, Aarhus, Randers, Aalborg.

6. Rufa Redtb.

Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 414.

Hører til de sjældnere Arter; den er funden under højst forskjellige Forhold. Sjælland, Kjøbenhavn 9/1869, 19/9 1873 og 1/10 1873 i Bagerier Koch, Schlick og Forf., 27/4 1890 i en Stald Forf., 25-30/5 1883 i et Klidpakhus Fabritius de Tengnagel, 3/10 1878 i et Skib med Ris fra Bagindien Forf., Rosenborg Have 30/5 1871, 7/6 1871 og 18/8 1871 i Drivbænke Forf., Strandmøllen 6/1856 klækket af Naaletræ Drewsen, Strandmøllen 11/9 1875 i en Humlerede Forf., Dyrehaven 28/5 1871 og 6/10 1884 under Granbark Forf.

7. *Longicollis* Gyll.

Aubé Annal. Soc. Entom. France VI. 1837. 467. pl. 17. fig. 8.

— Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 414. — Thoms. Scand. Col. V. 212.

Cerylon longicolle Gyll. Ins. Suec. IV. 635. 2—3.

Forekommer hele Sommeren igjennem. Sjælland, København i Haver og i Vodrofmølle, Dyrehaven i gammel Halm. Fyen, Killerup. Jylland, Buderuplund og Aalborg.

Lathridius.

Herbst Natursystem all. Insekten V. 3. (*Latridius*).

1. *Lardarius* De Geer.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 111. 1. — Curtis Brit. Entom. VII. ad Tab. 311. 1. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 416. — Thoms. Scand. Col. V. 216. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 18.

Tenebrio lard. De Geer Ins. V. (1775). 45.7. Tab. II. Fig. 25—31.

Dermestes acuminatus Payk. Fn. Suec. I. 299. 29.

Latridius acum. Gyll. Ins. Suec. IV. 135. 14.

Almindelig især paa fugtige Steder; den forekommer hele Sommeren igjennem og er funden i alle vore Landsdele.

2. *Alternans* Mannh.

Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 76. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 417. — Thoms. Scand. Col. X. 334. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 19.

Sjælden. Lolland, Roden Skov $\frac{9}{7}$ 1884, $\frac{12}{9}$ 1883. $\frac{19}{9}$ 1884, $\frac{12}{10}$ 1883 paa Risgjærder Engelhart og Forf. Fyen, Morud Skov ved Langensø $\frac{28}{6}$ 1871 et enkelt Stykke paa et Risgjærde Schlick.

3. Rugicollis Oliv.

Gyll. Ins. Suec. IV. 137. 16. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 111. 3. — Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 76. — Thoms. Scand. Col. V. 217. — Reitter Bestimmtab. Ill. Ed. 2. 19.

Ips rugic. Oliv. Ent. II. 18. 13. 19. Tab. 3. Fig. 19. a. b.

Kun 2 Stykker, det ene fra Geel Skov $\frac{12}{9}$ 1877, det andet fra Rudehegn $\frac{19}{5}$ 1884 paa Granris, begge tagne af Forf.

4. Bergrothi Reitt.

Reitter Verh. d. zool. bot. Gesellsch. Wien XXX. Jahrg. 1880. 53. — Bestimmtab. III. Ed. 2. 19. — Wiener entom. Zeit. 1889. 67. — Seidlitz Faun. Balt. Ed. 2. 242.

Funden i en Kjælder i Kjøbenhavn fra 25de Juni indtil 23de Juli 1892 af Rosenkrantz. Fortsatte Eftersøgninger ville rimeligvis godtgjøre, at den ogsaa forekommer paa andre Tider end de ovennævnte. Da Arten hidtil kun kjendes fra Finland og Rusland (Circassien), kan det være rimeligt, at den engang er indført med finsk Birkebrænde og da har fundet den nævnte Lokalitet gunstig til sin Formering. Der skal ialfald tidligere have ligget Birkebrænde i denne Kjælder.

5. Angulatus Mannh.

Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 74. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 419. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 18.

Latrid. angusticollis Gyll. Ins. Suec. IV. 136. 15. —

Lathrid. angust. Thoms. Scand. Col. V. 216.

Forekommer hele Sommeren igjennem og er især hyppig paa Risgjærder i vore sydlige Landsdele; omkring Kjøbenhavn forekommer den derimod kun sparsomt. Sjælland, Charlottenlund, Dyrehaven, Geel Skov, Bog-

næs, Lethraborg, Jægerspris, Næstved. Møen. Falster, Redsle Skov, Riserup, Kohaven ved Nykøbing. Lolland, Sundby Storskov, Freilev og Roden Skove, Merritsskov, Bremersvold. Fyen, Odense, Langensø, Faaborg, Middelfart. Langeland, Tranekjær. Jylland, Aarhus, Frijsenborg.

Coninomus.

Thomson Scandinav. Coleopt. V. 217.

1. *Constrictus* Gyll.

Thoms. Scand. Col. V. 218. — Reitter Bestimmtab. III.
Ed. 2. 20.

Latrid. const. Gyll. Ins. Suec. IV. 138. 18. — Lathrid.
const. Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 81. —
Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 416.

Sjælden, den er oftere nedbanket af tørre Granris.
Sjælland, Geel Skov $\frac{3}{6}$ 1886, $\frac{5}{6}$ 1885, $\frac{17}{6}$ 1889, $\frac{22}{6}$
1890 Schlick og Forf., Rudehavn $\frac{19}{5}$ 1884, $\frac{27}{5}$ 1879,
 $\frac{20}{6}$ 1873 Schlick og Forf., Tidsvilde $\frac{25}{5}$ 1890 Forf.
Lolland, Merritsskov $\frac{20-28}{8}$ 1874 Schlick.

2. *Nodifer* Westw.

Thoms. Scand. Col. X. 54. — Reitter Bestimmtab. III.
Ed. 2. 20.

Latrid. nodif. Westw. Introduct. modern classific. Ins. I.
155. Tab. 13. Fig. 23. — Steph. Manuel Brit. Col.
129. — Lathrid. nodif. Mannh. Germ. Zeitschr. f.
Ent. V. 109.

Forekommer hele Sommeren igjennem og er funden
til ind i November. Sjælland, Kjøbenhavn paa
Tømmerpladser og paa Lossepladser, Rosenborg Have,
Charlottenlund, Dyrehaven i gammel Halm, Lyngby.
Falster, Nykøbing. Lolland, Roden og Freilev
Skove, Merritsskov. Fyen, Odense, Gjerup. Lange-

land, Tranekjær. Jylland, Aarhus, Randers, Lindum Skov, Valby ved Aalborg.

Conithassa.

Thomson Scandinav. Coleopt. V. 217.

1. *Minutus* Linn.

Thoms. Scand. Col. V. 221.

Tenebrio minut. Linn. Syst. Nat. I. Pars. II. 675. 12.

Lathrid. minut. Latreille Gen. Crust. et Ins. III. 18. —

Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 96. — Redtb.

Fn. Aust. Ed. 3. 418.

Enicmus minut. Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 21.

Dermestes porcatus Panz. Fn. Germ. 28. 9.

Latrid. porc. Gyll. Ins. Suec. IV. 142. 22.

Almindelig hele Sommeren igjennem og udbredt over hele Landet, saavel i Byerne i Kjældere, Lader og lignende Steder, som i det Frie paa Svampe, under Løv eller gammel Halm. Funden i Japan og Chili (efter Reitter).

2. *Consimilis* Mannh.

Thoms. Scand. Col. V. 222.

Lathrid. cons. Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 99. —

Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 419.

Enicmus cons. Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2 21.

En sjældnere forekommende Art, der som oftest træffes paa Fyrsvampe. Sjælland, Dyrehaven $\frac{30}{5}$ 1886, $\frac{3}{6}$ 1880, $\frac{16}{7}$ 1882, $\frac{5}{9}$ 1886 Koch, Schiødte, Schlick og Forf., Thureby $\frac{22}{5}$ 1884, $\frac{27}{5}$ 1880, $\frac{3}{6}$ 1886 Forf., Næsbyholm Skov $\frac{5}{6}$ 1883 Forf., Tase Mølle $\frac{6}{6}$ 1881 Forf. Jylland, Frijsenborg $\frac{21}{6}$ 1885, $\frac{24}{9}$ 1884 Forf., Randers $\frac{4}{9}$ 1886 paa en Pil Jacobsen.

3. *Brevicollis* Thoms.

Thoms. Scand. Col. X. 56.

Enicmus brevic. Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 22.

Lever som den foregaaende og findes som denne paa Fyrsvampe fra April til ind i September. Sjælland, Dyrehaven Koch, Schlick og Forf., Thureby Fabritius de Tengnagel og Forf. Jylland, Aarhus Omegn Rosenkrantz, Frijsenborg Forf., Hinnerup Jacobsen.

Enicmus.

Thomson Scandinav. Coleopt. V. 226.

1. *Rugosus* Herbst.

Thoms. Scand. Col. V. 223. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 23.

Latrid. rug. Herbst Natursyst. Ins. V. 6. 3. Taf. 44. Fig. 3. — Gyll. Ins. Suec. IV. 140. 20. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 113. 8. — Lathrid. rug. Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 90. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 419.

Funden fra Marts til September. Den forekommer ofte i smaa Bovister paa Bøgestød. Sjælland, Kjøbenhavn paa Tømmerpladser og i Rosendals Have, Dyrehaven, Jægerspris Nordskov, Næsbyholm Skov. Falster, Nykøbing. Lolland, Maribo. Jylland, Rye Nørreskov, Frijsenborg, Lindum Skov, Pindstrup Skov, Thisted.

2. *Testaceus* Steph.

Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 23.

Latrid. testac. Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 114. 9. Tab. XVIII. Fig. 3.

Enic. crenicollis Thoms. Scand. Col. X. 57.

En sjældnere Art, der er funden fra April til August. Den forekommer ofte i Bovister paa Stød og paa Fyrsvampe. Sjælland, Dyrehaven Koch, Meinert, Schlick og Forf., Svenstrup ved Borup Station Forf., Thureby Forf. Lolland, Maglemer Havløkke og

Christianssæde Skov Schlick. Langeland, Tranekjær Schlick. Jylland, Hals Nørreskov Johansen og Forf., Vang Skov i Vendsyssel Johansen.

3 Transversus Oliv.

Thoms. Scand. Col. V. 223. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 22.

Ips transversa Oliv. Ent. II. 18. 14. 20. Tab. 3. Fig. 20 a—b.

Latrid. transv. Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 112. 6. — Lathrid. transv. Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 94. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 419.

Forekommer hele Sommeren igjennem og er almindelig over hele Landet; som oftest forekommer den under fugtigt Løv ved Søbredder.

Arten findes ogsaa i China og Japan (efter Reitter).

Cartodere.

Thomson Scandinav. Coleopt. V. 219.

1. Elongata Curt.

Thoms. Scand. Col. X. 55. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 25.

Latrid. elong. Curtis Brit. Ent. II. Tab. 311. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 115. 11. — Lathrid. elong. Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 83.

Sjælland, Rosenborg Have $\frac{1}{5}$ 1871 i Champignonhuset Forf., Charlottenlund $\frac{3}{9}$ 1878 Schlick, Fredensborg $\frac{23}{4}$ 1878 i Svamp paa en Bøg Forf., Humlebæk, overvintrende i Grankogler Borries, Lethraborg $\frac{19}{5}$ 1880 i en hul Pil Forf., Jægerspris $\frac{13}{6}$ 1880 Koch. Lolland, Merritsskov $\frac{26}{6}$ 1881, $\frac{21}{8}$ 1874 Koch og Forf. Jylland, Rye Boye, Aarhus 9/1884 i en Kjælder Rosenkrantz.

2. Ruficollis Marsh.

Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 25.

Corticaria rufic. Marsh. Ent. Brit. I. 111.

Latrid. rufic. Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 114. 10.

Lathrid. collaris Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 86.

Cartodere coll. Thoms. Scand. Col. V. 220.

Funden i Mai, Juli og November. Den forekommer oftere i gammel Halm, paa Lademure eller lignende Steder. Sjælland, Kjøbenhavn paa Tømmerpladser og paa Vesterbro i en Have Forf., Dyrehaven i Halmen i Dyrehusene Koch, Schlick og Forf., Svenstrup ved Borup Station Forf., Ringsted Boye. Falster, Redsle Schlick.

3. *Filiformis* Gyll.

Thoms. Scand. Col. V. 219. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 26.

Latrid. filif. Gyll. Ins. Suec. IV. 143. 23. — *Lathrid. filif.* Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 104. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 418.

Sjælland, Kjøbenhavn $\frac{16}{8}$ Schiødte, i en Stald 5/1880, 5/1890, $\frac{17}{8}$ 1879, $\frac{29}{8}$ 1879 Fabritius de Tengnagel og Forf., Dyrehaven $\frac{8}{5}$ 1874 Koch, Freerslev Skole ved Hillerød 5/1891 Mortensen. Jylland, Randers $\frac{26}{9}$ 1886 i en Kompostmødding Jacobsen.

4. *Filum* Aub.

Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 26.

Lathrid. fil. Aubé Annal. Soc. Entom. France sér. 2. VIII. 1850. 334.

Sjælden. Sjælland, Kjøbenhavn i Droguer Forf., i Herbarier Rostrup. I Herbariet ynglede den i Brandsvampe, af hvis Sporer den syntes at leve; i Februar 1892 forekom endnu levende Individer i en Brandsvamp paa Phragmites communis, som var tagen for flere Aar tilbage ved Viborg Sø. Arten skal efter Reitter være kosmopolitisk, idet den skal forekomme i Algier, Mexiko og flere Steder.

Corticaria.

Marsham Entomol. Brit. I. 106.

1. *Pubescens* Gyll.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 106. 1. — Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 17. — Thoms. Scand. Col. V. 225. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 28.

Latrid. pub. Gyll. Ins. Suec. IV. 123. 1.

Dermestes fenestralis Fabr. Ent. Syst. I. 234. 38. — Payk. Fn. Suec. I. 297. 26.

Temmelig hyppig og vidt udbredt; den er funden lige fra Februar til ind i November. Sjælland, København især paa Tømmerpladser paa skimlet Brænde, Dyrehaven, Jørslev ved Karise. Amager. Falster, Riserup. Lolland, Roden Skov. Jylland, Veile, Aarhus, Frijsenborg, ved Gudenaar i Nærheden af Randers, Tebstrup Bakker ved Randers, Aalborg i Bladjord, Hvorup og Dronninglund Storskov i Vendsyssel.

2. *Crenulata* Gyll.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 106. 2. — Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 22. — Thoms. Scand. Col. V. 226. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 28.

Latrid. cren. Gyll. Ins. Suec. IV. 125. 2.

Funden fra Mai til September. Arten findes hyppigst ved Strandbredder. Sjælland, Københavns Omegn, Strandmøllen under Tang, Søborg Sø, Tidsvilde, Faxe og Vemmetofte Strand under Tang. Lolland, Rødby Fjord. Bornholm, Rønne. Jylland, Vildsund, Frederikshavn og Skagen.

3. *Fulva* Com.

Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 42. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 31.

*Lathrid. fulvus Chevrier, Villa Catal. 1835. 45. —

*Comolli Col. nov. ac. rar. Prov. Novocomi 39. 81.

Sjælden og hidtil kun funden i faa Exemplarer.
 Sjælland, Kjøbenhavn $\frac{6}{4}$ 1879, $\frac{27}{4}$ 1890 i en Stald
 Meinert og Forf., Dyrehaven $\frac{18}{8}$ 1875 Forf. Jylland
 Randers $\frac{29}{4}$ 1885 Jacobsen.

4. *Cylindrica* Mannh.

Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 35. — Thoms. Scand.
 Col. V. 229. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 421.
 Lathrid. umbilicatus Beck Beitr. baier. Ins. 13. Taf. 3.
 Fig. 13.

Cortic. umbilic. Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 31.

Er temmelig hyppig og forekommer fra April til November. Sjælland, Dyrehaven, Brede, Ørholm, Jægerspris, Sorø, Basnæs. Møen. Falster. Fyen, Gjerup. Jylland, Buderuplund, Aalborg, Vildsund ved Thisted, Hvorup i Vendsyssel.

5. *Denticulata* Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 107. 3. — Mannh. Germ.
 Zeitschr. f. Ent. V. 23. — Reitter Bestimmtab. III.
 Ed. 2. 32.

Latrid. longicornis Gyll. Ins. Suec. IV. 127. 5.

Cort. longic. Thoms. Scand. Col. V. 227.

Arten synes at være sjælden her i Landet. Sjælland, Thureby $\frac{27}{5}$ 1880, $\frac{6}{6}$ 1879, $\frac{20}{6}$ 1878 Forf., Sorø $\frac{8}{8}$ 1848 Pastor Jacobsen.

6. *Longicornis* Herbst.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 107. 4. — Mannh. Germ.
 Zeitschr. f. Ent. V. 34. — Reitter Bestimmtab. III.
 Ed. 2. 32.

Latrid. longic. Herbst Natursyst. Ins. V. 4. 1. Taf. 44.
 Fig. 1.

Latrid. denticulatus Gyll. Ins. Suec. IV. 126. 3.
 Cort. dent. Thoms. Scand. Col. V. 226.

Forekommer hele Sommeren igjennem; er temmelig hyppig og udbredt over hele Landet.

7. *Linearis* Payk.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 108. 5. — Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 40. — Thoms. Scand. Col. V. 231. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 33.

Dermestes lin. Payk. Fn. Suec. I. 302. 33.

Latrid. lin. Gyll. Ins. Suec. IV. 129. 7.

Et enkelt Stykke rimeligvis fra Kjøbenhavns Omegn Forf.

8. *Foveola* Beck.

Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 39. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 421. — Thoms. Scand. Col. V. 232. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 33.

Lathrid. fov. Beck Beitr. baier. Ins. 14. Taf. 3. Fig. 14. — Gyll. Ins. Suec. IV. 128. 6.

Sjælden; Arten nedbankes som oftest af Granløv, men er ogsaa funden under Granbark. Sjælland, Kjøbenhavn 9/1882, $\frac{29}{3}$ 1879 paa Tømmerpladser, Geel Skov $\frac{17}{5}$ 1885, $\frac{22}{5}$ 1879 Schlick og Forf., Rudehegn $\frac{18}{4}$ 1884, $\frac{24}{5}$ 1879 Schlick og Forf.

9. *Longicollis* Zett.

Thoms. Scand. Col. V. 230. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 34.

Latrid. longic. Zett. Ins. Lappon. 200. 11.

Lathrid. formicetorum Mannh. Bull. Soc. Imp. Natural. Mosc. 1843. 85. 22.

Cort. form. Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 31.

Sjælden. Sjælland, Rudehegn Schiødte, Svenstrup ved Borup Station $\frac{21}{7}$ 1881 Forf. Jylland, Skyttehuset ved Veile Fabritius de Tengnagel.

10. Serrata Payk.

Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 28. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 420. — Thoms. Scand. Col. V. 230. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 35.

Dermestes serr. Payk. Fn. Suec. I. 300. 31.

Latrid. serr. Gyll. Ins. Suec. IV. 126. 4.

Funden over hele Landet Sommeren igjennem, fra April til ind i November. Arten er temmelig hyppig hos os.

11. Curtipes n. sp.

Oblonga, picea, griseo-pubescent; antennae pedibusque rufo-ferrugineis. Caput tenuiter remote punctatum. Thorax latior quam longior, tenuiter punctatus, sine ulla fovea ante scutellum, lateribus fere parallelis, leviter curvatis, acute crenulatis. Elytra tenuiter striato-punctata, interstitiis planis, punctis etiam tenuioribus in seriem digestis ornatis.

Long. 1,5 Mm.

Descriptio uberior: Cort. serratæ proxima, at statura latior. Capiti ut in Cort. serrata denticulus pilosus parvus pone oculos situs deest. Thorax multo latior quam in C. serr., caret omnino foveola ante scutellum; latera fere parallela, modo leviter curvata, acutius crenulata, fere ut in C. serr. Scutellum latissimum, brevissimum. Elytra breviora, magis convexa quam in C. serr., tenuiter striato-punctata, interstitiis planis, punctis etiam tenuioribus ornatis. Antennæ pedesque rufo-ferruginea; pedes mirum in modum curti, femoribus multo crassioribus quam in C. serrata.

Et enkelt Stykke fra Lundby Bakker ved Aalborg 8/1889 Johansen.

12. Elongata Humm.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 108. 7. — Mannh. Germ.

Zeitschr. f. Ent. V. 44. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 422. — Thoms. Scand. Col. V. 233. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 36.

Latrid. elong. *Hummel Ess. Ent. IV. 5. — Gyll. Ins. Suec. IV. 130. 8.

Funden fra April til October. Den er meget almindelig og er udbredt over hele Landet. Arten faaes bedst ved at sigte nedfaldent Løv eller under Mos.

13. *Ferruginea* Marsh.

Marsh. Ent. Brit. I. 111. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 108. 6. — Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 45. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 422. — Thoms. Scand. Col. V. 234.

Latrid. ferr. Gyll. Ins. Suec. IV. 131. 9.

Dermestes fenestralis Linn. Syst. Nat. I. Pars II. 563. 15? — Fn. Suec. 143. 423?

Cort. fenest. Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 36.

Sjælden. Sjælland, Dyrehaven $\frac{28}{5}$ 1871 Forf., Rudehegn $\frac{27}{5}$ 1877. Bornholm, $\frac{13}{7}$ 1891 Fabritius de Tengnagel, Rø $\frac{7}{6}$ 1870 Forf. Jylland, Rye Schiødte, Lindum Skov ved Onsild Station $\frac{10}{6}$ 1887, $\frac{24}{8}$ 1886 Jacobsen og Forf., Hals Nørreskov $\frac{5}{6}$ 1890 Forf.

Melanophthalma.

Motschulsky Bull. Soc. Imp. Natural. Mosc. 1866.

Partie. 2. 225. — 1867 Partie 1. 39.

1. *Transversalis* Gyll.

Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 37.

Cort. transv. Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 109. 9. — Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 51. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 423. — Thoms. Scand. Col. V. 235.

Latrid. transv. Gyll. Ins. Suec. IV. 133. 11.

Forekommer hele Sommeren igjennem, er meget almindelig og udbredt over hele Landet.

2. *Gibbosa* Herbst.

Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 38.

Cort. gibb. Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 109. 8. —

Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 49. — Redtb. Fn.

Aust. Ed. 3. 423. — Thoms. Scand. Col. V. 235.

Dermestes gibb. Payk. Fn. Suec. I. 301. 32.

Latrid. gibb. Herbst Natursyst. Ins. V. 5. 2. Taf. 44.

Fig 2. — Gyll. Ins. Suec. IV. 132. 10.

Funden i Sommermaanederne og over hele Landet, men den er ikke nær saa hyppig som den foregaaende Art. Arten er funden baade i China og Japan (efter Reitter).

3 *Similata* Gyll.

Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 38.

Cort. sim. Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III. 110. 11. —

Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 56. — Redtb.

Fn. Aust. Ed. 3. 424. — Thoms. Scand. Col. V. 236.

Latrid. sim. Gyll. Ins. Suec. IV. 134. 13.

Arten findes ved Strandbredder. Sjælland, Vemmetofte Strand $\frac{5}{8}$ 1886 Forf. Lolland, Bremersvold $\frac{14}{6}$ 1886 Forf. Jylland, Strandby 7/1889 Johansen, Frederikshavn $\frac{12}{9}$ 1887 Schiødte og Schlick, Skagen 9/1891 Johansen.

4. *Fuscula* Humm.

Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 39.

Cort. fusc. Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 55. —

Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 423. — Thoms. Scand. Col. V. 236.

Latrid. fusc. *Hummel Ess. Ent. III. 25. — Gyll. Ins. Suec. IV. 133. 12. — Zetterst. Ins. Lappon. 200. 10.

Var. Prothorace utrinque foveola impressa.

Corticaria trifoveolata Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 423.

Meget almindelig over hele Landet; den forekommer hele Sommeren igjennem.

5. *Truncatella* Mannh.

Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 39.

Cort. trunc. Mannh. Germ. Zeitschr. f. Ent. V. 59. — Redtb. Fn. Aust. Ed. 3. 423.

Forekommer som oftest ved Strandbredder. Falster Schiødte. Lolland, Bremersvold ved Stranden $\frac{11}{6}$ 1886 Forf. Jylland, Rye Schiødte, Aalborg 4/1886 og $\frac{4}{6}$ 1891 Johansen og Forf., Vildsund ved Thisted $\frac{1}{7}$ 1889 Fabritius de Tengnagel

Migneauxia.

Jacquelin Duval Gen. des Coléoptères d'Europe II. 248.

1. *Orientalis* Reitt.

*Reitter Mittheil. des Münchener entom. Verein. 1877. 139. — Reitter Bestimmtab. III. Ed. 2. 40. — Seidlitz Fn. Balt. Ed. 2. 248. — Reitter Deutsch. Entom. Zeitschr. Jahrg. 1891. 23.

Kjøbenhavn $\frac{26}{7}$ 1879 og $\frac{3}{10}$ 1877 i Ris indført fra Rangoon Forf.

