

4. Lepidoptera — Sommerfugle

sammenstillet af
J. G. Worm-Hansen.

Sommerfuglene er indsamlet ved ketsjning, paa sukkerlokning og ved lys (petromax og Kviksølvlampen) af fig. samlere: Stabslæge Tage Feddersen, april 1953, og desuden de følgende aar i juni-juli fra Hansted.

Overlærer P. K. Nielsen, 21/7—4/8 1953.

Apoteker E. Pyndt, 2/8—9/8 1956.

Civilingeniør W. van Deurs, 10/7—20/7 1955.

Entomologen J. G. Worm-Hansen, 5/8—24/8 1953, 11/6—25/6 1954, 29/6—7/7 1955, 10/7—20/7 1956, 3/8—9/8 1957.

De indsamlede eksemplarer befinner sig dels hos de paagældende samlere, dels paa Zoologisk Museum. I den følgende liste er de opført i rækkefølgen efter Langers liste (Flora & Fauna 1957 p. 1 ff.) for de saakaldte storsommerfugles vedkommende (numrene i parantes henviser til denne liste) og efter van Deurs' bind i "Danmarks Fauna" (pyralider, pterophorider, tortricider s. l.) og C. S. Larsens fortægnelse (Ent. Medd. 11 1916 p. 28 ff. med tillæg ibid. 17 1927 p. 7 ff.) for de saakaldte smaasommerfugle. — Efter en tankestreg er angivet artens øvrige udbredelse i Danmark.

Pieridae.

1 (6) **Pieris brassicae** L. Alm., især ved gaarden. — Alm. over hele landet, paa cruciferer.

2 (7) **P. rapae** L. Alm., især ved gaarden. — Som foreg.

3 (8) **P. napi** L. Alm., især ved gaarden. — Som foreg.

Satyridae.

4 (18) **Hipparchia semele** L. Alm. i juli—aug. — Alm. over hele landet i sandede kystegne med græsser.

5 (18) **Aphantopus hyperanthus** L. 30/6, 15/7, og affløjjet i aug. Enkelte expl. — Alm. i skove med græsser, sjældnest i Nord- og Vestjylland.

6 (24) **Maniola jurtina** L. Alm. 28/6—7/8; friskklækkede expl. omkring 1. juli. — Alm. over hele landet, paa græsmarker etc.

7 (28) **Coenonympha pamphilus** L. Juni—aug., alm.—Alm. over hele landet, paa græsmarker etc.

8 (29) **C. tullia** Müll. Enkelt $\frac{2}{7}$. — Ret alm. over hele landet, paa enge med Rhyncospora alba.

Nymphalidae.

9 (33) **Vanessa atalanta** L. $\frac{22}{6}$; i antal aug. 1953. — Regelmæssig tilflyver over hele landet.

10 (35) **Aglais urticae** L. Juni—aug., alm. Larver klækket $\frac{5}{7}$. — Alm. over hele landet, overalt med Urtica dioica.

11 (36) **Inachis io** L. $\frac{24}{4}$; af og til i aug. — Alm. over hele landet, dog mindre hyppig i Vestjylland, i skovkanter og haver med Urtica dioica.

12 (48) **Mesoacidalia charlotta** Hw. (= *Argynnис aglaja*). Enkelt $\frac{30}{6}$ — $\frac{13}{8}$. — Udbredt i det øvrige Danmark, omend sjælden i Nord- og Syd-Jylland; især i skove med Viola.

13 (49) **Fabriciana niobe** L. Tem. talrig $\frac{11}{7}$ — $\frac{1}{8}$. — Hist og her over hele landet, ikke mindst hvor der er klitgryder med Viola.

14 (50) **F. adippe** L. 2 expl. $\frac{1}{8}$ og $\frac{17}{8}$ 1953. — Ret alm. paa Sjælland, spredte fund i det øvrige land; i skove men ogsaa andre steder med Viola canina.

15 (53) **Clossiana selene** Schiff. $\frac{30}{6}$ — $\frac{1}{8}$, alm. bl. a. i haven. — Alm. over hele landet paa skovenge etc. med Viola.

16 (56) **Issoria lathonia** L. $\frac{10}{7}$ — $\frac{24}{8}$. Alm. — Alm. over hele landet, vegetationsfattige steder med Viola.

Lycaenidae.

17 (63) **Callophrys rubi** L. Talrige affløjne expl. i juni, larver $\frac{16}{7}$. — Udbredt over hele landet, omend lokal; skov- og moseterræn.

18 (67) **Heodes phlaeas** L. Juni (enkelte affløjne) — $\frac{8}{8}$ (alm.). — Alm. over hele landet, paa forskellige biotoper med Rumex.

19 (69) **Palaeochrysophanus hippothoë** L. Juni, alm. nær

Bagsø (1 expl. af ab. *confluens* Gerh.), juli affløjne. — Udbredt i det øvrige Danmark, paa skovenge og -moser med Rumex og Polygonum.

20 (70) **Cupido minimus** Fuessl. $\frac{11}{6}$ (alm.) — juli (enkelte); $\frac{18}{8}$ (2. kuld). — Alm. paa øerne samt i Jylland nord for Vejle — Ringkøbing, paa tørre steder med Anthyllis vulneraria.

21 (72) **Maculinea alcon** Schiff. $\frac{30}{6}$. 1 expl. — Kun kendt fra Nordjylland (omkring og nord for Limfjorden), Sydvestjylland og ganske faa andre steder (Læsø), paa hede-moser og sandede bakker med Gentiana.

22 (74) **Lycaeides idas** L. (tidl. *argyrogynomon* auct.) $\frac{28}{6}$ — $\frac{4}{8}$, talrig. — Lokalt udbredt over hele landet. Afhængig af ærteblomstrede og myrerne *Lasius niger*, *Formica cinernea* og *fusca*.

23 (77) **Cyaniris semiargus** Rott. Enkelte nær Bagsø juni-juli. — Udbredt især i Jylland og paa Sjælland, paa enge med Trifolium etc.

24 (79) **Polyommatus icarus** Rott. $\frac{22}{6}$ (alm.) — juli (affløjne) og $\frac{7}{8}$ (friske ex.). — Alm. over hele landet, paa græsmarker med ærteblomstrede.

25 (80) **Lysandra amanda** Schn. $\frac{11}{6}$ — $\frac{16}{7}$, alm. nær Bagsø. — Udbredt i det øvrige Danmark, i Jylland især syd for Aarhus — Ringkøbing, i skove, enge, marker med *Vicia cracca*.

Hesperiidae.

26 (81) **Erynnis tages** L. Juni 54, talrige, affløjne expl. — Spredt over hele landet, paa biotoper med *Lotus corniculatus*.

27 (82) **Pyrgus malvae** L. $\frac{5}{7}$, enkelte set. — Alm. over hele landet, paa skovplanter.

28 (89) **Adopaea flava** Brünn. (= *thaumas* auct.) $\frac{20}{6}$ — $\frac{8}{8}$, talrig. — Kun kendt vest for Storebælt. Paa græsser.

29 (90) **Ochlodes venatus** Brem. (= *Augiades sylvanus* auct.) $\frac{22}{6}$ — $\frac{3}{8}$, hyppig. — Alm. over hele landet, paa *Brachypodium sylvaticum*.

30 (91) **Hesperia comma** L. $^{22}/_7$ — $^{24}/_8$, alm. — Alm. over hele landet paa mager jord med *Festuca ovina*; synes at være mindre hyppig i Nordsjælland.

Sphingidae.

31 (94) **Sphinx ligustri** L. 1 expl. $^{28}/_6$. — Alm. overalt.

32 (95) **S. pinastri** L. Enkeltvis $^{11}/_7$ — $^{25}/_7$. — I fyrreskove over hele landet, hyppigst i Øst-Danmark.

33 (97) **Smerinthus ocellatus** L. 1 expl. $^{22}/_6$. — Alm. over hele landet.

34 (98) **Amorpha populi** L. Enkeltvis $^{22}/_6$ — $^{11}/_7$, paa lys. — Alm. over hele landet.

35 (99) **Hemaris tityus** L. Sværmende $^{16}/_7$. — Udbredt, men lokal, over det meste af Danmark.

36 (105) **Celerio galii** Rott. 1 expl. $^{25}/_7$, larver $^{21}/_7$ — $^4/_8$. Ikke alm.; mest paa tørre steder. Paa visse lokaliteter ses larven undertiden i antal paa gederams.

37 (107) **Pergesa elpenor** L. $^{25}/_6$ — $^{11}/_7$; larver paa gederams $^{21}/_7$ — $^{18}/_8$ (kl. $^{29}/_3$). — Alm. over hele landet.

38 (108) **P. porcellus** L. $^{22}/_6$ — $^{11}/_7$; larver $^{21}/_7$ — $^5/_8$. — Tem. alm. over hele landet.

Notodontidae.

39 (111) **Cerura furcula** Ol. 1 expl. $^{17}/_7$. — Udbredt over hele landet, men ikke alm.

40 (113) **Dicranura vinula** L. 1 expl. $^{12}/_7$. En del larver paa *Salix repens* i juli—aug. — Alm. i hele landet.

41 (119) **Pheosia tremula** Cl. Enkelt $^{25}/_7$. — Tem. alm. overalt.

42 (121) **Notodonta dromedarius** L. Enkelt $^{24}/_7$. — Tem. alm. i hele landet.

43 (122) **N. ziczac** L. Imago $^8/_8$ (2. generation) samt $^{24}/_6$. Larver $^{21}/_7$ — $^4/_8$. — Tem. alm. overalt i maj—juni, sjældnere i aug.

44 (132) **Phalera bucephala** L. Enkelt $^{25}/_6$ og $^{18}/_7$. — Alm. overalt.

45 (136) **Pygaera pigra** Hfn. Imago $^{17}/_7$. 1 larve paa *Salix repens* $^5/_8$, klæk. $^{18}/_3$. — Tem. alm., men lokal.

Cymatophoridae.

- 46 (147) **Palimpsestis duplaris** L. Paa sukkerlokning i juni. — Tem. alm. i hele landet.

Lymantriidae.

- 47 (154) **Dasychira fascelina** L. Spæde larver paa Calluna i aug. Imago af og til paa lys, juni—juli. — I tørre egne, ikke alm. Hyppigst i Jylland.

- 48 (157) **Orgyia antiqua** L. En lille larve nedbanket(gran?) i juli. — Alm. paa øerne. Mindre hyppig i Jylland.

- 49 (160) **Stilnoptia salicis** L. 1 expl. ved lys $\frac{14}{7}$. — Alm. over hele landet.

Lasiocampidae.

- 50 (165) **Malacosoma neustria** L. Hyppig ved Ørgaard ved lys, juli—aug. — Meget alm. overalt.

- 51 (166) **M. castrensis** L. Nogle expl. ved lys i juli. — Ikke alm. Hyppigst ved strandbredder.

- 52 (170) **Lasiocampa quercus** L. Enkelt $\frac{24}{7}$. — Overalt, ikke sjælden.

- 53 (171) **L. trifolii** Esp. Larve i juli, puppe i juli—aug., kl. $\frac{15}{8}$. Imago (begge køn) flere gange ved lys i aug. og $\frac{8}{9}$. — Udbredt, men ikke alm., paa tørre steder.

- 54 (172) **Macrothylacia rubi** L. Enkelt i juni. En del larver i aug. — Meget alm. overalt.

- 55 (176) **Epichnaptera ilicifolia** L. 2 fuldvoksne larver paa Salix repens $\frac{11}{7}$ og $\frac{14}{7}$ 1956. — Iflg. "Strøm" og "Klöcker" meget sjælden og kun kendt i enkelte expl. I de seneste aar er larven taget lokalt paa tørre, sanddede steder i Nord- og Vestjylland.

- 56 (178) **Dendrolimus pini** L. Enkelt $\frac{24}{7}$. — Tidligere en sjældenhed, men arten har i de senere aar udbredt sig i granskove.

Saturniidae.

- 57 (181) **Saturnia pavonia** L. En han spiddet (levende) paa et pigtraadshegn ved gaarden $\frac{5}{7}$. En tom kokon i 1953 og en larve i juli 1955. — Tem. alm. i hele landet.

Arctiidae.

- 58 (189) **Comacla senex** Hb. Enkelt $^{1/7}$ (Hansted). — Alm. paa fugtige enge, ofte i store mængder.
- 59 (191) **Philea irrorella** Cl. Juli. — Ikke alm. og meget lokal. Hyppigst i det nordl. Jylland.
- 60 (192) **Cybosia mesomella** L. Enkeltvis i lyngen i juli. — I hele landet, ikke sjælden.
- 61 (207) **Phragmatobia fuliginosa** L. Ved Hansted $^{23/6}$. — Ret alm. i hele landet. Den overvintrende larve ses undertiden paa sne.
- 62 (208) **Parasemia plantaginis** L. En ♂ flyvende i klitterne $^{19/6}$. — Udbredt over hele landet, især paa enge og i lyse skove, dog ogsaa paa heder.
- 63 (209) **Spilarctia lutea** Hfn. Ved Hansted $^{26/6}$. — Alm. i alle landsdele.
- 64 (210) **Spilosoma menthastris** Esp. Hyppig nær gaarden ved lys, juni—juli. En del larver fra aug. klække i marts. — Alm. i hele landet.
- 65 (211) **S. urticae** Esp. Enkelte ved lys, juni. En larve i aug., klæk. $^{15/3}$. — Udbredt i alle landsdele, ikke sj.
- 66 (213) **Diacrisia sannio** L. I juni—juli meget alm. i lyngen i klitterne. — Udbredt og tem. alm., omend lokal.
- 67 (215) **Arctia caja** L. Voxne larver i juni (klække); imago ved lys i aug. — Alm. overalt.

Zygaenidae.

- 68 (221) **Procris statices** L. Ret hyppig nær gaarden i juni. — Alm. overalt.
- 69 (225) **Zygaena filipendulae** L. Larver og pupper i juni. Imago hyppig i juli—aug. — Alm. overalt.

Hepialidae.

- 70 (261) **Hepialus humuli** L. Enkelt $^{30/6}$. — Ikke sjælden.
- 71 (262) **H. fusconebulosa** de G. Ved Ørgaard $^{4/7}$ (men Ørneregner mgl. ved gaarden!). Flere expl. ved lys. — Tem. sjælden og lokal.
- 72 (263) **H. sylvinus** L. Et expl. $^{3/8}$ nær gaarden. — Overalt ret alm.

Noctuidae.

- 73 (275) **Acronycta tridens** Schiff. Paa sukkerlokning ved gaarden i juni og juli. — Alm. overalt.
- 74 (278) **A. menyanthidis** View. Larver i juli til august. — I moser, ikke alm.
- 75 (288) **Euxoa cursoria** Hfn. Enkelte expl. i aug. — Ikke alm.; især ved strandkanter. Undertiden talrig ved lys.
- 76 (289) **E. nigricans** L. Enkelte expl. i juli—aug. — Ikke sjælden.
- 77 (290) **E. tritici** L. Nogle expl. i juli—aug. — Udbredt i sandegne.
- 78 (293) **Agrotis segetum** Schiff. I antal i juni—juli paa sukkerlokning og ved lys. — Meget alm. overalt. Larven skadedyr paa rødder.
- 79 (294) **A. corticea** Hb. Enkelt paa sukkerlokning. Tem. talrig paa lys. I juli. — Hist og her; ikke alm.
- 80 (295) **A. vestigialis** Rott. En del expl. i juli—aug., særlig ved lys. — Udbredt paa sandede steder.
- 81 (296) **A. cinerea** Hb. Ved Hansted $\frac{26}{6}$. — Ikke alm.; særlig i sandede egne i Nordjylland.
- 82 (297) **A. exclamationis** L. Hyppig paa sukkerlokning og paa lys juni—juli. — Alm. overalt, larven undertiden skadedyr paa rødder.
- 83 (307) **Rhyacia strigula** Thnbg. Paa lys i juni—aug. — Ikke sjælden i lyngegne.
- 84 (310) **Diarisia festiva** Hb. I juli. — Alm. overalt, især i skove.
- 85 (312) **D. baja** F. Paa sukkerlokning $\frac{29}{7}$ —aug. — Alm., nærmest et skovdyr, men ogsaa paa birkeheder.
- 86 (313) **D. rubi** View. Enkeltvist paa sukkerlokning i juli—aug. — Alm. over hele landet.
- 87 (315) **D. c-nigrum** L. Juli paa lys. — Alm. baade i frugtbare og magre egne.
- 88 (321) **D. xanthographa** F. Hyppig paa sukkerlokning ved gaarden i aug. — Alm. i hele landet.

- 89 (324) **D. plecta** L. Enkelte paa sukkerlokning nær gaarden i juni—juli. — Ret alm. i hele landet.
- 90 (325) **Axylia putris** L. Paa sukkerlokning ved gaarden i juni. — Ikke alm.
- 91 (326) **Pseueospaelotis augur** F. Paa sukkerlokning ved gaarden i juli. — Ret alm. overalt.
- 92 (328) **Actebia praecox** L. Et expl. paa lys ved gaarden $\frac{5}{8}$; Hansted $\frac{24}{7}$. — Et sandjordsdyr, sjælden. Især langs kysterne.
- 93 (330) **Eurois occulta** L. Ved Ørgaard $\frac{25}{7}$ — $\frac{1}{8}$. — Udbredt, men ikke alm.
- 94 (335) **Naenia typica** L. Ved Ørgaard $\frac{29}{7}$. — Udbredt over hele landet.
- 95 (336) **Tryphaena pronuba** L. Hyppig paa sukkerlokning juni—aug. — Alm. overalt.
- 96 (337) **T. comes** Tr. I antal, særlig den graa jydske form, i juli—aug. Enkelte af den rødblune form.— Alm. sukkerlokningsdyr overalt i landet.
- 97 (339) **T. fimbria** L. Ved Hansted $\frac{24}{7}$. — Udbredt over hele landet.
- 98 (343) **Barathra brassicae** L. Paa sukkerlokning ved gaarden juni—juli. — Alm. overalt.
- 99 (344) **Trichoclea albicolon** Hb. Enkelte paa sukkerlokning i juni. — Paa sandjord, enkeltvis og sjælden, oftest i Jylland.
- 100 (345) **Scotogramma trifolii** Rott. Nogle expl. i aug. — Alm. i hele landet.
- 101 (349) **Mamestra thalassina** Rott. Ved Hansted $\frac{11}{7}$. — Ret alm. overalt.
- 102 (350) **M. dissimilis** Knoch. Ved Ørgaard $\frac{30}{6}$ og ved Hansted $\frac{12}{7}$. — Udbredt, men ikke alm.
- 103 (351) **M. oleracea** L. Hyppig paa sukkerlokning ved gaarden i juni og juli. — Alm. i hele landet.
- 104 (352) **M. pisi** L. Larver i aug. Imago i juni—juli.— Alm. overalt.

- 105 (353) **M. dentina** Esp. Hyppig paa sukkerlokning, særlig i juni. — Forekommer overalt.
- 106 (355) **M. serena** F. Ved Hansted $\frac{27}{6}$. — Ikke alm. Stødvis forekomst i enkelte aar.
- 107 (358) **Dianthoecia bicruris** Hfn. Paa lys i juli; ved Hansted $\frac{23}{6}$. — Vistnok udbredt, mest paa blomster.
- 108 (365) **Aplecta nebulosa** Hfn. Paa sukkerlokning $\frac{11}{7}$. — Udbredt over hele landet, nærmest et skovdyr.
- 109 (367) **Heliophobus reticulata** Vill. 1 expl. paa sukkerlokning i juni, ved Hansted $\frac{22}{6}$. — Udbredt og ikke sj.
- 110 (368) **Tholera popularis** F. Hyppig paa lys ved gaarden i aug. — Ikke sj.; over hele landet.
- 111 (369) **T. cespitis** F. 1 expl. paa lys ved gaarden $\frac{19}{8}$. — Udbredt, men ikke alm., hyppigst paa sandjord.
- 112 (381) **Cerapteryx graminis** L. Alm. paa lys ved gaarden i juli—aug. 1 puppe klæk. $\frac{22}{7}$. — Alm. over hele landet, larven skadedyr.
- 113 (383) **Hyphilare lithargyria** Esp. Ved Hansted $\frac{2}{7}$. — Alm. overalt, paa enge og i skove.
- 114 (385) **H. littoralis** Curt. Ved Hansted $\frac{25}{6}$. — Ikke alm. En klitart, som oftest træffes langs Jyllands vestkyst.
- 115 (387) **Leucania conigera** F. Ved Ørgaard juli—aug. — Alm. i hele landet.
- 116 (388) **L. comma** L. Hyppig ved gaarden i juni—juli. — Alm. og allestedsnærværende.
- 117 (389) **L. impura** Hb. Nogle expl. ved Ørgaard, juli, Hansted $\frac{23}{6}$. — Alm. sukkerlokningsdyr overalt.
- 118 (390) **L. pallens** L. I antal ved Ørgaard juni—juli. — Vor almindeligste *Leucania*-art.
- 119 (392) **L. obsoleta** Hb. Enkelt $\frac{19}{6}$. — Sj.; et tagrørs-dyr.
- 120 (393) **L. pudorina** Schiff. Ved Hansted $\frac{23}{6}$. — Ikke alm., lokal. Især paa mosegrund.
- 121 (402) **Cucullia umbratrica** L. En del expl. i nærheden af Ørgaard, siddende om dagen paa pæle. Juni—juli. — Alm. overalt i landet.

- 122 (423) **Calocampa vetusta** Hb. Ved Hansted $\frac{8}{9}$. — Ikke sj., mest enkeltvis.
- 123 (429) **Crino adusta** Esp. 2 expl. paa sukkerlokning i juni, paa lys $\frac{11}{7}$. — Ikke alm. Hyppigst i Nordjylland.
- 124 (449) **Dyschorista suspecta** Hb. Ved Ørgaard $\frac{16}{8}$. — Ikke alm. Lokal.
- 125 (451) **Xanthia fulvago** L. og ab. **flavescens** Esp. Begge former paa sukkerlokning ved Ørgaard $\frac{23}{8}$. — Udbredt og tem. alm.
- 126 (458) **Amphipyra tragopoginis** L. $\frac{29}{7} - \frac{25}{8}$ talrig paa sukkerlokning paa telefonpæle, i hvis revner dyrerne om dagen skjulte sig. — Meget alm. overalt.
- 127 (459) **Stygiostola umbratica** Goeze. Ved Hansted $\frac{22}{6}$. — Ret alm. overalt.
- 128 (464) **Hadena rurea** F. Ret hyppig ved Ørgaard juni-juli, særlig ab. *alopecurus* Esp. Ogsaa paa lys. — Alm. overalt i landet.
- 129 (467) **H. monoglypha** Hufn. I antal ved Ørgaard juli-aug., Hansted $\frac{22}{6}$. — Alm. overalt.
- 130 (467a) **H. monoglypha** ab. **infuscata** White. Enkelt $\frac{16}{7}$. — De mørke former ses oftest i Jylland.
- 131 (468) **H. lateritia** Hufn. Ved Ørgaard juli. — Hyppigst paa sandjord.
- 132 (470) **H. sordida** Bkh. var. **engelharti** Duurl. Ved Ørgaard juni-juli. — Varieteten findes kun ved Jyllands vestkyst.
- 133 (471) **H. obscura** Hw. (= *gemina* Hb.). Hovedformen i antal ved Ørgaard juni-juli, ab. *remissa* Tr. $\frac{29}{6}$. — Ikke alm.
- 134 (473) **H. basilinea** F. Hyppig ved Ørgaard juni-juli. — Alm. overalt.
- 135 (474) **H. unanimis** Tr. Ved gaarden $\frac{4}{7}$. — Hist og her, ikke alm.
- 136 (478) **H. secalis** L. I antal juli-aug. — Alm. overalt.
- 137 (479) **Oligia strigilis** L. Hyppig paa sukkerlokning ved gaarden juni-juli. Ogsaa ab. *aethiops* Osth. — Alm. overalt. Den mørke form især i Nordjylland.

- 138 (480) **O. versicolor** Bkh. Ved Hansted $\frac{22}{6}$. — Ikke sj., især i løvskove. Ikke fundet paa Bornholm.
- 139 (481) **O. latruncula** Hb. Ved gaarden $\frac{3}{7}$, Hansted $\frac{24}{6}$. — Tem. alm. over hele landet. Meget varierende.
- 140 (482) **O. fasciuncula** Hw. I antal juni—juli, især ved lys. — Over hele landet, ikke sj.
- 141 (483) **O. literosa** Hw. var. **onychina** H. S. Sukkerlokning ved gaarden $\frac{5}{8}$. — Ikke alm., lokal. Varieteten er en ren jydsk vestkystform.
- 142 (490) **Sidemia fissipuncta** Hw. En larve paa Salix under sukkerlokning ved gaarden en aften i juni. Klæk. $\frac{9}{7}$. — Udbredt over hele landet, ikke sj.
- 143 (491) **Luperina testacea** Hb. Alm. paa lys ved gaarden i aug. — Alm. overalt.
- 144 (492) **Trachea atriplicis** L. I antal ved gaarden juni-juli. — Alm. over hele landet.
- 145 (493) **Euplexia lucipara** L. I antal ved gaarden juni-juli. — Udbredt og tem. alm. over hele landet.
- 146 (496) **Talpophila matura** Hufn. Enkeltvis ved lys i juli—aug. — Udbredt og tem. alm. over hele landet; hyppigst paa sandjord.
- 147 (499) **Hoplodrina alsines** Brahm. Ved Hansted $\frac{24}{6}$. Udbredt; især paa øerne. Sparsom i Vestjylland.
- 148 (500) **H. blanda** Schiff. Ved Hansted $\frac{25}{6}$. — Ikke alm. Spredte fund i Østjylland og paa Øerne. Kendt fra Skagen men ikke i Vestjylland.
- 149 (504) **Caradrina morpheus** Hfn. Ved Hansted $\frac{12}{7}$. — Tem. alm. over hele landet, især paa lys.
- 150 (506) **C. clavipalpis** Scop. $\frac{27}{7}$ ved Ørgaard, Hansted $\frac{24}{6}$. — Træffes i hele landet, ofte i huse. Larven paa alskens lave planter, men ogsaa paa tørre plantedele og i mel.
- 151 (508) **Petilampa arcuosa** Hw. Ved Hansted $\frac{12}{7}$. — Alm. overalt, især ♂♂, som sværmer om aftenen. Paa lys og sukkerlokning.
- 152 (510) **Gortyna leucostigma** Hb. Alm. ved gaarden juli—aug. — Ret alm. overalt, især paa sukkerlokning.

- 153 (511) **Apamea oculea** L. Enkeltvis paa sukkerlokning ved gaarden aug. — Udbredt i alle landsdele.
- 154 (513) **A. crinanensis** Burrows. Enkeltvis paa sukkerlokning ved gaarden aug. Ogsaa paa lys. — Ikke sj. i Jylland, en hedejordsart. Iovrigt kun lokal i Nordsjælland.
- 155 (514) **A. fucosa** Frr. Enkeltvis paa sukkerlokning ved gaarden aug. — Alm. i hele landet.
- 156 (516) **Hydroecia micacea** Hb. Paa lys ved gaarden i aug. — ♂ alm. overalt ved lys, ♀ sjældnere.
- 157 (522) **Calymnia trapezina** L. Enkelt $\frac{8}{8}$. — Alm., særlig som skovdyr, i hele landet. Larven, paa løvtræer, er vor mest berygtede mord-larve.
- 158 (531) **Arenostola elymi** Tr. Ved Hansted $\frac{24}{6}$. — Larven paa Elymus. Et kystdyr, stedvis ret alm.
- 159 (534) **A. pygmina** Hw. (= *Tapinostola fulva* Hb.). Enkelt paa lys ved gaarden i aug. — Spredt og ikke alm. Paa fugtige enge, hvor larven lever i Carex og græsser.
- 160 (546) **Pyrrhia umbra** Hufn. Paa sukkerlokning ved gaarden i juni—juli. — Udbredt over hele landet men ikke alm. Larven tages dog ret hyppigt paa Ononis.
- 161 (552) **Anarta myrtilli** L. Larver paa lyng i juni. Larver og imagines i juli—aug. — Udbredt i lyngegne, særlig Jylland og Bornholm.
- 162 (559) **Eustrotia uncula** Cl. Ved Hansted $\frac{24}{7}$. — Udbredt over hele landet. Paa enge og i moser.
- 163 (565) **Rivula sericealis** Scop. I antal i en vaad grøft i juli. — Alm. i hele landet paa fugtigt græs-terræn.
- 164 (568) **Hylophila prasinana** L. I juli ved lys. — Spar-som i Vestjylland. Alm. i bøgeskove.
- 165 (570) **Earias chlorana** L. Enkelt i juni. — Udbredt over hele landet.
- 166 (573) **Gonospileia mi** Cl. Juni. Larver i aug.—Dagflyver, alm.
- 167 (574) **G. glyphica** L. Enkeltvis i juni—juli. — Dagflyver, ret alm.

- 168 (583) **Plusia festucae** L. Ved Hansted $\frac{21}{7}$. — Udbredt, men af vekslende hyppighed.
- 169 (586) **P. chrysitis** L. Ved lys i juli. — Alm. i hele landet.
- 170 (587) **P. pulchrina** Hw. Ved Hansted $\frac{12}{7}$. — I hele landet, men ikke særlig alm.
- 171 (589) **P. gamma** L. Paa lys ved gaarden $\frac{25}{7}-\frac{7}{8}$. — Tiflyvende i maj—juni. Oftest talrig i aug.
- 172 (596) **Habrostola tripartita** Hfn. Hansted $\frac{29}{6}$. — Hele landet, ikke alm.
- 173 (598) **Scoliopteryx libatrix** L. Enkeltvis i aug.—Alm. overalt. Overvintrer som imago og kan træffes aaret rundt.
- 174 (616) **Hypena proboscidalis** L. Enkeltvis i juli—aug., bl. a. paa sukkerlokning ved gaarden $\frac{8}{8}$. — Alm. overalt, hvor der er nælder. Livlig og let at opskræmme.

Geometridae.

- 175 (622) **Pseudoterpnna pruinata** Hufn. I antal i lyngen i juli, let at opskræmme om dagen. — Alm. paa Jyllands heder, faa fund fra Øerne.
- 176 (628) **Chlorissa viridata** L. Larver paa lyng i aug., klæk. i marts. Imagines i antal ude i lyngen i juli. — En hedeart, udbredt i Jylland, ellers kun kendt fra Sjælland og Bornholm.
- 177 (631) **Rhodostrophia vibicaria** Cl. Et expl. om dagen $\frac{20}{6}$ i lyngen; Hansted $\frac{22}{6}$. — Tidligere en sjældenhed. Nu udbredt — men ikke alm. — i Jylland. Lokal paa Øerne. Foretrækker havets nærhed.
- 178 (640) **Acidalia rubiginata** Hufn. Paa lys ved gaarden $\frac{18}{7}$, Hansted $\frac{22}{6}$. — Ikke alm. I tørre egne.
- 179 (643) **A. floslactata** Hw. Enkelt $\frac{22}{6}$. — I Jylland, særlig i blaabærbevoksninger. Lokal paa Øerne.
- 180 (645) **A. immutata** L. Enkeltvis i juni—juli. — Alm. i hele landet. ♂ flyver op om dagen.
- 181 (654) **Sterrhia sylvestraria** Hb. Enkeltvis i juli paa lys. — Sjælden. En sandjordsart, især ved kysterne.

- 182 (657) **S. dimidiata** Hufn. Ved lys i juli. — Alm. udbredt i hele landet.
- 183 (658) **S. bisetata** Hfn. Ved Hansted $\frac{1}{7}$. — Udbredt og ret alm. i hele landet.
- 184 (665) **Lythria purpurata** L. Enkeltvis i juli—aug. — Alm. udbredt.
- 185 (668) **Ortholitha mucronata** Scop. Talrig i lyngen i juni og begyndelsen af juli. — Hyppig paa Jyllands heder. Meget sj. paa Øerne.
- 186 (669) **O. plumbaria** F. Hyppig i lyngen fra slutn. af juli og i aug. — Hyppig paa Jyllands heder. Meget sj. paa Øerne.
- 187 (670) **O. chenopodiata** L. Alm., let at opjage om dagen i juli—aug. — Alm. i hele landet.
- 188 (673) **Odezia atrata** L. Enkeltvis flyvende i Ørgaards have i juni. — Alm. overalt, dog ikke i Nordvestjylland.
- 189 (692) **Eucosmia undulata** L. Enkeltvis i juli. — Hist og her; ikke sj.
- 190 (697) **Lygris testata** L. Alm. ved gaarden, især paa lys, juli—aug. — Tem. alm. overalt, dog ikke paa Loll.-Falster.
- 191 (702) **Lyncometra ocellata** L. En del expl. i juni—aug. — Udbredt og ikke sj.
- 192 (706) **Thera variata** Schiff. I juli—aug. — Alm. i granskove, let at banke ud.
- 193 (709) **T. cognata** Thnbg. Ved Hansted $\frac{1}{7}$. — Alm. paa Bornholm, men ellers ret sjælden. Larven paa Juniperus.
- 194 (711) **Dysstroma truncata** Hufn. Enkelt $\frac{1}{8}$. — Alm. i 2 kuld.
- 195 (712) **D. citrata** L. Enkelt $\frac{23}{8}$. — Udbredt over hele landet, men lokal og ikke alm.
- 196 (713) **Xanthorrhoea fluctuata** L. Enkeltvis nær gaarden i aug. — Larven bl. a. paa kaal, alm. over hele landet.
- 197 (714) **X. montanata** Schiff. Alm. ved Ørgaard i juni—juli. — En af de almindeligste danske maalere.
- 198 (716) **X. ferrugata** Cl. En del ved lys nær gaarden i aug. — Alm. overalt.

- 199 (717) **X. spadicearia** Schiff. Fra $^{21}/_7$ til $^{4}/_8$. — Ikke helt alm., mest i sandede egne og noget lokal.
- 200 (721) **X. lignata** Hb. Enkelte expl. af første kuld i juni og af andet kuld i aug. ved lys nær gaarden. — Alle landsdele, men ikke alm.
- 201 (723) **Colostygia pectinataria** Knoch. Ved Hansted $^{12}/_7$. — Alm., især i fugtige skove, dog ogsaa i klitter.
- 202 (724) **C. didymata** L. Enkelte i juli og beg. af aug. — Alm., særlig i fugtige skove og krat.
- 203 (736) **Euphyia bilineata** L. I juni, juli og aug., sandsynligvis i een generation, idet larven overvintrer. — Meget alm. overalt.
- 204 (742) **Epirrhoë rivata** Hb. Enkelte i juli og beg. af aug. — I hele landet, men ikke helt alm. Kun eet kuld.
- 205 (743) **E. alternata** Müll. Enkelte i juni og slutn. af juli. — Alm. overalt. 2 kuld.
- 206 (753) **Perizoma albulata** Schiff. Ved Hansted $^{22}/_6$. — Alm. paa enge. Larven paa Rhinanthus.
- 207 (755) **Hydriomena sordidata** F. Ved Hansted $^{18}/_7$. — Ikke sj., hyppigst i Jylland.
- 208 (774) **Eupithecia subfulvata** Hw. Juli—aug. — Tem. alm. i alle landsdele.
- 209 (799) **E. nanata** Hb. Ved lys nær gaarden i aug., Hansted $^{27}/_6$. — Udbredt i lyngegne i hele landet. Larven paa Calluna.
- 210 (808) **E. vulgata** Hw. Nær gaarden i juni. — Vor almindeligste *Eupithecia*-art.
- 211 (809) **E. satyrata** Hb. Enkelt $^{4}/_7$. — Alm. overalt.
- 212 (810) **E. castigata** Hb. Enkeltvis ved gaarden $^{21}/_6$. Talrig ved lys i juli. — Alm. overalt.
- 213 (814) **Chloroclystis rectangulata** L. Ved gaarden i juli. — Alm., oftest som havedyr.
- 214 (817) **Abraxas grossulariata** L. I juli—aug. — Udbredt over hele Danmark, særlig som hoveddyr.
- 215 (823) **Cabera pusaria** L. Alm. i nærheden af gaarden i juni. — Overalt, hvor der er Salix.

- 216 (824) **C. exanthemata** Scop. Ved gaarden i juli og aug.
— Alm., larven paa Salix.
- 217 (827) **Macaria signaria** Hb. Paa lys i juli. — Udbredt
i granskove.
- 218 (847) **Ellopia prosapiaria** L. Ved lys i juli. — I naale-
skove, tidligere en sjældenhed. Nu udbredt, men enkelt-
vis. Hyppig paa Bornholm.
- 219 (866) **Crocallis elinguaria** L. Ved lys i juli—aug. —
Udbredt over hele landet. Larven, som lever paa løv-
træer og buske, er berygtet som mord-larve.
- 220 (872) **Biston betularius** L. Ved Hansted $\frac{24}{7}$. — Alm.
i alle landsdele i løvskove.
- 221 (889) **Gnophos obscurata** Schiff. I juli ved gaarden.
Affløjet $\frac{15}{8}$. — Ikke alm. og meget lokal. I Jylland sær-
lig paa hedestrækninger.
- 222 (892) **Ematurga atomaria** L. Hyppig i lyngen i juni,
juli og aug. — Overalt i landet, hvor der er lyng.
- 223 (893) **Selidosema ericetaria** Vill. Ved Ørgaard $\frac{27}{7}$,
Vilsbøl Plantage $\frac{1}{8}$. — Ikke alm. og lokal. Hyppigst i
Jylland og paa Bornholm.

Pyralidae.

- 224 **Aphomia sociella** L. Ved Ørgaard $\frac{4}{8}$. — Udbredt i
hele landet.
- 225 **Crambus fascelinellus** Hb. Nogle expl. i juli—aug.
— Paa sandede steder, ikke sjælden.
- 226 **C. inquinatellus** Schiff. I antal ved gaarden i juli—
aug. — Udbredt overalt.
- 227 **C. deliellus** Hb. Paa lys ved gaarden i aug. — Paa
sandede steder, ikke alm.
- 228 **C. tristellus** Schiff. Hyppig i juli—aug.— Overalt alm.
- 229 **C. fulgidellus** Hb. Enkelt $\frac{8}{8}$. — Paa tørre, sandede
steder, ikke alm.
- 230 **C. pinellus** L. Ved Ørgaard i juli og aug. — I fyrre-
skove, ikke alm.
- 231 **C. falsellus** Schiff. En del expl. $\frac{30}{7}$ — $\frac{9}{8}$. — Udbredt
i hele landet.

- 232 **C. hortuellus** Hb. Alm. ved gaarden i juni og juli.—
Meget alm. overalt.
- 233 **C. silvellus** Hb. Enkelt $\frac{18}{7}$. — Paa fugtige enge. Ikke
alm.
- 234 **C. culmellus** L. Hyppig i juli—aug. — Overalt alm.
- 235 **C. pratellus** L. Hyppig ved gaarden i juni—juli.—
Overalt alm.
- 236 **C. hamellus** Thnbg. 1 expl. i plantningen Nord for
Nors Sø $\frac{8}{8}$. — I Sønderjylland, i Spandet Egekrat, hvor
arten første gang blev taget som dansk $\frac{1}{8}$ 1938, og særlig
ved Stensbæk, hvor den var ret alm. i aug.—sept.
Meget sj. i det øvrige Danmark.
- 237 **Platytes alpinellus** Hb. Enkelt $\frac{30}{7}$. — Paa sandede
græsmarker, ikke alm.
- 238 **Chilo phragmitellus** Hb. Ved sørerne i juli og aug.—
Alm., hvor Phragmites vokser.
- 239 **Acentropus niveus** Oliv. En ♂ paa lys $\frac{18}{7}$. — Udbredt,
undertiden i antal, akvatisk.
- 240 **Anerastia lotella** Hb. Ved Ørgaard i juni, juli og aug.
— Udbredt, paa sandede steder.
- 241 **Homoeosoma nimbella** Dup. Enkeltvis i nærheden
af Ørgaard i juli. — Udbredt.
- 242 **Ephestia elutella** Hb. I juli. — Alm., særlig i huse.
- 243 **Pempelia dilutella** Hb. Enkelt $\frac{27}{7}$. — Ikke alm.
- 244 **P. ornatella** Schiff. I juli og aug.—Paa tørre marker.
Ikke sj.
- 245 **Hypochalcia ahenella** Schiff. I juli og beg. af aug.,
ogsaa ved selve gaarden. — Udbredt og ikke sj.
- 246 **Salebria fusca** Hw. Ved Ørgaard $\frac{4}{8}$. — Udbredt, særlig
i lyngegne.
- 247 **Dioryctria abietella** Schiff. Talrig paa lys i juli. —
Udbredt i naaleskove.
- 248 **Nymphula nympaeaata** L. Ved Bagsø $\frac{15}{7}$. — Alm.
ved stillestaaende vand, larven akvatisk.
- 249 **N. stagnata** Don. Paa lys ved gaarden samt ved Bag-
sø i aug. — Udbredt i alle landsdele. Larven akvatisk.

- 250 **Eurrhypara urticata** L. Enkelt $\frac{4}{8}$. — Normalt alm. i juni og beg. af juli.
- 251 **Scoparia ambigualis** Tr. Paa lys $\frac{11}{7}$. — Alm. udbredt.
- 252 **S. dubitalis** Hb. Enkeltvis i aug. — Alm. udbredt.
- 253 **S. crataegella** Hb. Paa lys ved gaarden i aug. og paa husmuren sammen med *S. murana* i juli. — Overalt alm.
- 254 **S. frequentella** Stt. Ved Ørgaard i juli. — Ikke alm.
- 255 **S. sudetica** Z. Ved Ørgaard $\frac{27}{7}-\frac{9}{8}$. — Tem. alm. i Jylland. Sjældnere paa Fyn og Sjælland.
- 256 **S. murana** Curt. Juni—aug. paa Ørgaard. — Kun taget i ganske faa expl. landet over.

Paa Ørgaard hararten imidlertid slaaet bo. Stuehusets mos-klædte straataglægning afgiver ypperlige vilkaar for larven, og fra $\frac{21}{6}$ 1954 til $\frac{9}{8}$ 1957 har jeg (W.-H.) hver sommer saa godt som hver morgen kunnet tage imagines i antal, siddende paa husmuren eller under tagskægget. Ved midten af juli syntes der at indträffe et par dage, hvor dyret viste sig sparsommere og blandet med andre arter, navnlig *S. crataegella* Hb., men fra sidste halvdel af juli til ind i aug. var der mange igen (ny generation?).

- 257 **S. truncicolella** Stt. Ved Ørgaard i slutn. af juli og i aug. — Udbredt, alm. i Nordsjælland.
- 258 **Titanio pollinalis** Schiff. Et expl. $\frac{12}{7}$ paa Achillea. — Kun fundet i Jylland, hvor den i visse egne er alm. Den flyver om dagen i solskin.
- 259 **Pionea lutealis** Hb. Alm. ved Ørgaard, navnlig i aug. — Overalt alm. paa græsmarker.
- 260 **Pyrausta sambucalis** Schiff. Ved Ørgaard i juli, i Vilsbøl Pl. i aug. — Alm. udbredt.
- 261 **P. aerealis** Hb. Ved Ørgaard $\frac{7}{8}$. — Ikke alm., paa sandede steder.
- 262 **P. cespitalis** Schiff. Ved Ørgaard i juli og aug. — Alm. udbredt, ogsaa paa tørre marker.
- 263 **Heliothela atralis** Gn. Talrig i klitgryderne i juli. — Ikke alm.
- Tortricidae.
- 264 **Acleris variegana** Schiff. Ved Ørgaard i slutn. af juli og i aug. — Udbredt i aug.—oktober.

- 265 **A. comariana** Z. Ved gaarden i aug. — Alm. udbredt paa jordbær.
- 266 **A. aspersana** Hb. Ved Ørgaard i aug. — Udbredt paa fugtige enge.
- 267 **A. holmiana** L. I Vilsbøl Pl. $\frac{7}{8}$. — Udbredt og alm., navnlig i haver.
- 268 **A. reticulata** Ström og ab. **dimidiana** Froel. Ved Ørgaard i aug. — Alm. udbredt.
- 269 **Philedone gerningana** Schiff. Ved Ørgaard $\frac{30}{7}$. — Udbredt i lyngegne.
- 270 **Epagoge gnomana** Cl. Ved Ørgaard og Bagsø i aug. — Udbredt og ikke sjælden.
- 271 **Capua angustiorana** Hw. Enkelt dødt expl. i juli. — Udbredt, men ikke alm. Undertiden hyppig om Taxus.
- 272 **Cacoesia xylosteana** L. Enkelt $\frac{4}{8}$. — Overalt alm. i juni—juli.
- 273 **C. rosana** L. En del expl. ved Ørgaard i slutn. af juli og i aug. — Meget alm., især i haver.
- 274 **Pandemis heparana** Schiff. Paa lys i juli—aug. — Overalt alm., særlig i haver.
- 275 **Argyrotoxa forskåleana** L. I Vilsbøl Pl. $\frac{7}{8}$. — Overalt udbredt.
- 276 **Tortrix cinctana** Schiff. I nærheden af Ørgaard i slutn. af juli og i aug. — Ikke sj. paa tørre steder.
- 277 **T. viburniana** F. Ved Ørgaard og paa lys i juli—aug. — Paa lyngheder, særlig i Jylland.
- 278 **T. paleana** Hb. Nær Ørgaard $\frac{15}{7}$. — Alm. udbredt.
- 279 **Cnephasia longana** Hw. Enkelt $\frac{22}{7}$. — Udbredt paa sandede steder.
- 280 **C. incertana** Tr. Særlig ved lys i juli og beg. af aug. — Udbredt i juni—juli.
- 281 **C. pascuana** Hb. Nær Ørgaard $\frac{4}{8}$. — Udbredt i juli.
- 282 **C. virgaureana** Tr. Talrig ved lys i juli og beg. af aug. — Udbredt, men ikke alm., i juli.
- 283 **C. chrysanthearana** Dup. Nær Ørgaard i slutn. af juli og i aug. — Alm. udbredt.

- 284 **Nephodesme osseana** Scop. Talrig ved Ørgaard i juli—aug. — Udbredt i hele landet.
- 285 **Phalonia cnicana** Dbld. Enkelt $\frac{4}{8}$. — Alm. udbredt.
- 286 **P. kindermanniana** Tr. En del expl. i juli. — Ret hyppig om foderplanten Artemisia campestris.
- 287 **P. pallidana** Zell. Ved lys $^{13-14}/_7$. — Ikke alm. Larven lever i Jasione montana.
- 288 **P. ciliella** Hb. Nær Ørgaard juli—aug. — Udbredt og ret hyppig paa lyngbakker.
- 289 **Clidonia hartmanniana** Cl. Paa lys $^{13}/_7$. — Udbredt og ret hyppig.
- 290 **Clyśia angustana** Tr. Nær Ørgaard i slutn. af juli og i aug. — Udbredt i lyngmoser og paa tørre marker.
- 291 **Euxanthis hamana** Tr. I beg. af aug. — Alm. udbredt paa græsmarker i juni—juli.
- 292 **Evetria buoliana** Schiff. Enkeltvis $\frac{8}{8}$. — Udbredt i fyrréplantager.
- 293 **E. pinicolana** Dbld. Enkeltvis i juli—aug. — Først adskilt fra *buoliana* og konstateret som dansk i de senere aar.
- 294 **Apotomis semifasciana** Hw. I antal i pilekrat ved Ørgaard i slutn. af juli og beg. af aug. — Udbredt i hele landet.
- 295 **A. betulaetana** Hw. Ved Bagsø $\frac{7}{8}$. — Udbredt, larven paa birk.
- 296 **Argyroploce variegana** Hb. Ved Ørgaard $^{18}/_7$. — Alm. udbredt, særlig i haver.
- 297 **A. schulziana** F. Enkeltvis i juli—aug. — Udbredt paa lyngbakker.
- 298 **A. hercyniana** Tr. Paa lys $^{16}/_7$. — Udb. i granskove.
- 299 **A. lacunana** Dup. I nærheden af Ørgaard og ved Bagsø i slutn. af juli og beg. af aug. — Meget alm.
- 300 **Endothenia antiquana** Hb. Ved Ørgaard i juni og juli. Paa lys ved Gl. Skole i aug. — Alm. udbredt.
- 301 **Ancylis inornatana** H. S. Paa lys i juli og beg. af aug. — Udbredt omkring pil i maj, juni, juli.

- 302 **Polychrosis littoralis** Westw. Enkelt $^{25}/_7$. — Paa sandede steder langs kysten. Ikke alm.
- 303 **Semasia rufimitrana** H. S. I antal i Vilsbøl Pl. $7/_8$. — Ikke alm., men i alle landsdele, i juli.
- 304 **S. ratzeburgiana** Rtz. Enkeltvis i juli og beg. af aug. — Udbredt i granskove i juli. Ofte talrig.
- 305 **S. stroemiana** Thnbg. I Vilsbøl Pl. $7/_8$. — Alm. udbredt i egeskove.
- 306 **S. nanana** Tr. Ved lys $^{16}/_7$. — Udbredt i granskove, ofte i stort antal.
- 307 **S. cruciana** L. Ikke sjælden i juli—aug. — Udbredt om lav pil.
- 308 **S. trimaculana** Don. Paa lys ved Gl. Skole i juli og beg. af aug. — Alm. udbredt om Ulmus i juni—juli.
- 309 **Gypsonoma neglectana** Dup. Enkelt ved Ørgaard i juli. — Ikke sjælden om pil.
- 310 **Lathronympha hypericana** Hb. I nærheden af Ørgaard i juli. — Alm. om Hypericum.
- 311 **Thiodia citrana** Hb. Enkelt $4/_8$. — Paa Øerne, men hidtil ikke angivet fra Nørrejylland.
- 312 **Notocelia roborana** Tr. Enkeltvis ved roser i haven i juni, juli og beg. af aug. — Larven paa roser. Alm., særlig i haver.
- 313 **Eucosma scopoliana** Hw. Paa lys ved Gl. Skole i juli og beg. af aug. — Udbredt og alm. i juni—juli. Larven paa Centaurea scabiosa.
- 314 **E. cana** Hw. Enkeltvis i slutn. af juli og beg. af aug. — Overalt alm. juni—juli.
- 315 **E. foenella** L. Paa lys ved Gl. Skole $4/_8$. — Alm. udbredt om Artemisia vulgaris.
- 316 **E. farfarae** Fletcher. Enkelt ved Ørgaard $4/_7$. — Alm. udbredt.
- 317 **E. cynosbatella** L. Enkelt ved Ørgaard $30/_6$. — Alm. omkring rosenbuske.
- 318 **E. penkleriana** F. R. Nær Ørgaard $23/_7$. — Overalt almindelig.

- 319 **E. tedella** Cl. Nær Ørgaard $\frac{12}{6}$. — Alm. i granskove.
- 320 **E. semifuscana** Stph. 6 expl. paa lys ved Ørgaard i aug. — Ikke sjælden om Salix.
- 321 **E. solandriana** L. Ved Ørgaard i aug. — Alm. udbredt.
- 322 **Hemimene plumbagana** Tr. Enkelt $\frac{12}{7}$. — Ikke sjælden om Achillea.
- 323 **H. petiverella** L. Enkeltvis $\frac{31}{7}-\frac{9}{8}$. — Alm. om Achillea.
- 324 **Lipoptycha plumbagana** Scop.? Et expl. ved Ørgaard $\frac{21}{6}$. — Arten er udbredt paa solrige steder.
- 325 **Laspeyresia pomonella** L. Et expl. ved Ørgaard $\frac{14}{7}$. — Alm. som larve, men imago ses ikke ofte.
- 326 **L. gallicana** Guen. Enkeltvis om dagen paa skærmblomster i beg. af aug. — Fundet de fleste steder. Imago flyver om dagen i solskinnet.

Glyptapterygidae.

- 327 **Simaethis fabriciana** L. Enkeltvis ved Ørgaard i juni og juli. — Overalt alm., ofte paa Tanacetum.
- 328 **Choreutis myllerana** F. Nær Ørgaard $\frac{24}{7}$. — Udbredt, ikke alm.

Pterophoridae.

- 329 **Platyptilia pallidactyla** Hw. Ved Ørgaard i juli, paa lys i juli og aug. — Udbredt i juni—juli.
- 330 **P. gonodactyla** Schiff. 1 expl. ved følfod i aug. — Tem. alm. i 2 kuld. Larven paa Tussilago og Petasites. 2. kulds larver overvintrer.
- 331 **Stenoptilia bipunctidactyla** Hw. Paa lys $\frac{28}{7}-\frac{9}{8}$. — Udbredt i 2 kuld. Larven paa Scabiosa.
- 332 **S. pneumonanthes** Schleich. Ved Ørgaard $\frac{19}{7}$. — Meget sjælden. Kun fundet i Bot. Have i Kbhvn. og i Dover Pl. i Jylland. Larven paa Gentiana.
- 333 **S. pterodactyla** L. Ved Ørgaard i juli—aug. — Alm. paa tørre, solrige steder.
- 334 **Oxyptilus pilosellae** Z. I antal i juli—aug. — Alm. paa tørre skovlysninger. Larven paa Hieracium.

- 335 **O. parvidactylus** Hw. Ved Ørgaard i juli, ogsaa paa lys. — Paa lyngbevoxede skovbakker. Ikke alm. Larven paa Hieracium.
- 336 **Leioptilus scarodactylus** Hb. Ved lys $11/7$. — Udbredt paa tørre skovlysninger. Larven paa Hieracium.
- 337 **Alucita tetradactyla** L. Enkelt $13/7$. — Udbredt og ikke sj. paa tørre steder.
- 338 **A. pentadactyla** L. Juli. — Alm. overalt. Larven paa Convolvulus.
- Gelechiidae.
- 339 **Depressaria conterminella** Z. Enkelt $8/8$. — Ikke alm.
- 340 **Hofmannophila pseudospretella** Stt. Alm. ved gaarden i juli—aug. — Alm., træffes særlig i huse.
- 341 **Borkhausenia fuscescens** Hw. Beg. af aug. — Fundet adskillige steder over hele landet.
- 342 **Endrosis lacteella** Schiff. Et par gange i og ved gaarden i juli. — Alm., særlig i huse.
- 343 **Tachyptilia populella** Cl. Juli og aug., også formen *ambrodella* Med. — Overalt om poppel og pil.
- 344 **T. temerella** Z. Imago $3/8$, $11-16/7$ var larven talrig paa Salix repens. — I de senere aar er larven taget i antal forskellige steder paa Salix repens.
- 345 **Teleia vulgella** Hb. Enkelt $6/8$. — Fundet enkeltvis paa Øerne.
- 346 **Gelechia continua** Z. En del expl. i juli—aug. — Kun kendt fra Jylland (Slettestrand, Hald, Fanø).
- 347 **Bryotropha terrella** Hb. Ved Ørgaard $6/7$. — Hyppig overalt.
- 348 **B. senectella** Z. En del expl. nær Ørgaard i juli og aug. — Ret udbredt, men ikke alm., undtagen paa Bornholm.
- 349 **B. mundella** Dgl. Nær Ørgaard $13/7$. — Ikke alm.; i Jylland og Fyn.
- 350 **B. affinis** Dgl. Nær Ørgaard $14/7$. — Ikke alm., men udbredt og undertiden i antal. Larven i mos paa mure og tage.

351 **Stomopteryx taeniorella** Z. Enkeltvis nær Ørgaard $\frac{16}{7}$ — $\frac{22}{7}$. — Kun kendt fra Sjælland (Asserbo, Jægerspris, Kregme).

352 **Didactylota kinkerella** Snell. 1 expl. $\frac{12}{7}$. — Kun kendt hidtil som larve (Bøtø).

Momphidae.

353 **Tebenna raschkiella** Z. Taget nær Ørgaard $\frac{6}{8}$. — Udbredt og undertiden taget i antal, navnlig som larve paa Epilobium angustifolium.

Cemostomidae.

354 **Cemostoma laburnella** Stt. I Vilsbøl Pl. $\frac{7}{8}$. — Udbredt og flere steder hyppig.

Coleophoridae.

355 **Coleophora albidella** H. S. Enkelt $\frac{6}{8}$. — Sækken er alm. paa Salix repens, imago mg. sj. (Skagen).

Elachistidae.

356 **Elachista argentella** Cl. 1 expl. ved Ørgaard $\frac{3}{7}$. — Udbredt og ikke sj. Larven ofte talrig f. ex. i Elymus.

357 **E. triatomea** Hw. Nær Ørgaard $\frac{13}{7}$. — Udbredt over hele landet.

Scythrididae.

358 **Scythris variella** Stph. Nær Ørgaard $\frac{15}{7}$. — Kun kendt fra Fanø og Bornholm.

Hyponomeutidae.

359 **Hyponomeuta malinellus** Z. Enkelt $\frac{4}{8}$. — Udbredt og ret alm. i haver i juli.

360 **Argyresthia goedartella** L. Enkelt $\frac{4}{8}$. — Overalt ret alm. om birk og el.

361 **Cerostoma vitellum** L. Ved Ørgaard i aug. — Alm. udbredt.

362 **C. paranthesemellum** L. Nær Ørgaard $\frac{28}{7}$. — Udbredt og ret alm.; særlig i bøgeskove.

363 **Plutella maculipennis** Curt. I antal ved Ørgaard i

juli-aug. — Overalt alm. fra juni til okt. Kan optræde skadelig paa dyrkede Cruciferer.

Tineidae.

364 **Scardia boleti** F. Enkelt $\frac{4}{8}$. — Udbredt, men ikke helt alm. Larven i træsvampe og raaddent træ.

365 **Tinea insectella** F. (= *misella* Z.). Nær Ørgaard $\frac{29}{7}$. — Udbredt især ved menneskeboliger, men ikke alm.

Micropterygidae.

366 **Micropteryx calthella** L. Ved Ørgaard $\frac{5}{7}$. — Udbredt og undertiden hyppig, især paa fugtige enge.

Sammenfattende kan det siges, at over $\frac{1}{6}$ af samtlige ca. 2135 fra Danmark kendte arter af sommerfugle er fundet paa det lille omraade, som reservatet og dets omgivelser repræsenterer. Ingen af de fundne arter er nye for landet, men nogle enkelte (*Epichnaptera ilicifolia*, *Crambus hamellus*, *Scoparia murana*, *Stenoptilia pneumonanthes*, *Tachyptilia temerella*, *Scythris variella*) var i forvejen kun kendt i ganske faa exemplarer eller fra ganske faa lokaliteter. En stor del af arterne (f. ex. *Hipparchia semele*, *Fabriciana niobe*, *Issoria lathonia*, *Cupido minimus*, *Maculinea alcon*, *Hesperia comma*, *Celerio galii*, *Dasychira fascelina*, *Malacosoma castrensis*, *Lasiocampa trifolii*, *Epichnaptera ilicifolia*, *Diacrisia sannio*, *Euxoa curvatoria*, *E. tritici*, *Agrotis vestigialis*, *A. cinerea*, *Actebia praecox*, *Trichoclea albicolon*, *Tholera cespitis*, *Hyphilare littoralis*, *Hadena lateritia*, *Talpophila matura*, *Arenostola elymi*, *Acidalia rubiginata*, *Sterrha sylvestraria*, *Xanthorrhoea spadicearia*, *Crambus fascelinellus*, *C. deliellus*, *C. fulgidellus*, *Platytes alpinellus*, *Anerastia lotella*, *Pyrausta aerealis*, *Cnephasia longana*, *Phalonia pallidana*, *Polychrosis littoralis*, *Alucita tetractyla*) er, som venteligt var, specielt knyttet til sandede egne og klitter; men i betragtning af den nærliggende plantage og af, at lyslokning

rimeligvis lokker dyr endog langt borte fra, er det ikke mærkeligt, at saa mange skovdyr ogsaa er fundet deroppe. Interessantere er de dyr, om hvis udbredelse iøvrigt man ved, at de specielt er knyttet til kær og hedemoser (*Maculinea alcon*, *Leucania pudorina* og muligt flere). Heden selv bidrager naturligvis sit store contingent til faunaens sammensætning (f. ex. *Rhyacia strigula*, *Apamea crinanensis*, *Anarta myrtilli*, *Pseudoterpnna pruinata*, *Chlorissa viridata*, *Ortholitha mucronata*, *O. plumbaria*, *Eupithecia nanata*, *Gnophos obscurata*, *Ematurga atomaria*, *Salebria fusca*, *Tortrix viburniana*, *Phalonia ciliella*, *Clytia angustana*, *Argyroploce schulziana*, *Oxyptilus parvidactylus*); men den lille Bagsø synes ogsaa at give sit særlige bidrag (ex.: *Palaeochrysophanus hippothoë*, *Lysandra amanda*, *Nymphula nymphaeaata* og *stagnata*, *Argyroploce lacunana*).

De fleste af arterne er mere eller mindre almindeligt udbredt over hele det øvrige Danmark, men nogle har en lokal forekomst. Enkelte er kun kendt fra Nord- og Vestjylland og ganske faa andre steder (ex.: *Maculinea alcon*, *Epichnaptera ilicifolia*) eller hyppigst i Nordjylland (*Philea irrorella*, *Agrotis cinerea*); nogle er kun kendt fra den jydske Vestkyst (*Hadena sordida* var. *engelharti*, *Oligia literosa* var. *onychina*); eller kun fra Jylland (*Titanio pollinalis*, *Gelechia continua*); eller kun vest for Storebælt (*Adopaea flava*, *Bryotropha mundella*). En del af de fundne arter har, som venteligt var, deres hyppigste forekomststeder i Jylland (ex.: *Dasychira fasciella*, *Trichoclea albicolon*, *Hyphilare littoralis*, *Crino adusta*, *Apamea crinanensis*, *Anarta myrtilli*, *Pseudoterpnna pruinata*, *Chlorissa viridata*, *Rhodostrophia vibicaria*, *Acidalia floslactata*, *Ortholitha mucronata* og *plumbaria*, *Hydriomena sordidata*, *Selidosema ericetaria*, *Scoparia sudetica*, *Tortrix viburniana*), enten af økologiske grunde (f. ex. de ovenfor nævnte til heden knyttede arter) eller af geografiske aarsager. Men enkelte af de i reservatet fundne

arter er netop mindre hyppige i Jylland end i det øvrige Danmark (ex. *Fabriciana adippe*, *Sphinx pinastri*, *Orgyia antiqua*, *Hoplodrina alsines*; *Teleia vulgella*, *Stomopteryx taeniolella*, *Didactylota kinkerella*); de sidste tre er ikke hidtil kendt fra Jylland. Og for andre angives det, at de er sjældnest specielt i Nord- og Vestjylland (ex.: *Aphantopus hyperanthus*, *Inachis io*, *Mesoacidalia charlotta*, *Lysandra amanda*, **Hoplodrina blanda*, *Hylophila prasinana*, *Odezia atrata*, **Thiodia citrana*); de med * mærkede er ikke hidtil kendt fra dette område, og *Stenoptilia pneumanthes* og *Scythris variella* er overhovedet kun fundet ganske faa andre steder. Se ogsaa ovenfor om de meget sjældne arter. — For enkelte arters vedkommende gælder det, at det er den specielle mørke jydske form, der er fundet (*Hadena sordida* var. *engelharti*, *Oligia literosa* var. *onychina*), eventuelt sammen med hovedformen (*Hadena monoglypha* ab. *infuscata*, *Oligia strigalis* ab. *aethiops*).

Altsaa en fauna præget væsentligt af jydske former, men ogsaa indeholdende en del arter, man ikke paa forhaand ville have ventet der. Arter, man ville turde tilægge relikt-karakter, er ikke fundet.