

Tredje tillæg til
»Fortegnelse over Danmarks biller« (Coleoptera)

af VICTOR HANSEN

(With a summary: Third addition to the list of Danish Coleoptera).

Siden det andet tillæg (Ent. Meddr, 40: 109–118, 1972) til »Fortegnelse over Danmarks biller« (Coleoptera) (Ent. Meddr, 33: 1–507, 1964) er der konstateret 5 nye arter for vor fauna, nemlig *Plectophloeus nubigena* Reitt., *Podistra pilosa* Payk., *Crepidodera femorata* Gyll., *Ceuthorrhynchus ignitus* Germ. og *Bradybatus kellneri* Bach. Hertil kommer 3 synantrope arter, nemlig *Attagenus fasciatus* Thunb. (*gloriosae* F.), *Reesa vespulae* Milliron og *Sphaericus gibbioides* Boield.

Dette tillæg indeholder oplysning om disse 8 arter, der er mærkede med *, samt oplysninger af interesse om andre danske arter.

For bidrag til tillægget takker jeg Kristian Arevad, Frits Bangsholt, Michael Hansen, Mogens Holmen, Viggo Mahler Jensen, Palle Jørum, Gunnar Pritzl og Ole Vagtholm-Jensen.

15. *Bembidion litorale*. Ejstrupholm, i stort antal, august 1970, maj 1971 (1972 forsvundet).
30. *Anthracus consputus*. Brandbjerg vest for Jægerspris Nordskov, ketset i stort antal på *Polygonum amphibium*, 12.8.1972 ved 17-tiden, alle uudhærdede (Bangsh.).
34. *Amara anthobia*. Skallingen (Mahler J.).
34. *A. fusca*. Femmøller (Bangsh.); Mønsted kalkgruber (Jørum).
35. *A. majuscula*. Svinø strand, 1 eks. 28.7.1971, flyvende til lys (Michael H. leg., V. H. det.). Ved Slangerup (jfr. 2. tillæg: 110) er arten genfundet i antal flere gange i juni 1972, men kun få hunner.
36. *Pterostichus punctulatus*. Mønsted kalkgruber (Jørum).
37. *Pt. angustatus*. St. Nørlund plantage mellem Ikast og Ejstrupholm, 1 eks. under en forkullet granstamme, 28.8.1972 (Mahler J.); Hareskov ved det nedlagte savværk, 2 eks. under lignende forhold, 18.3. og 17.8.1972 (Michael H.).
44. *Demetrias imperialis*. Kagsmose, 1 eks. 25.5.1972 (Pritzl). Arten er ikke hidtil hos os fundet nordligere end Engestofte ved Maribo.

Tredje tillæg til billefortegnelsen

44. *Dromius longiceps*. Læsø (Nordmarken), 1 eks. i klitterne, 15.6.1972 (Bangsh.); Strandhuse lige nord for Køge, 1 ♀ på strandeng med tagrørsbevoksning, 27.7.1971, Hundige strand ved Lille Vejleås udløb, lignende lokalitet, 1 ♀ 11.8.1971 (Arevad).
45. *Dr. fenestratus*. Ejstrupholm-egnen, ret hyppig under bark af gran og fyr (Mahler J.); Yderby Lyng på Sjællands Odde, rester af 2 døde imagines under fyrebark med angreb af *Pityogenes bidentatus*, *P. quadridens* og *Orthotomicus suturalis*, 15.10.1972 (Pritzl).
49. *Bidessus unistriatus*. Svinø strand, 1 eks. i et lille vandhul, 28.4.1972 (Michael H.).
51. *Hydroporus melanocephalus*. Harrild hede ved Brande, i antal i og under sphagnum og andre mosser på sandbund i en udtørret hedenmose, 4.-11.11.1972; et enkelt eks. af hunformen med matte vingedækker (Mahler J.).
52. *H. discretus*. Læsø (Boelstrøm og Lundbæk), 7.9.1970 (Bangsh.).
56. *Rhantus punctatus* bør benævnes *pulverosus* Steph. (*punctatus* Fourcr.). Udbredt i alle 3 områder og vistnok ikke særlig sjælden (M. Holmen).
57. *Colymbetes paykulli*. Som den foregående.
58. *Dytiscus circumflexus*. Utterslev mose, 1 eks. af den glatte hunform, 26.9.1970 (Michael H.).
60. *Gyrinus minutus*. Meget talrig i gamle brunkulsgrave i Midtjylland, oftest i store flokke på flere hundrede individer (Vagtholm-J.).
66. *Cercyon granarius*. Utterslev mose, 1 eks. sightet af opskyl, 29.3.1972 (Michael H.).
67. *Hydrobius fuscipes*. Både hovedformen og varieteterne *rottenbergi* Gerh. og *subrotundus* Steph. forekommer hos os og er antagelig ikke særlig sjældne; *rottenbergi* foretrækker vistnok brakvand.
69. *Berosus spinosus*. Jægerspris Nordskov, 1 eks., 22.7.1972, flyvende til lys (Bangsh.).
73. *Choleva reitteri*: Marselisborg skov; *Ch. fagniezi* og *jeanneli*: Ejstrupholm (Mahler J.).
78. *Liodes rugosa*. Ejstrupholm, 1 eks. i et *Lasius*-bo i en birkestamme i kanten af blandingskov, 4.2.1971 (5 gr. Celsius) (Mahler J.). Forekomsten hos myrer var utvivlsomt tilfældig.
80. *Anisotoma glabra*. Tykskov krat, 1 eks. på en svampet nåletræsstabel, 7.6.1972 (Mahler J.).
83. *Euthia scydmaenoides*. Ejstrupholm, 1 eks. i kompost, 13.1.1972 (Mahler J.).

92. *Micropeplus tesserula*. Dyrehaven, i antal under forkullede bøge-grene, juni–juli 1972 (V. H.).
94. *Acrulia inflata*. Også på Sjælland: Smørermose ved Herlev, 1 eks. sigtet af gamle *Polyporus betulinus* på birk, 20.5.1972 (Pritzl.).
96. *Omalium littorale*. Stranden syd for Århus, 2 eks. under tang, 14.3. 1972 (Mahler J.).
99. *Arpedium brachypterum*. Ejstrupholm (Mahler J.).
102. *Trogophloeus obesus*. Vrange skov ved bredden af Lange ø på mudderbund ved åudløb, 2 eks. 14.6.1970; vest for Jægerspris Nordskov ved et mudret vandhul, 1 eks. 1.7.1972 (Bangsh. leg. et det., V. H. affid.).
111. *Stenus lustrator*. Ejstrupholm (Mahler J.).
113. *St. problematicus*. Skallingen (Mahler J.).
114. *St. solutus*. Ejstrupholm (Mahler J.).
115. *St. picipennis*. Ejstrupholm: nordbredden af Ejstrup ø, i antal april 1972 ved nedtrampning af vandplanter især *Glyceria maxima* i et vegetationsrigt kildevæld (Mahler J. m. fl.).
116. *Paederus fuscipes*. Læsø (Rønnerne) (Bangsh.).
119. *Lithocharis nigriceps*. Ejstrupholm, i antal i kompost, 13.1.1972 og senere (Mahler J.); Læsø (Bangsh.).
120. *Lathrobium geminum*. Ejstrupholm (Mahler J.).
122. *Leptacinus intermedius*. Ejstrupholm, i antal i kompost (Mahler J.).
124. *Othius myrmecophilus* var. *linkei*. Harrild hede, 1 eks. sigtet af mos i granskov, 11.11.1972 (Mahler J.).
125. *Philonthus addendus*. Ejstrupholm (Mahler J.).
126. (jfr. 2. tillæg 112). *Ph. parcus*. Jægerspris Nordskov, 1 eks. i kompost, 15.7.1971 (Bangsh.).
130. *Staphylinus fulvipes*. Hald Ege (Langskov), 1 eks. i en granstub, 13.6. 1972 (Jørum).
147. *Myllaena infuscata*. Svinø strand, 28.4.1972 (Michael H.).
153. *Phytosus spinifer*. Strandens syd for Århus, i meget stort antal sværmende og krybende på stranden, 12.4.1972 og senere (Mahler J.); Læsø, Danzigmand, i antal under tang, 13.6.1972 (Bangsh.).
180. *Hygropora cunctans*. Sandfeld ved Brande, 3 eks. ved nedtrampning læg: 112), 22.5.1971 (Bangsh.).
af græs i tørvegrav, sammen med adskillige *Stenus niveus* (jfr. 2. til-
180. *Ocyusa maura*. Ejstrupholm (Mahler J.).
187. *Plectophloeus nitidus*. Vemmetofte, 1 eks. i smuld fra en hul eg, 17.10.1972 (Bangsh.).

Tredje tillæg til billefortegnelsen

- *187. *Pl. nubigena*. (D.F. XXVI: 254). Nu fundet i Danmark: Ordrup krat ved Dyrehaven, nogle eks. sigtet af rødmuldet ved fra en hul eg, november 1972 (V. H. leg. et det.). Forskellen mellem aedeagus hos *nubigena* og *nitidus* fremgår af fig. 1 og 2. Thure Palm i Ent. Tidsskrift, 76 (1955): 25–27.
- 189. *Bibloporus minutus*. Ganløse Eged, 1 eks. i barksmuld af eg med angreb af *Polyborus radiatus*, 4.6.1972 (Pritzl).
- 193. *Plegaderus vulneratus*. Skallingen, i antal under granbark i gange af *Dendroctonus micans*, 13.5.1972 (Bangsh.); Ejstrupholm, Harrild hede og Tykskov krat, ofte i antal (Mahler J.).
- 194. *Saprinus rugifer*. Svinø strand, 1 eks. på tør, sandblandet bund, 24.7. 1972 (Michael H.).
- *203. *Podistra pilosa* Payk. (D.F. Biller X: 39, Ganglb. i Koleopt. Rundschau, XVI (1930–31): 244–254). Arten er fundet i Danmark: 1 ♀ ketset på fugtig bund i Bangsboskov ved Frederikshavn, 9.7.1971 (Anne Heister leg., V. H. det.); 3 ♂♂ Silkeborg, 27.6.1914 (Jensen-Haarup leg., V. H. det., coll. Zool. Mus.).
Som anført i D.F. står *pilosa* og *rufotestacea* hinanden meget nær, men kan for hannernes vedkommende let adskilles ved en betydelig




Fig. 1–2. Aedoeagus af 1. *Plectophloeus nubigena* Reitt. og 2. *P. nitidus* Fairm. – Fig. 3–4. Bagranden af 7. bugled hos ♀ af (Posterior margin of the female sternite 7 of) 3. *Podistra pilosa* Payk. og 4. *P. rufotestacea* Letzn. 1 og 2 omtegnet efter Thure Palm, 3 og 4 original.

forskelse i formen af aedeagus som vist i fig. 13. Som påvist af Ganglbauer kan også hunnerne let adskilles, nemlig ved helt forskellig form af 7. bugleds bagrand, der hos *rufotestacea* i midten er udtrukket i en trekantet, i spidsen mere eller mindre tydeligt indbuet lap, men hos *pilosa* i midten er vincelformet indskåret, se hosstående fig. 3 og 4.

I Sverige er *pilosa* truffet talrigt ved kær- og mosekanter med pil og dværgbirk. Jfr. iøvrigt Ent. Tidskrift, 57 (1936): 212–214 (Thure Palm) og 81 (1960): 147 (Gunnar Dahlgren).

- 216. *Cardiophorus cinereus*. Ejstrupholm (Mahler J.).
- 227. *Chrysobothris affinis*. Hareskov, 1 frisklækket imago og talrige larver i tykke egestammers bark sammen med larver af *Agrilus sulcicollis* og *Scolytes intricatus*, 11.6.1972 (Pritzl).
- 229. (1. tillæg: 237). *Agrilus sulcicollis*. Hareskov, i antal 11.6.1972, sværmende om eftm. i meget varmt vejr om tykke egestammer, jfr. lige foran (Pritzl).
- 236. *Dermestes murinus*. Læsø, Danzigmand, i stort antal ved fugleådsler, 11.9.1970 (Bangsh.).
- *237. *Attagenus fasciatus* Thunb. (*gloriosae* F.). Denne, i troperne hjemmehørende art, har i nyere tid bredt sig stærkt og er nu ret udbredt både i Sverige og Finland. Den er nu, i 1971, fundet også i Danmark, i en beboelseslejlighed i Rødvore. Den anses for et farligt tekstilstikadedyr, der bl. a. angriber uld, skind, pelsværk og også insektsamlinger (jfr. Statens Skadedyrlaboratoriums årsberetn. 1971: 10). Arten er let kendelig ved guldgul behåring på hoved, pronotum og et tværbånd på vingedækkerne foran midten. Længde ca. 5 mm.
- *238., efter l. 14 f. o. *Reesa vespuiae* Milliron. Denne art, der antagelig hører hjemme i Nordamerika, men nylig er fundet i Oslo-egnen, bl. a. i herbarier (jfr. Andr. Strand i Norsk ent. Tidsskr., 17 (1970): 120) er nu, i 1972, fundet også i Danmark, dels i nogle københavnske kontorer, i isolationsmateriale (halmmåtter), dels i Zoologisk Museum, København, i udstoppede fugle, december, begge steder både imorges og larver. Arten hører til Dermestidernes 3. slægtsgruppe *Megatomini* (D. F. Biller X: 162). Den er langstrakt, sort, vingedækkerne hvert med et skråt, fremad mod skulderen rettet gult tværbånd og ofte med yderligere gul tegning. Oversidens behåring mørk, på de lyse vingedækkepartier lysere. Følehornene 11-leddede, gule med sort, treleddet kølle, 8. led dannende en overgang til svøben. Længde 2,6–3,4 mm.

Tredje tillæg til billefortegnelsen

242. *Nemosoma elongatum*. Trinderup krat, 2 eks. 10.6.1972 (Jørum); Hareskov, i el angrebet af *Dryocoetes alni* (Pritzl).
245. *Pria dulcamarae*. Læsø, Nordmarken, i antal 15.6.1972 (Bangsh.).
246. *Meligethes atramentarius*. Suserup ved Tystrup, 1 eks. på *Lamium galeobdolon*, 16.5.1972 (Bangsh.).
252. *Epuraea thoracica*. Læsø, Skoven, juni og september (Bangsh.).
259. *Uleiota planata*. Jægerspris Nordskov, over 1 km fra savværket (jfr. 1. tillæg: 239) i antal under bark af fældet eg. 13.8.1972 (flere eks. uudhærdede) (Bangsh.).
259. *Pediacus depressus*. Hals Nørreskov, pupper under rødmuldet bark af egegrenene i en brændestabel, 11.6.1972 (klækning få dage senere) (Bangsh.).
263. *Henoticus serratus*. Jægerspris Nordskov, 1 eks. under bøgebark, nær Snoegen, 29.4.1972 (Bangsh.).
290. *Coccinella quatuordecimpustulata*. Svinø strand, 1 eks. 17.5.1970 (Michael H.).
299. *Xyletinus hansenii*. Læsø, Storedal, 4 eks. i klitterne, 15.6.1972 (Bangsh.).
- *301. (efter l. 3 f. n.). *Sphaericus gibbioides* Boield. (F. G., III: 321). Denne til *Ptinidae* hørende art, der antages at stamme fra Middelhavsområdet, er ofte importeret bl. a. til mellemeuropæiske lande og er nu, i 1971, fundet også i Danmark, dels i et køkken i Holte, i krydderier købt i Sydtyskland, dels i et køkken på Ærø, i kamillete købt på apotek (jfr. Statens Skadedyrlaboratoriums årsberetn. 1971: 10–11). I D. F. Biller XIV: 218–219 kan slægten indføjes i slægtsoversigten på følgende måde:
Side 219, efter l. 5. f. o. indføjes:

4. Pronotum og vingedækkerne uden opstående behåring. Pronotum med kun meget svagt rundede sider, ikke indsnøret bagtil 3a. *Sphaericus* Woll.
- Pronotum og vingedækkerne med lange, opstående hår. Pronotum med stærkt rundede sider, bagtil stærkt indsnøret 4a

I l. 6 f. o. rettes »4« til: »4a«.

Arten er brunlig, oversiden med mat, svagt silkeagtigt skær, vingedækkerne næsten kugleformet hvælvede. Længde 1,5–2,2 mm.

305. *Pyho depressus*. Skallingen, 1 eks. 13.5.1972 (Bangsh.); Harrild hede 4 eks., maj–juni 1971–72 (Mahler J.).
306. *Lissodema cursor*. Lolland: Fuglsang park, Skejten, Holme skov (Pritzl).

306. *Salpingus reyi*. Tykskov krat, i hundredvis under bark af brandskadede bjergfyr, 3.6.1971 (Mahler J.).
306. *S. ater*. Karup nord for Herning, 1 eks. 14.7.1972 (Vagtholm-J.).
306. *Rabocerus gabrieli*. Ejstrupholm, 1 eks. i en revne på en knækket gran, 28.12.1971 (Mahler J.).
315. *Orchesia undulata*. Tystrup skov, Ganløse Orned, Nørreskov ved Furesøen (Pritzl); Jægerspris Nordskov (Bangsh.).
325. *Copris lunaris*. Kongstrup klint på Røsnæs, 4 eks. under kogødning, 2.6.1972 (Vagtholm-J.).
329. *Aphodius conspurcatus*. Ejstrupholm, 1 eks. i fåregødning, 7.3.1972 (Mahler J.).
329. *A. obliteratus*. Efter 40 års forløb er denne art nu genfundet i Marselisborg skov (Dyrehaven) i stort antal i frisk hjortegødning, oktober 1972, i lunt og stille solskinsvejr, især på tør, skygget bund, hvor den var den dominerende *Aphodius*-art, medens den var fåtallig på åben bund, hvor *A. sticticus* var talrigst. Af andre *Aphodius*-arter forekom fåtalligt *paykulli*, *distinctus*, *prodromus*, *sphacelatus*, *fimetarius* og *rufus* (Mahler J.).
340. *Criocephalus rusticus*. Læsø, Bangsbo (Bangsh.).
361. *Cryptocephalus bilineatus*. Skejten ved Fuglsang (Lolland) i stort antal på *Achillea millefolii* og *Inula britannica* (på denne plante sammen med *Cassida murraea*), 26.7.1972, kun mellem kl. ca. 16 og ca. 18 (Pritzl).
364. *Chrysomela brunsvicensis*. Randbøl, i antal, 26.8.1972; Vester Mølle, i antal, 10.9.1972; Ejstrupholm, 1 eks. 14.9.1972 (Vagtholm-J. m. fl.).
365. *Ch. graminis*. Ristinge klint, på meget tør, solåben bund oven for klinten, 2 imagines og mange larver på *Tanacetum vulgare*, 2.8.1972; ved klintens fod ved kildevæld, hvor *Stachys palustris* og *Scutellaria galericulata* voksende, blevarten ikke fundet (Pritzl).
365. *Chrysochloa rugulosa*. Aborg strand nord for Assens, i antal 3.8.1972 på *Centaurea scabiosa*; stranden syd for Vester Skerninge, 1 eks. 1.8. 1972 på *Centaurea jacea* (Pritzl).
368. *Phytodecta viminalis* var. *calcaratus*. Næsbyholm skov, 1 eks. 21.7. 1971 (Pritzl).
- *379. (nederst). *Crepidodera femorata* Gyll. (F. G., IV: 151–152; K. M., 9: 241). 1 eks. ketset i Uldum kær nord for Vejle, 31.5.1971 (Vagtholm-J. leg. et det., V. H. affid.).
Forkroppen rødgul, vingedækkerne metalblå eller -grønne, følehorn

Tredje tillæg til billefortegnelsen

rødgule, undertiden lidt mørkere mod spidsen, benene rødlige med sorte eller sortbrune lår. Længde 3–4,5 mm.

Arten kendes straks fra vore andre *Crepidodera*-arter (D. F. Biller VII: 172–174 og XX: 172–176) ved vingedækernes farve og fra den almindelige *Derocrepis rufipes* (D. F. Biller VII: 172), som den har en vis overfladisk lighed med, ved de mørke lår og slægtskaraktererne. Arten er i udlandet fundet på fugtig eng- og skovbund, undertiden i nærheden af kilder, og angives især at komme frem ved aftenfugtighed. Den er taget på *Galeopsis tetrahit*, undertiden sammen med *Chrysomela fastuosa*, der ligesom den nævnte plante forekom på det danske findested.

380. (jfr. 2. tillæg: 117) *Chalcoides plutus*. Nu fundet to steder til på Lollland, Holme skov og Radsted mose, 25.7.1972, på *Salix alba* (Pritzl).
382. *Apteropeda globosa*. Grejsdal, i antal på *Veronica montana*, 25.5. 1972 (Vagtholm-J.); Broby Vesterskov, i stort antal på en enkelt lille plet ved en skovvej på *Veronica chamaedrys*, hvis blade var stærkt begnavede og minerede. På *Lamium galeobdolon* og *Ajuga reptans*, der voksende på stedet mellem Veronicaerne, fandtes derimod hverken imagines eller miner (Pritzl).
383. (jfr. 1. tillæg: 245). *Dibolia cynoglossi*. Karup nord for Herning, 1 eks. ketset 14.7.1972 (Vagtholm-J. leg. et det., V. H. affid.).
386. *Cassida vibex*. Daugård, i antal på *Cirsium arvense*, 25.7. og 26.8.1972 (Vagtholm-J. m. fl.).
387. *C. margaritacea*. Yderby Lyng på Odsherred, 1 eks. ketset 10.7.1972. På lokaliteten voksende bl. a. *Silene cucubalis (inflata)* og *S. viscosa* (Pritzl).
391. *Otiorrhynchus rugosostriatus*. Ejstrupholm (Mahler J.).
397. *Barypithes mollicomus*. Ejstrupholm, 1 eks. under løv, 3.6.1972 (Mahler J.).
402. *Lixus iridis*. Jægerspris Nordskov (Vagtholm-J.).
404. *Phytonomus fasciculatus*. Ejstrupholm (Mahler J.).
409. *Magdalis memnonia*. Frederikshåb plantage ved Randbøl (Bangsh.).
409. *M. violacea*. Ejstrupholm (Mahler J.).
412. *Rhyncolus thomsoni*. Læsø, Ellegård, 1 eks. 14.6.1972 (Bangsh.).
412. *Rh. truncorum*. Broby Vesterskov, 1 eks. i mørt ved af en knækket bøg, 27.6.1972 (Pritzl).
413. *Trachodes hispidus*. Tykskov krat (Mahler J.); Hals Nørreskov, Jægerspris Nordskov (Bangsh.).
414. *Acalles ptinoides*. Hjøllund (Mahler J.).

420. *Orthochaetes setiger*. Bredballe, 2 eks. ketset på en sydvendt skrænt, 28.5.1972, 5 eks. sigtet oktober 1972 (Vagtholm-J.).
420. *Rhytidosoma globulus*. Tykskov krat, fåtalig på unge, ca. 1 m høje *Populus tremula*, juni, august, september (Mahler J.).
423. *Ceuthorrhynchus quercicola*. Grejsdal (Vagtholm-J.).
426. (jfr. 1. tillæg: 247). *C. chrysanthemi* bør benævnes *figuratus* Gyll. (*chrysanthemi* auct. nec Germ.). Jfr. L. Dieckmann i Beitr. zur Entomologie, 22 (1972): 94–95.
426. *C. fennicus*. Læsø, Ellegård (Bangsh.).
427. *C. griseus*. Ejstrupholm (Mahler J.).
427. (jfr. 1. tillæg: 247). *C. rapae*. Genfundet på Læsø (Bangsbo, Ellegård, Nordmarken), 5 eks. i juni 1972 (Bangsh.).
429. *C. thomsoni*. Hareskov, 1 eks. ketset 20.8.1972 (Pritzl).
430. *C. sulcicollis*. Sjællands Odde, ved havnen (Bangsh.).
430. *C. pervicax*. Grejsdal og Bredballe (på *Cardamine amara*); Uldum kær (Vagtholm-J.).
- *430. *C. ignitus*. Nu fundet i Danmark: Jægerspris Nordskov (nær skovens nordvest-hjørne på *Berteroia incana*, 1 eks. 4.6.1972 (Vagtholm-J.), 4 eks. 2.8.1972 (Bangsh.); vejen fra Jægerspris til Kulhus, 1 eks. 27.6. 1972 på samme plante (Jørum).
435. *Anthonomus rectirostris*. Hareskov, i antal på *Cerasus padus*, 11.6. 1972 (Pritzl).
435. *A. rufus*. Tirsbæk, 1 eks. ketset 23.6.1972 (Vagtholm-J.).
- *436. *Bradybatus kellneri* Bach (F. G., V: 195; Hoffmann i Faune de France, 59 (1954): 1122, 1125; L. Dieckmann i Beitr. zur Entomologie, 18 (1968): 510 ff.). Jægerspris Nordskov, 1 eks. ketset under *Acer platanoides*, 3.6.1972 (Bangsh.).
Slægten *Bradybatus* Germ. hører til underfamilien *Calandriniae* (D. F. XXI: 130), 5. slægtsgruppe (l. c. 305) og står *Anthonomus* nær, men adskilles let fra denne slægt ved 6-leddet, ikke 7-leddet, følehornssvøbe og ved mere langstrakt krop.
B. kellneri er sort eller brunsort, stærkt varierende i farvetegningen, vingedækkerne ofte delvis eller overvejende brunrøde, følehorn og ben røde eller brunrøde, de førstes kølle mørkere. Vingedækkerne med kraftige punktstriber, stribemellemrummene med en enkelt punktrække. Forlærene finttandede, mellem- og baglår utandede. Længde 3,4–4,3 mm. Hos hannen er snuden mat og længdekølet, hos hunnen blank og kun svagt kølet ved roden.
Arten er knyttet til *Acer* (løn) og foretrækker antagelig *A. platanoides*

Tredje tillæg til billefortegnelsen

(spids-løn), på hvilken den er fundet i Norge og Sverige, men den er fundet også på andre *Acer*-arter, bl. a. *A. campestre* (navr). Den overvintrer som imago og tages i maj-juni ved bankning af eller ketsning under de blomstrende træer. I juli er der i frugterne fundet larver, i august både larver, pupper og imagines; de sidste gnaver sig ud af frugterne og overvintrer i jorden (jfr. A. Horion i Entom. Blätter, 1970: 26–28; Stig Lundberg i Ent. Tidskrift, 88 (1967): 80–81).

I D. F. XXI: 305 må, efter tilkomsten af slægten *Bradybatus*, i l. 14 f. n. ordet »7-leddet« ændres til :»6- eller 7-leddet« og slægtsoversigten indlædes således:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Følehornssvøben 6-leddet | la. <i>Bradybatus</i> |
| Følehornssvøben 7-leddet | 2 |
| 2. Vingedækkerne | (som l. 8 – l. f. n.) |
437. *Curculio crux*. Ejstrupholm (Mahler J.); Ejby ved Holbæk, 1 eks. på pil, 16.7.1972 (Michael H.).
438. *Tychius schneideri*. Nørre Snede, i gamle brunkulsgrave, i antal på *Anthyllis vulneraria*, 25.6.1972 (Vagtholm-J.).
439. *Sibinia sodalis*. Yderby Lyng på Odsherred, i antal på *Armeria vulgaris*, 10.9.1972 (Pritzl.).
442. *Miarus graminis*. Holme skov, 1 eks. på *Campanula latifolia*, 25.7. 1972 (Pritzl.).
442. *M. micros*. Yderby Lyng på Odsherred, 1 eks. 10.7.1972 (Pritzl.); vest for Jægerspris Nordskov (ved Brandbjerg), i stort antal på *Jasione montana*, 1.7.1972 (Bangsh.).
445. *Rhynchaenus angustifrons*. Hastrup sø ved Thyregod, Ejstrupholm (Mahler J.).
447. *Apion filirostre*. Holme skov (Pritzl.).
448. *A. facetum*. Også fundet på Læsø (Bangsh.).
448. *A. meliloti*. Daugård i stort antal på *Melilotus albus*, juli-august 1972 (Vagtholm-J. m. fl.); Ejby ved Holbæk (Michael H.).
450. *A. sedi*. Også på Fyn: Vester Skerninge (Pritzl.).
456. *Scolytes laevis*. Herlev, i stort antal under elmebark, 1.5.1972 (Pritzl.).
458. *Phloeophthorus rhododactylus*. Ejstrupholm i antal, 13.3.1971 (Mahler J.).
460. *Polygraphus poligraphus*. Assendrup, Tykskov krat (Vagtholm-J.); Harrild hede, Ejstrupholm (Mahler J.).
467. *Pityogenes quadridens*. Yderby Lyng på Odsherred, i antal under bark af 4–5 årige fyre sammen med *P. bidentatus* og *Orthotomicus suturalis* (Pritzl.).

VICTOR HANSEN

SUMMARY:

Third addition to the list of Danish Coleoptera.

Five new Danish Coleoptera are recorded: *Plectophloeus nubigena* Reitt., *Podistra pilosa* Payk., *Crepidodera femorata* Gyll., *Ceuthorrhynchus ignitus* Germ. and *Bradybatus kellneri* Bach. Further three synanthropical species are recorded: *Attagenus fasciatus* Thunb. (*glorioseae* F.), *Reesa vespulae* Milliron and *Sphaericus gibbioides* Boield. New data are given on several Danish species.

Forfatterens adresse/Author's address:
J. E. Ohlsensgade 4,
2100 København Ø, Danmark.