

Ormeløvestudier

4. (1972) (med Jørgen Frederiksen): Biological and ethological studies on Canarian Vermileoninae (Diptera Brachycera, Rhagionidae = Leptidae). *Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.* 135: 37–59.

SUPPLERENDE LITTERATURLISTE

- Edwards, F. W., 1935: "Worm-lions" from Portugal and the Sudan (Diptera, Rhagionidae) with a description of a new species. *Proc. R. ent. Soc. Lond.* 10: 54–57.
- Hafez, M. & El Moursy, A. A., 1956: Studies on desert insects in Egypt. I. Field and laboratory investigations on the worm-lion, *Vermileo vermilio* L. (Diptera: Rhagionidae). *Bull. Soc. ent. Egypt.* 40: 333–348.
- Hemmingsen, A. M., 1934: A statistical analysis of the differences in body size of related species. *Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.* 98: 125–160. With 19 plates and a folded table.
- 1976: Stankelbensstudier. (With a summary: Crane-fly studies). *Ent. Meddr* 44: 129–156.
- Hemmingsen, A. M. & Jensen, Birger, 1957: The occurrence of *Tipula (Vestiplex) arctica* Curtis in Greenland and its decreasing body length with increasing latitude. *Meddr om Grønland.* 159, Nr. 1: 1–20. With 2 plates.
- Marchal, P. 1897: Notes d'entomologie biologique sur une excursion en Algérie et en Tunisie. *Lamproxmyia miki*, nova species, cécidies. *Mem. Soc. Zool. Fr.* 10: 5–25. 1 pl.
- Stuckenbergs, B., 1960: Diptera (Brachycera) Rhagionidae. *S. Afr. anim. life.* 7: 216–308.
- 1971: A taxonomic study on the species of *Lamproxmyia* Macq. in the Canary Islands (Diptera: Rhagionidae). *Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.* 134: 77–88.
- Wheeler, W. M., 1930, 1931: *Demons of the dust.* Toronto 1930: London 1931.

Forfatterens adresse/Author's address:

Strødam Biologiske Laboratorium
DK-3400 Hillerød, Danmark

MINDRE MEDDELELSE

Svirrefluen Eumerus flavitarsis Zett. (Diptera, Syrphidae) ny for Danmark.

Under en dipterologisk indsamlingstur til Nordvestsjælland fangede Stig Andersen og Verner Michelsen en han af svirrefluen *Eumerus flavitarsis* Zett. i Bjergsted Bakker (NWZ, 32UPG57) 25.–30. juni 1977.

Arten har ligesom *Eumerus ruficornis* Meig. rødgule antenner, men kendes let fra denne, såvel som fra de øvrige danske arter af slægten *Eumerus*, ved at pletterne på 2. bagkropsled er skrætstillet ægformede og lysegule i modsætning til pletterne på 3. og 4. bagkropsled, som er udformet som almindeligt hos slægten, samt ved de affladede og solvskinnende behårede bagmetatarsær; desuden er bagkroppen temmelig smal, og pletterne er placeret på tergiternes bageste halvdel.

Arten forekommer i vore nabolande og kunne derfor forventes at forekomme i Danmark også. Torp Petersen har venligst meddelt mig, at *Eumerus flavitarsis* er fundet i følgende lande: Sverige (Skåne), Finland, Holland, Vesttyskland, Polen, Tjekkoslovakiet, Østrig, Schweiz, Frankrig, Spanien, Italien, Jugoslavien, den europæiske del af Sovjetunionen og i Nordvestasien.

Erik Rald, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.