

Catalogus Coleopterorum Danicorum.

Fam. Staphylinidæ. Pars IV.

*Fortegnelse over de i Danmark levende Rovbiller.
Fjerde Del.*

Af

Joh. P. Johansen.

Idet jeg udsender efterfølgende Fortegnelse over vore Aleochariner og Tachyporiner, der fra min Haand nærmest fremkommer efter Opfordring og Tilskyndelse fra Hr. Museumsinspector, Dr. phil. Fr. Meinert og Hr. Konservator E. A. Løvendal, er det mig en kær Pligt at udtale en ærbødig og venlig Tak til alle dem, der have støttet mit Arbejde under Udarbejdelsen. Denne Tak gælder først Hr. Museumsinspector Dr. Fr. Meinert, for den særdeles Velvillie, med hvilken han har overladt mig Museets Materiale til Gennemsyn samt forsynet mig med al fornøden entomologisk Litteratur, men dernæst tillige de Herrer Lærer L. Andersen, Ingeniør Chr. Engelhart, Student W. Lundbeck, Konservator E. A. Løvendal, Kammerherre, Stiftamtmand Fabritius-Tengnagel, Student E. Hoffmeyer, Toldassistent Holstebro, Sparekassedirektør O. Jakobsen, Skolebestyrer N. P. Jørgensen og Cand. W.

Schlick, der alle med venlig Imødekommenhed og efterhaanden som Arbejdet skred fremad, have stillet deres Samlinger til min Raadighed og forsynet mig med mange værdifulde Oplysninger. Kun ved denne velvillige Hjælp fra forskellige Sider er det lykkedes mig at bringe Fortegnelsen op til et Antal af næsten 300 Arter, at faa en nogenlunde klar og grundet Forestilling om Arternes Udbredelse og Forekomst, og at kunne fastslaa Tilstedeværelsen af mange Sjældenheder.

Ved at sammenligne Fortegnelsen med, hvad der vides at være funden i Nordtyskland og Sydsverrig, vil det vise sig for det første, at vort lille Lands Fauna giver et i det hele ret fyldigt Billede af de tilgrænsende Landes herhen hørende Billeverden. Men for det andet vil man dog heller ikke undgaa at bemærke, at der savnes en Del Arter, der forekomme i Nordtyskland eller i Sydsverrig, men ikke endnu ere fundne her i Landet. Jeg kan saaledes henvise til Slægten *Placusa*, af hvis Arter kun een en enkelt Gang er funden her, medens 4—5 Arter forekomme i Nabolandene — eller til *Homalota*-Arter som *deplanata*, *plana*, *hospita* o. fl., til flere Arter af Slægten *Tachinus* som *marginatus*, *pallipes* eller *bipustulatus*, der alle tilhøre Nord- og Mellemeuropas Fauna, men endnu lige saa lidt som forskellige andre ere fundne her. For en Del skyldes dette vistnok en i det hele sjældnere Forekomst af saadanne Arter — muligvis ogsaa Savnet af visse lokale Forhold som udstrakte og gamle Naaletræskove, Klippegrund o. a. m. —; men det har sikkert nok ogsaa sin delvise Grund deri, at *Aleochariner* og *Tachyporiner* hører til de Dele af vor Billefauna, som hidindtil ere blevne betydeligt forsømte af vore Entomologer. Arternes gennemgaaende ringe Størrelse, deres store Ensartethed i Udseende, Vanskeligheden ved at bestemme

dem, til Dels ogsaa ved at præparere dem godt, har utvivlsomt været medvirkende til, at de fleste Samlere have skænket dem en begrænset Opmærksomhed. Uden egentlig at eftersøge dem paa saadanne Steder, hvor de forekomme hyppigst, have mangevistnok kun taget med af de mere iøjnefaldende Former, hvad de tilfældigt traf paa. At dette har været Hovedaarsagen til, at en Del Samlinger paa langt nær ikke ere saa velforsynede med de tvende Grubbers Arter som f. Eks. med Karaber og Skarabæer, er sikkert udenfor al Tvivl. Det er mit Haab, at Fortegnelsen muligvis kan hjælpe lidt paa denne Svaghed lige overfor disse smaa, men netop ved den Vanskelighed, som Studiet af dem frembyder, saa interessante Staphyliner, og at vi om ikke ret lang Tid vil kunne øge Listen over dem med et ikke ringe Tillæg.

Fortegnelsen slutter sig som en Fortsættelse til Dr. Fr. Meinerts Fortegnelse over de 8 første Grupper af vore Staphyliner, der indeholder 321 Arter; den begynder derfor med Nr. 322. Ved Ordningen af Slægter og Arter har jeg i Reglen fulgt nedennævnte Værk af Dr. G. Kraatz.

Følgende Værker ere benyttede:

Dr. G. Kraatz. Naturgesch. der Ins. Deutschl. II.

Dr. F. Bose. Die Käfer Deutschl.

C. G. Thomson. Skand. Coleoptera II—III.

C. G. Thomson. Skand. Insekter I.

Dr. G. Zeidlitz. Fauna Baltica. Die Käfer.

Dr. D. Sharp. A Revision of the British Species of Homalota.

Dr. L. v. Heyden, E. Reitter et J. Weise. Catal. Coleopt. Europæ et Caucasi III.

9. Gruppe **Aleocharini**.*I. Aleocharini genuini.**Autalia Leach.*

322. *Impressa* Oliv. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 31; Thoms., Skand. Col. II. 261; Seidl., Faun. Balt. 412 — Cat. Col. Eur. III. *Autalia impressa* Oliv.

Ret almindelig i Svampe i alle vore Skovegne; om Efteraaret ofte i stort Antal i halvraadne *Agaricus*-Arter; ogsaa i Foraarstiden findes den hyppigt, men mere enkeltvis.

323. *Rivularis* Grav. Kraatz, Ins. Deutschl. II. 32; Thoms., Skand. Col. II. 261; Seidl., Faun. Balt. 412 — Cat. Col. Eur. III. *Autalia rivularis* Grav.

Sjeldnere end foregaaende, men udbredt over hele Landet. Den forekommer saavel i som udenfor Skove og er taget baade under tør Kogødning paa høj Sandbund, i halvfugtige Plantemøddinger og under raadnende Planterester, sjeldnere i Svampe og Opskyl fra Enge og Moser. Kun en enkelt Gang har jeg samlet den i meget stort Antal under en Hob raadne Kartofler, ellers træffes den oftest enkeltvis. Foraar og Efteraar afgive de fleste Findetider, dog er den ogsaa taget i Juli—August.

Falagria Leach.

324. *Sulcata* Payk. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 34; Thoms., Skand. Col. II. 297; Seidl., Faun. Balt. 412 — Cat. Col. Eur. III. *Falagria sulcata* Payk.

Hyppig overalt i Haver og Anlæg, i Plantemøddinger og i Barken omkring Drivkasser, sjeldnere i Opskyl ved Aaer og Søer. Den er taget i alle Aarets Maaneder, men talrigst om Foraaret og Efteraaret.

325. *Sulcatula* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl.

II. 35; Thoms., Skand. Col. II. 298; Seidl., Faun. Balt. 412 — Cat. Col. Eur. III. *Falagria sulcatula* Grav.

Mindre hyppig end foregaaende, men ligesaa udbredt. Den er ofte funden ved Kysten under Tang og synes at ynde Saltbund, dog forekommer den ogsaa sammen med *sulcata* og *obscura* jevnligt i Plantemøddinger længere inde i Landet. April—Maj og Septbr.—Okt. afgive de fleste Findetider.

226. *Thoracica* Curt. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 34; Seidl., Faun. Balt. 412 — Cat. Col. Eur. III. *Falagria thoracica*. Curt.

Særdeles sjelden. Jeg har fundet 3 Stykker paa Stranden ved Nymindesø, Ringkjøbing Fjord, under Opskyl 29. Juli 1894. 4 Stykker ere tidligere tagne af Kmrhr. Fabritius-Tengnagel paa Møen sammen med et Par *Bledius*-Arter i Juli Maaned 1890 og 94.

327. *Obscura* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 35; Thoms., Skand. Col. II. 298; Seidl., Faun. Balt. 412 — Cat. Col. Eur. III. *Cardiola obscura* Grav.

Udbredt overalt og i Reglen skarevis i tørre Plantemøddinger og omkring Drivkasser i Haver og Anlæg, sjældnere i Svampe; hyppigst om Foraaret og Efteraaret.

328. *Nigra* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 36; Thoms., Skand. Col. II. 298; Seidl., Faun. Balt. 412 — Cat. Col. Eur. III. *Falagria nigra* Gr.

Et enkelt Stykke findes i Museets Samling og er af Prof. Schiødte (?) mærket: »Gilleleje 5. Juni 1843.« Ifølge Prof. Thomsen er den ikke sjelden i Skaane i udtørrede Grusgrave.

Bolitochara Mannh.

329. *Lunulata* Payk. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 39; Thoms., Skand. Col. II. 273; Seidl., Faun. Balt. 443 — Cat. Col. Eur. III. *Bolitochara lunulata* Payk.

Udbredt i alle vore Skovegne og hyppig i Svampe, især Agaricus-Arter. Den er taget i alle Maaneder fra April til Nvbr., oftest om Efteraaret.

330. Lucida Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 38; Thoms., Skand. Col. II. 273; Seidl., Faun. Balt. 442 — Cat. Col. Eur. III. Bolitochara lucida Grav.

Nogle faa Stykker, mærkede med Lokalisetetiketter for Ry og Silkeborg (?), findes i Museets Samling (Prof. Schiødte). Disse Stykker ere, saa vidt jeg veed, de eneste, der ere tagne her i Landet. Arten er sjelden i Mellemeuropa og Sverrig.

Af andre Arter hørende til denne Slægt er bella Mrkl. funden i Sverrig (Thoms., Skand. Ins. I.), obliqua Er. i Holsten (Preller, Käfer von Hamburg u. Umgegend).

Phytosus Curtis.

331. Balticus Kr. — Actosus balticus Kr. Seidl., Faun. Balt. 440; Thoms., Skand. Ins. I. 41 — Cat. Col. Eur. III. Actosus balticus Kr.

Meget sjelden; en lille Række er samlet ved Gjedser under Tang, Maj 1893, af Kmrhr. Fabritius-Tengnagel; ved Skagen er et enkelt Stykke taget af Student Hoffmeyer ligeledes under Tang, Aug. 1893. Langs Kysterne af Østersøen er den funden baade i Sverrig og Tyskland gravende i Sandet eller nedblæst i Sandhuller.

332. Spinifer Curt. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 44; Seidl., Faun. Balt. 440 — Cat. Col. Eur. III. Phytosus spinifer Curt.

Et enkelt Stykke er funden af Skolebestyrer Jørgensen ved Adserbo, Aug. 1886.

Hr. Konsv. Løvendal har oplyst mig om, at Prof. Schiødte i sin Tid til ham har omtalt et Fund af »en lille gul Staphylin, der gravede i Sandet« ved Gjedser-

odde. Dette Fund, der muligvis kan henføres til en af de forannævnte Phytosus-Arter og vel nærmest til den første, er dog ikke senere set i Museets Samling.

Silusa Erichs.

333. *Rubiginosa* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 47; Thoms., Skand. Col. II. 280; Seidl., Faun. Balt. 439 — Cat. Col. Eur. III. *Silusa rubiginosa* Er.

Meget sjelden og stedege. I Lærer Andersens Samling i Haderslev har jeg set et enkelt Stykke fra Als; forøvrigt er den funden ved Aalholm paa Lolland, 25. Maj 1885, af Ingeniør Engelhart, og ved Nykjøbing F., Maj 1890, af Kmrhr. Fabritius-Tengnagel, begge Gange ved udflydende Træsft. Den er taget i Holsten saavel som i Sverrig, hvor den efter Prof. Thomson er »rar i Almsft«. Tidlig paa Foraaret skal den opholde sig under Bark, og først længere hen i Tiden søger den ud til gærende Sft paa Træer og Stubbe. (Kraatz).

Ocalea Er.

334. *Castanea* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 51; Thoms., Skand. Col. III. 41; Seidl., Faun. Balt. 463 — Cat. Col. Eur. III. *Ocalea picata* Steph.

Udbredt over hele Landet paa fugtig Skovbund under Mos og nedfaldne Blade, under Sten ved Skovbække og ved Bredden af Skovvande, ofte i Antal; og saa ved Kysterne forekommer den under Sten, Tang og andet Opskyl. April—Maj og Septbr.—Octbr. afgive de hyppigste Findetider.

335. *Badia* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 52; *Ocalea proluxa* Thoms. Skand. Col. III. 42; Seidl., Faun. Balt. 464 — Cat. Col. Eur. III. *Ocalea badia* Er.

Paa lignende Steder som foregaaende Art og ofte i

Selskab med den, men mere stedefen og sjelden; enkelte Gange har jeg taget den hos *Formica fuliginosa*, blandt hvis mere tilfældige Gæster den tilligemed *castanea* ogsaa nævnes af Märkel (Germ. Zeitschr. 1844).

Stenoglossa Kr.

336. *Semirufa* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 56; *Stichoglossa semirufa* Er. Seidl., Faun. Balt. 455 — Cat. Col. Eur. III. *Stichoglossa semirufa* Er.

Af denne Art, der har hjemme fortrinsvis i Syd-europa, og som er meget sjelden i det sydlige Tyskland, har jeg et enkelt Stykke, en ♂, af ældre Dato, om hvis Oprindelse jeg dog ikke kan give nogen paalidelig Oplysning.

Ischnoglossa Kr.

337. *Prolixa* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 58; Thoms., Skand. Col. II. 274; Seidl., Faun. Balt. 455 — Cat. Col. Eur. III. *Ischnoglossa prolix* Gr.

Meget sjelden og stedefen under Bark paa Stubbe og halvdøde Træstammer. Den er funden i Charlottenlund under Egebark af Prof. Schiødte, ved Sorø af Dr. Bergsøe, i Dyrehaven af Arkitekt Koch og anden Steds i Nordsjælland af Cand. Schlick; men fra andre af Landets Egne foreligge for Tiden ingen Fund. De af Samlerne anførte Findetider ere i Maj og Septbr.

338. *Rufopicea* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 59 — Cat. Col. Eur. III. *Ischnoglossa rufopicea* Kr. = *prolix* Grav.

Af denne Art, maaske kun en Farvevarietet af foregaaende, har Kmrhr. Fabritius-Tengnagel fundet nogle Stykker i Klampenborg Dyrehave under Bark, April 1893.

339. *Corticina* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 59; *Dexiogyia corticina* Thoms., Skand. Col. II. 278;

Seidl., Faun. Balt. 456 — Cat. Col. Eur. III. *Dexiogyia corticina* Er.

Meget sjelden. Den lever ligesom de andre Arter af Slægten under Barken paa Stubbe og halvdøde Stammer af Løv- og Naaletræer og er taget ved Nyraad, Sjælland, af Konsv. Løvendal under Granbark, 21. Maj 1888, ved Ørholm, 11. Maj 1873, og i Blæsbjerg Skov, 1. Juli 1871, af Cand. Schlick, samt ved Haderslev i en Bøgestub af Forfatteren.

Leptusa Kr.

340. *Analisis* Gyll. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 62; Thoms., Skand. Col. II. 275; Seidl., Faun. Balt. 441 — Catal. Col. Eur. III. *Leptusa analisis* Gyll.

Under Bark paa Stubbe af Eg, Bøg og Naaletræer samt i Svampe, der vokse paa Træstød. I Skovene omkring Aalborg er den ikke sjelden; jeg har den saaledes fra Arden, Skørping, Buderuplund, Restrup, Vang, Hals Nørreskov og Dronninglund Storskov; men fra andre af Landets Skovegne foreligger den sparsomt. Findetiderne ere i Maj, Juni, Septbr. og Oktbr.

341. *Fumida* Er. — Kraatz, Jns. Deutschl. II. 63; Thoms., Skand. Col. II. 275; Seidl., Faun. Balt. 442; Cat. Col. Eur. III. *Leptusa hæmorrhoidalis* Heer.

Sammen med foregaaende, men hyppigere og mere jævnt udbredt over hele Landet; den er oftest taget i April og Maj samt Septbr., men ogsaa, om end sjældnere, midt om Sommeren.

342. *Ruficollis* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 64; *Pachygluta ruficollis* Thoms., Skand. Col. II. 276; Seidl., Faun. Balt. 441 — Cat. Col. Eur. III. *Tachygluta ruficollis* Er.

Af vore tre *Leptusa*-Arter, der næppe udgør en Tyvendedel af det fra Europa kendte Antal, er denne den mest almindelige og videst udbredte, idet den ogsaa

forekommer i større Haver og Anlæg udenfor de egentlige Skovegne. Den er taget under Barken paa Stubbe af Eg, Bøg, Birk, Ask og Løn samt Naaletræer. Findetiderne strække sig fra Marts til Aarets Slutning.

Thiasophila Kr.

343. *Angulata* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 70; Thoms., Skand. Col. II. 246; Seidl., Faun. Balt. 455 — Cat. Col. Eur. III. *Thiasophila angulata* Er.

Almindelig i Tuerne hos *Form. rufa* og nærstaaende Arter, ofte i stort Antal; den hører ligesom følgende til de egentlige Myrmecophiler og er hos os en af de hyppigste. Foraarsmaanederne afgive de fleste anførte Findetider, men den er ogsaa taget i Septbr.—Oktbr.

344. *Inquilina* Mrkl. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 71; Thoms., Skand. Ins. I. 43; Seidl., Faun. Balt. 455 — Cat. Col. Eur. III. *Thiasophila inquilina* Mrkl.

Meget sjelden hos *Form. fuliginosa*. Foruden nogle ældre Stykker i Museets og Konsv. Løvendals Samlinger uden nærmere Oplysninger, har jeg kun set 3 Eksp. fra Donse, Nordsjælland, fundne af Sparekassedirekt. O. Jakobsen sidst i April 1889.

Haploglossa Kr.

345. *Gentilis* Lün. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 80; Thoms., Skand. Ins. 43; *Microglotta gentilis* Lün. Seidl., Faun. Balt. 462. — Cat. Col. Eur. III. *Microglossa gentilis* Lün.

Meget sjelden. Den er funden ved Nyraad, Sjøland, i en Fuglerede, 21. Maj 88, og i Dyrehaven under Løv, 9. Maj 86, af Konsv. Løvendal; begge Gange kun nogle faa Stykker.

346. *Pulla* Gyll. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 80; Thoms., Skand. Col. II. 282; *Microglotta pulla* Gyll.

Seidl., Faun. Balt. 462 — Cat. Col. Eur. III. *Microglossa pulla* Gyll.

Hvor Sandsvalen bygger Rede i Sandskrænter, Grusgrave o. l. St., vil man i Reglen kunne finde denne Bille enten i selve Reden i Selskab med store Fuglelopper eller ved Foden af Skrænten i Færd med at krybe op ad denne. Om den findes i andre Fuglereder end Sandsvalens er mig ubekendt, men turde være sandsynligt. Udenfor Reder er den funden i en raadden Bøgestub af Prof. Schiødtte og i en ny anlagt Tue hos *Formica rufa* af Forfatteren, ligesom den ogsaa flere Gange er taget ved Sigtning af Løv eller kæstet. I Svalereder træffes den navnlig i Aug.—Septbr., hos Myrerne fandtes den i Maj; forøvrigt ere de andre Findetider spredte.

347. *Longicornis* Thoms. — *Microglotta longicornis* Skand. Ins. I. 43; Seidl., Faun. Balt. 462 — Cat. Col. Eur. III. *Microglossa longicornis* Th.

Et enkelt Stykke med forholdsvis lange, slanke Antenner, enkelt, men dybt punkteret Hoved, temmelig skarpt fremtrædende Baghjørner paa Forryggen og med sorte Dækvinger, og som vistnok er denne Art, har jeg fundet i Svamp i Skørping Skov i Aug. 1890.

348. *Rufipennis* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 81; *Haploglossa marginalis* Thoms., Skand. Col. II. 282; *Microglotta marginalis* Gyll. Seidl., Faun. Balt. 462 — Cat. Col. Eur. III. *Microglossa marginalis* Gyll.

Nogle Stykker af denne, som det synes, særdeles sjældne Art, ere tagne af Konsv. Løvendal i Dyrehaven under Løv, Juni 1877. Kraatz omtaler, at den af ham er funden i Selskab med *Formica cunicularia*; ogsaa Prof. Thomson oplyser, at den lever i Selskab med Myrer.

349. *Prætexta* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 82; *Crataræa suturalis* Thoms., Skand. Col. II. 283;

Crataræa suturalis Mannh Seidl., Faun. Balt. 462 — Cat. Col. Eur. III. *Crataræa suturalis* Mannh.

Udbredt over hele Landet og ikke meget sjelden. Den lever i Bagerier, Møller, Stalde, Brændehuse o. l. St., hvor den kan findes i Affald af Mel og Korn, i Træsmuld og Fejeskarn; meget sjeldnere synes den at forekomme i det Frie, hvor den kun er taget to Steder og enkeltvis, nemlig i Dyrehaven under Løv af Arkitekt Koch og i Skorping Skov i en Bunke gammelt Hø af Forfatteren. De af Samlerne anførte Findetider ere dels i April, dels fra Aug.—Decbr.

Aleochara Grav.

350. *Fuscipes* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 86; Thoms., Skand. Col. II. 247; Seidl., Faun. Balt. 454 — Cat. Col. Eur. III. *Aleochara fuscipes* Grav.

Udbredt, men i det Hele temmelig sjelden. Hyppigst er den taget i de sydlige og østlige Dele af Landet og af de fleste Samlere, sjeldent mod Nord, hvorfra den kun foreligger et Par Gange fra Omegnen af Randers og Aalborg. Den søger Aadsel og raadne Plante-stoffer. Findetiderne ere fra April—Juni og igen fra Aug.—Oktbr.

351. *Brevipennis* Gr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 92; Thoms., Skand. Col. II. 248; Seidl., Faun. Balt. 454 — Cat. Col. Eur. III. *Aleochara brevipennis* Gr.

Paa fugtig Bund saavel inde i Landet som ved Kysten, udbredt overalt og temmelig almindelig, i Opskyl er den stundom til Stede i stort Antal. Den er funden i alle Maaneder fra Marts til Decbr. med Undtagelse af Juli.

352. *Fumata* Gr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 93; Thoms., Skand. Col. II. 248; Seidl., Faun. Balt. 454 — Cat. Col. Eur. III. *Aleochara fumata* Gr.

Sammen med foregaaende Art og vistnok ligesaa

udbredt, men langt fra saa hyppig. I Aalborgs Omegn har jeg taget den i Lundbykrat i Svamp, i Skovlund under Løv, ved Kølske Dam, i Gravlev Enge og ved Limfjorden i Opskyl; i andre Samlinger har jeg set den fra Randers, Fyen, Nordsjælland og Bornholm. De fleste Findetider ere om Foraaret, færre fra Septbr. og Oktbr.

353. *Bipunctata* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 91; *Baryodma bipunctata* Thoms., Skand. Col. II. 249; *Baryodma bipunctata* Gr. Seidl., Faun. Balt. p. 453 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma bipunctata* Gr.

Udbredt overalt og ikke sjelden; den træffes hyppigst i Ko- og Hestegødning, sjældnere i Opskyl. Foraar og Efteraar.

354. *Morion* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 108; *Baryodma morion* Thoms., Skand. Col. II. 250; *Baryodma morion* Grav Seidl., Faun. Balt. 453 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma morion* Grav.

Overalt og ikke sjelden. Sammen med *bipunctata* findes den især i Gødning, navnlig Hestegødning, men er forøvrigt ofte taget i Opskyl, i Sigtegods fra fugtig Skovbund og ved raadne Plantestoffer saavelsom ved Aadsel. Foraar og Efteraar afgive de fleste Findetider.

355. *Succicola* Thoms. — *Baryodma succicola* Thoms., Skand. Ins. I. 42; *Baryodma succicola* Thoms. Seidl., Faun. Balt. 453 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma succicola* Thoms.

Meget sjelden. To Stykker, som findes i min Samling, og som ere tagne i Aalborg eller i Omegnen, ere de eneste, jeg har set af denne Art.

356. *Moesta* Gr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 99; *Baryodma moesta* Thoms., Skand. Col. II. 252; *Baryodma moesta* Gr. Seidl., Faun. Balt. 452 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma moesta* Gr.

Udbredt, men ikke hyppig; den er funden under Løv og raadnende Plantedele saavelsom ved udflydende

Træsæft; af Lærer Andersen er den taget hos *Form. rufa*. De fleste Findetider ere om Foraaret, enkelte midt om Sommeren.

357. *Linearis* Thoms. — Thoms., Skand. Col. II. 253; *Baryodma lugubris* Aubé Seidl., Faun. Balt. 452; *Aleochara moerens* Gyll. Kraatz, Ins. Deutschl. II. 103 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma moerens* Gyll.

Om Efteraaret i raadne Boletussvampe, navnlig i den spiselige *Boletus sodalis*, som vokser almindeligt i højere liggende Skove. Den er udbredt over hele Landet og kan ofte tages i stort Antal i Selskab med *Homalota merdaria* og andre svampesøgende Arter.

358. *Mycetophaga* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 102; *Baryodma lata* Thoms., Skand. Col. II. 251; *Baryodma mycetophaga* Kr. Seidl., Faun. Balt. 452 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma mycetophaga* Kr.

Ligesom foregaaende i Svampe om Efteraaret, men sjældnere; i Bøgeskovene omkring Skørping har jeg taget den nogle Gange til Dels sammen med *linearis*; i Nordsjælland er den funden af Cand. W. Schlick.

359. *Lygæa* Kr. — *Baryodma lygæa* Kr. Seidl., Faun. Balt. 452 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma lygæa* Kr.

Sjelden eller meget sjelden. Et enkelt Stykke er taget af Lærer Andersen, Haderslev, hos *Form. rufa*; selv har jeg fundet den enkeltvis dels sent om Efteraaret et Par Steder omkring Aalborg under Løv paa fugtig Skovbund, dels i Maj, og ligeledes under Løv, i Trelde Skov ved Fredericia.

360. *Rufitarsis* Heer. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 95; *Baryodma rufitarsis* Heer Seidl., Faun. Balt. 452 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma rufitarsis* Heer.

Et enkelt Stykke har jeg fundet i en Stald i Aalborg, Maj 1893.

361. *Brunneipennis* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 100. *Baryodma moerens* Thoms., Skand. Col. II. 253;

Baryodma moerens Gyll. Seidl., Faun. Balt. 452 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma sanguinea* L.

Meget sjelden. Et Stykke uden Oplysning om Findestedet har jeg set i Kmrhr. Fabritius-Tengnagels Samling, et andet har jeg selv taget paa en Staldmur i Aalborg, Juli 1891.

362. *Lanuginosa* Gyll. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 93; *Baryodma lanuginosa* Thoms., Skand. Col. II. 252; *Baryodma lanuginosa* Grav. Seidl., Faun. Balt. 452 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma lanuginosa* Grav.

Overalt almindelig i Gødning, ved raadne Plante-stoffer, under Løv og i Opskyl; ogsaa ved Aadsler træffes den hyppigt, sjeldnere ved Mÿretuer. Den er taget i de fleste af Aarets Maaneder, hyppigst om Foraaret.

363. *Bisignata* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 104; *Baryodma bisignata* Thoms., Skand. Col. II. 250; *Baryodma bisignata* Er. Seidl., Faun. Balt. 452 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma bisignata* Er.

I Gødning, men ikke almindelig. De af Samlerne anførte Findetider ere alle om Foraaret.

364. *Nitida* Gr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 105; *Baryodma nitida* Thoms., Skand. Col. II. 254; *Baryodma nitida* Gr. Seidl., Faun. Balt. 451 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma nitida* Gr.

Meget almindelig og udbredt overalt i Gødning og under Løv paa enhver Slags Bund. Den er taget i de fleste af Aarets Maaneder.

365. *Binotata* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 106; *Baryodma longula* Thoms., Skand. Col. II. 254; *Baryodma binotata* Kr. Seidl., Faun. Balt. 451 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma verna* Say.

Ofte sammen med foregaaende i Gødning, men langt mindre hyppig; de fleste af mine Ekspl. har jeg

taget paa sandede Strandbredder under Tang og halvraadne Fiske. Foraar og Efteraar.

366. *Bilineata* Gyll. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 105; *Baryodma bilineata* Thoms., Skand. Col. II. 254; *Baryodma bilineata* Gyll. Seidl., Faun. Balt. 451 — Cat. Col. Eur. III. *Baryodma bilineata* Gyll.

Sjelden; i Gødning, Opskyl og ved Stranden under Tang; den foreligger fra forskellige Landsdele, men kun i ringe Antal. De fleste Findetider ere om Efteraaret, enkelte fra Maj, Juni.

367. *Procera* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 97; *Rheochara spadicea* Er. Seidl., Faun. Balt. 450 — Cat. Col. Eur. III. *Rheochara procera* Kr.

Af denne særdeles sjeldne og ejendommelige *Aleochara*, der ved første Øjekast meget minder om en *Ocalea*, har Cand. Schlick fundet et Stykke ved Brede, Nordsjælland, d. 2. Mai 1871.

368. *Grisea* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 96; *Polystoma nitidula* Thoms., Skand. Ins. I. 43; *Polystoma grisea* Kr. Seidl., Faun. Balt. 450 — Cat. Col. Eur. III. *Polystoma grisea* Kr.

Ved Stranden under opskyllet Tang; den synes at forekomme sjeldent; af Kmrhr. Fabritius-Tengnagel er den funden ved Gjedser, af Cand. Schlick ved Tidsvilde, af Sparekassedirekt. O. Jakobsen ved Aarhus og af Forfatteren ved Skagen. De anførte Findetider ere i Maj, Juli og Septbr.

369. *Algarum* Fauv. — *Polystoma grisea* Thoms. Skand. Col. III. 48; *Polystoma algarum* Fauv. Seidl., Faun. Balt. 450 — Cat. Col. Eur. III. *Polystoma algarum* Fauv.

Ved Stranden under Tang, men sjelden. Den er taget ved Klitmøller i Thy, ved Tidsvilde paa Sjælland og ved Rønne paa Bornholm af Kmrhr. Fabritius-Tengnagel, samt ved Rø paa Bornholm af Forfatteren. Sidst-

nævnte Sted fandtes den i stor Mængde i sammenkastede, gærende Bunker af Blæretang i Selskab med *Stenus incrassatus*. Maj, Juni og Juli.

370. *Obscurella* Gr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 96; Thoms., Skand. Col. III. 48; *Polystoma obscurella* Gr. Seidl., Faun. Balt. 450 — Cat. Col. Eur. III. *Polystoma obscurella* Gr.

Som de foregaaende tvende Arter paa Stranden under Tang, men hyppigere og mere jævnt udbredt; den er samlet ved Skagen, Strandby, Harboøre, Tidsvilde, Hornbæk o. fl. St. Findetiderne ere fra Maj til Septbr.

Dinarda Leach

371. *Mærkelii* Kiesw. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 110; Thoms., Skand. Col. II. 245; Seidl., Faun. Balt. 448 — Cat. Col. Eur. III. *Dinarda Mærkelii* Kiesw.

Almindelig i Tuerne hos *Form rufa*, stundom i Antal. Den hører ligesom følgende Art til de ægte *Myrmecophiler*, der gennemgaa hele deres Udvikling indenfor Tuens Omraade og kun tilfældigt træffes udenfor denne. Den er taget saavel om Foraaret som om Efteraaret, hyppigst i April og Maj.

372. *Dentata* Grav — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 111; Thoms., Skand. Col. II. 244; Seidl., Faun. Balt. 448 — Cat. Col. Eur. III. *Dinarda dentata* Grav.

Udbredt, men ikke hyppig; den er funden ved Donse, Sælsø og Ravnsnæs hos *Form. exsecta* af Konsv. Løvendal, i Teglstrup Hegn af samme hos *Form. sanguinea*; i Jylland er den taget i Pindstrup Skov ved Randers af Sparekassedirekt. Jakobsen og i Restrup ved Aalborg af Forfatteren, begge Steder hos *Form. exsecta*. Alle opgivne Findetider ere i April og Maj.

Lomechusa Grav.

373. *Strumosa* F. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 113; Thoms., Skand. Col. II. 242; Seidl., Faun. Balt. 449 — Cat. Col. Eur. II. *Lomechusa strumosa* F.

Denne anselige og ejendommelige *Myrmecophil* træffes kun i Selskab med *Form. sanguinea* og er meget sjelden. Den streifer nu og da omkring i Tuens Nærhed, men opholder sig forøvrigt i selve Tuen midt i Myrernes Vrimmel. Næsten alle de Ekspl., jeg har set eller faaet paalidelig Oplysning om, ere fundne i Teglstруп Hegn i Nordsjælland, dels af Dr. Meinert, 29. Maj 1856, hos *Formica sanguinea*, dels af Konsv. Løvendal, 10. April 1873.

Atemeles Dillwyn.

374. *Paradoxus* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 116; Thoms., Skand. Col. II. 243; Seidl., Faun. Balt. 449 — Cat. Col. Eur. III. *Atemeles paradoxus* Grav.

Meget sjelden. Den opholder sig hos forskellige *Myrmica*-Arter, sjeldnere hos *Formica fusca*, og er funden ved Brede i Nordsjælland af Hammeleff, ved Jægerspris og paa Ørholmsfælled af Konsv. Løvendal, ved Hornbæk af Sparekassedirektør Jakobsen, i Hammer Bakker, Vendsyssel, har jeg selv taget et Stykke løbende i et Hjulspor, et andet fandtes i Restrup under en Sten, hvor *Myrmica ruginodis* og *Form. fusca* havde deres Boliger jevnside. Findetiderne ere i April, Maj og Juni.

375. *Emarginatus* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 117; Thoms. Skand. Col. II. 244; Seidl., Faun. Balt. 449 — Cat. Col. Eur. III. *Atemeles emarginatus* Gr.

Ligesom *paradoxus* træffes den i Reglen hos *Myrmica*-Arter og saavel i selve Boet som udenfor under Løv og Jordknolde sammen med omstørfende Myrer, sjeldnere er den funden i Tuerne hos *Form. fusca*. Den er taget mange Steder Landet rundt, men oftest kun enkelt- eller parvis; dog har jeg en Gang truffet den i Antal under Sten sammen med *Myrmica ruginodis* og *Form. fusca*; undtagelsesvis er den nedbanket af

Buske af Konsv. Løvendal. April og Maj afgive de fleste Findetider, sjældnere er den taget i August og September.

Interessante Oplysninger om *Lomechusa strumosa* og ovennævnte *Atemeles*-Arter ere fremkomne ved E. Wasmann i »Beiträge zur Lebensweise der Gattungen *Atemeles* und *Lomechusa*«, Særtryk af »Tijdschr. voor Entomologie XXXI«, Haag 1888.

Myrmedonia Er.

376. *Collaris* Payk. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 122; *Zyras collaris* Thoms., Skand. Col. II. 259; *Zyras collaris* Payk. Seidl., Faun. Balt. 447 — Cat. Col. III. *Zyras collaris* Payk.

Udbredt over hele Landet, men langt hyppigere mod Syd og paa Øerne end i det nordlige og vestlige Jylland, hvor den kun er taget et Par Gange og enkeltvis. Den findes paa fugtig Eng- og Skovbund, ved Bredden af Søer og Vandløb, ikke sjældent i Selskab med *Pæderus*-Arter, med hvis livlige Farver dens egne stemme saa godt overens. Den synes ikke som de fleste andre *Myrmedonier* at være bundet til Naboskab af Myrer, og dens Forekomst ved forskellige Arters Tuer er vistnok en mere tilfældig; i Opskyl fra Enge er den oftere taget i Antal. Findetiderne ere i Marts, April og Maj, sjældnere i Septbr.

377. *Humeralis* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 122; Thoms., Skand. Col. II. 256; Seidl., Faun. Balt. 447 — Cat. Col. Eur. III. *Myrmedonia humeralis* Grav.

Denne anselige Art er den almindeligste af vore *Myrmedonier* og findes overalt, hvor *Formica rufa* og *fuliginosa* bygge deres Tuer. Dog træffes den sjældent inde i selve Tuen, især ikke hos den krigerske og let pirrelige *Form. rufa*, men derimod al Tid ved Tuens

Fod under Løv og Mos; sammen med Myrerne strejfer den vidt omkring og kan derfor ofte tages langt fra Tuen. Hos den fredelige *Form. fuliginosa* er den dristigere og blander sig med andre *Myrmedonia*-Arter mere uforbeholdent i Myrernes Vrimmel. Dens Forhold til Myrerne er ikke noget venskabeligt, da den utvivlsomt lever af at overfalde og fortære enligt omstreffende, svage eller saarede Individuer. Om Vinteren gaar den med Myrerne dybere ned i Tuen for at søge Vinterleje. Foraars- og Efteraarsmaanederne ere de rette Findetider for denne Art; dog har jeg ogsaa taget den i Juli—August saavel som midt om Vinteren.

378. *Cognata* Mærkel. — Kraatz, Ins. Deutschl. 123; Thoms., Skand. Col. II. 256; Seidl., Faun. Balt. 447 — Cat. Col. Eur. III. *Myrmedonia cognata* Mrkl.

Udbredt, men i det Hele temmelig sjelden. Den findes især hos *Form. fuliginosa*, hvor den flere Gange er taget i Antal, men ogsaa hos *Form. fusca* og *exsecta*. Hyppigst foreligger den fra Nordsjælland, saaledes fra Donse, Lyngby, Stenholts Vang, Lethraborg o. fl. St., sjældnere fra Nordjylland, hvor jeg kun har truffet den to Gange, nemlig paa Lundby Bakker hos *Form. fusca* og paa Blokhuse Hede hos *Form. exsecta*. Fra andre Dele af Landet ere ingen Findesteder mig bekendte. Findetiderne ere i April, Maj og igen Aug.—Septbr.

379. *Funesta* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 124; Thoms., Skand. Col. II. 257; Seidl., Faun. Balt. 447 — Cat. Col. Eur. III. *Myrmedonia funesta* Grav.

Hvor man træffer nogenlunde kraftige Bygder af *Form. fuliginosa*, finder man i Reglen ogsaa denne »Myreven« som Gæst; den synes udelukkende at holde sig til denne sorte Myre, med hvis Farve dens egen passer saa godt sammen; ofte er den til Stede i meget stort Antal. Den er taget ved Brede, Donse, Lethraborg, Tokkekjøb o. fl. St. paa Sjælland, paa Halvøen

ved Haderslev og Aalborg. Findetiderne ere i alle Maanederne fra April til Septbr.

380. *Limbata* Payk. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 125; Thoms. Skand. Col. II. 258; Seidl., Faun. Balt. 447 — Cat. Col. Eur. III. *Myrmedonia limbata* Payk.

Udbredt, men temmelig sjelden og al Tid kun i ringe Tal. Den er funden i Selskab med *Form. sanguinea*, *fusca*, *exsecta* og *flava* hele Landet over og af de fleste Samlere fra Marts til Juni.

381. *Lugens* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 126; Thoms., Skand. Ins. I. 41; Seidl., Faun. Balt. 448 — Cat. Col. Eur. III. *Myrmedonia lugens*. Grav.

Stedegen og sjelden eller meget sjelden. Den er kun truffet i Selskab med *Form. fuliginosa* og i ringe Tal sammen med *funesta* og følgende Art. Af Konsv. Løvendal er den taget ved Brede, Stendalsvang, Rudehegn og Lethrabort samt Kjøge, af Ingeniør Engelhart ved Tokkekjøb paa Sjælland; i Museets Samling findes Stykker uden Oplysninger; paa Halvøen er den endnu ikke funden. April og Maj.

382. *Laticollis* Mærkel. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 127; Thoms., Skand. Col. III. 257; Seidl., Faun. Balt. 448 — Cat. Col. Eur. III. *Myrmedonia laticollis* Mrkl.

Udbredt sammen med *Form. fuliginosa*, fra hvis Bygder og Selskab den vistnok aldrig fjerner sig langt. og hvor den ofte forekommer saa talrigt, at den næsten overgaar Myrerne i Tal. Sammen med disse løber den omkring i Tuens Nærhed, hvor den kan findes ved at sigte Skovbunden og Løvet. April—Maj og igen Septbr. — Oktbr. afgive de fleste Findetider, en enkelt Gang er den taget i Juli.

383. *Canaliculata* F. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 129; *Astilbus canaliculatus* Thoms., Skand. Col. II. 260; *Drusilla canaliculata* Fabr. Seidl., Faun. Balt. 414 — Cat. Col. Eur. III. *Astilbus canaliculatus* F.

En vingeløs og vidt omstrefende Art, der træffes saavel i Myretuerne som langt fra disse og næsten paa enhver Slags Bund. Almindelig fra tidlig paa Foraaret til sent paa Høsten.

Ilyobates Kraatz.

384. *Nigricollis* Payk. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 134; Thoms., Skand. Col. II. 304; Seidl., Faun. Balt. 464 — Cat. Col. Eur. III. *Ilyobates nigricollis* Kr.

Under Løv og Mos paa fugtige Steder i Skove og Krat, udbredt, men temmelig sjelden. Den er taget forskellige Steder ved Aalborg, Randers og Haderslev, ved Ermelund, Svenstrup, Lyngby og flere Steder paa Sjælland. Findetiderne ere fra Maj til Juli og igen i Septbr. Mærkelig hos denne Art er den store Forskel i Størrelse, der kan fremkomme mellem de forskellige Individuer.

385. *Rufus* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 135; *Ilyobates propinquus* Aubé Seidl., Faun. Balt. 464. — Cat. Col. Eur. III. *Ilyobates propinquus* Aubé.

Det eneste Stykke, jeg har set, findes i Konsv. Løvendals Samling og er taget ved Tiis Sø; Findetiden er ikke angivet. Arten er meget sjelden i det sydlige Tyskland og ikke funden i Sverig.

386. *Forticornis* Lac. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 136; *Mniobates forticornis* Lac. Seidl., Faun. Balt. 464 — Cat. Col. Eur. III. *Ilyobates forticornis* Lac.

Særdeles sjelden; et Stykke er taget af Toldassistent Holstebro ved Taps 24. Mai 1888, tre andre findes fordelte i Kmrhr. Fabritius-Tengnagels, Skolebestyrer Jørgensens og Cand. Schlicks Samlinger, men ere alle uden Oplysninger om Findested og Tid.

Callicerus Grav.

387. *Obscurus* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl.

II. 138; Semiris obscurus Thoms., Skand. Col. II. 299; Seidl., Faun. Balt. 416 — Cat. Cal. Eur. III. Callicerus obscurus Grav.

Meget sjelden og stedegen, under Løv og Mos paa fugtig Bund, ogsaa i Opskyl. Den er taget ved Lethraborg af Konsv. Løvendal og Sparekassedirektør O. Jakobsen og i Københavns Omegn ved Godthaabsvej, i Ladegaardsmose og Damhusmose af Arkitekt Koch; to ældre Stkr. blandt Museets Materiale fandtes uden Oplysninger. Findetiderne er i Februar, Marts og April.

Calodera Mannh.

388. Nigrita Mannh. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 141; Thoms., Skand. Col. II. 301; Seidl., Faun. Balt. 413 — Cat. Col. Eur. III. Calodera nigrita Mannh.

Sjelden og enkeltvis paa fugtige Steder i Skove, paa Enge og i Moser, under Løv og i Opskyl. I Museets Samling findes 4 Stykker med Farveetiketter for Bornholm og Lolland; forøvrigt er den taget ved Sorø og paa Fæjød af Fabriksejer Drewsen (Konsv. Løvendals Samling), i Rudehegn og Grønnehave af Cand. Schlick og ved Silkeborg i en Skovmose af Sparekassedirektør Jacobsen. Findetiderne ere i Maj og Aug.

389. Protensa Mannh. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 142; Thoms. Skand. Col. II. 302; Seidl., Faun. Balt. 413 — Cat. Col. Eur. III. Calodera protensa Mannh.

Meget sjelden; som foregaaende Art paa fugtig Skovbund, i Moser osv. I Museets Samlinger saavel som i Konsv. Løvendals findes nogle faa Stykker uden Oplysninger; selv har jeg taget et enkelt Stykke ved et Vandhul i Lundby Krat syd for Aalborg i Maj 1892.

390. Uliginosa Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 143; Thoms., Skand. Col. II. 302; Seidl., Faun. Balt. 413 — Cat. Col. Eur. III. Calodera uliginosa Er.

Sjelden og stedege. Ved et Mosehul i Skørping Holme syd for Aalborg sigtede jeg af fugtigt Løv en mindre Række i Maj 1892, nogle Stykker fandtes samme Foraar ved Kølske Dam i Vendsyssel under lignende Forhold; af Skolebestyrer Jørgensen er den taget ved Hunderup paa Fyen i April 1893; men fra andre Landsdele foreligger kun tre Stykker i Cand. Schlicks Samling, dog uden nærmere Oplysning.

391. *Riparia* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 144; Seidl., Faun. Balt. 413 — Cat. Col. Eur. III. *Calodera riparia* Er.

Overalt sjelden og enkeltvis. I Museets Samling findes Eksemplarer, tagne af Prof. Schiødte, Dr. Bergsøe og Arkitekt Koch, alle uden nærmere Oplysninger; det samme maa beklages for to Stykkers vedkommende, fundne af Cand. Schlick; forøvrigt er et enkelt Stykke taget ved Brønderslev af Student Hoffmeyer og et andet i Skørping Holme under fugtigt Løv af Forfatteren i Maj 1893.

392. *Æthiops* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 144; Thoms., Skand. Col. II. 302; Seidl., Faun. Balt. 413 — Cat. Col. Eur. III. *Calodera æthiops* Grav.

Udbredt og mere hyppig end de foregaaende Arter af denne Slægt, dog al Tid kun i ringe Tal eller enkeltvis. Den opholder sig paa fugtig Skovbund, i Moser og Enge og er taget af de fleste Samlere. Findetiderne ere Marts—April og Septbr.

En sjette Art af *Calodera*, *C. umbrosa*, der af Thomson opstilles som en særegen Slægt, *Amarochara*, er endnu, saa vidt jeg vød, ikke funden her i Landet; men da den forekommer saavel i Skaane som i Nordtyskland, er det ikke usandsynligt, at den ogsaa vil kunne træffes her; af Prof. Thomson er den taget i ud-tørrede Grusgrave.

Chilopora Kr.

393. *Rubicunda* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 147; Seidl., Faun. Balt. 413 — Cat. Col. Eur. III. *Chilopora rubicunda* Er.

Meget sjelden og stedege under Løv og i Opskyl ved sandede Bredder af Aaer og Damme sammen med *Tachyusa*-Arter. Jeg har taget den i Grejsdalen ved Vejleaa i en sandet Brink i Selskab med *Tachyusa constricta* o. fl., en anden Gang ved Kjølske Dam i Vendsyssel under Løv og Opskyl sammen med *Homalota insecta*; Cand. Schlick har fundet den enkelt ved Vodroffsvej, København. Findetiderne ere i Aug., Septbr. og Oktbr.

Tachyusa Er.

I Modsætning til *Calodererne*, der ere temmelig træge Skyggedyr, ere Arterne af denne Slægt saavel som af den foregaaende særdeles let bevægelige og smidige Dyr, der med stor Hurtighed og under livlige Bevægelser med Bagkrop og Følehorn løbe omkring i Solskin ved Aaer og Damme. Ved at holde dem levende i Glas med halvfugtigt Sand, kan det let iagttages, at flere Arter anlægge Gange i Sandet, idet de paa Myrernes Vis flytte de enkelte Sandskorn med Munddelene og bære dem udenfor Gangen. Man vil derfor ogsaa i Reglen finde de Steder paa Sandbredden eller i Brinken, hvor de forekomme, oprodet og løs og Overfladen bestrøet med løse Sandskorn, som om den var undergravet af Myrer. De leve i smaa Selskaber oftest blandede med Arter af andre Slægter, saasom *Bledier*, *Stenus*-Arter og *Homaloter*. Med Undtagelse af *atra* ere de alle sjeldne.

394. *Constricta* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 151; Thoms., Skand. Col. III. 3; Seidl., Faun. Balt. 415 — Cat. Col. Eur. III. *Tachyusa constricta* Er.

Meget sjelden. Jeg har taget den ved Bredden af

Grejsdalens Aa i en Sandbrink, af hvilken jeg sigtede den sammen med *Bledius subterraneus*, *Stenus biguttatus* og *Chilopora rubicunda*, 17. August 1893; et Stykke uden Oplysninger har jeg set i Konsv. Løvendals Samling og i Cand. Schlicks flere mærkede »17. August 88 L. M.« (Lolland. Maribo?)

395. *Coarctata* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 152; Skand. Col. III. 4; Seidl., Faun. Balt. 415 — Cat. Col. Eur. III. *Tachyusa coarctata* Er.

Ligeledes en meget sjelden Art. En større Række har Cand. Schlick fundet paa samme Sted som foregaaende, »17. Juni 88 L. M.«; desuden er den taget af Prof. Schiødte ved Sundet i Juni, og af Dr. Meinert i Nordsjælland; andre Fund ere mig ikke bekendte.

396. *Scitula* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 153; *Ischnopoda scitula* Er. Seidl., Faun. Balt. 415 — Cat. Col. Eur. III. *Tachyusa scitula* Er.

Som de foregaaende meget stedegen og sjelden. I Vendsyssel har jeg taget den i Hvorup, hvor jeg sigtede den af en halvfugtig Sandskrænt sammen med forskellige *Bledius*-Arter, ved Blokhus, hvor den ligeledes fandtes sammen med *Bledier* i en Sandbrink, og ved Flauenskjold under en Lerskrænt; fra Grejsdalen har jeg et enkelt Stykke, taget sammen med *constricta*, og ved Møens Klint er en lille Række funden af Kmrhr. Fabritius-Tengnagel. Findetiderne er i Juli. Aug. og Septbr.

397. *Flavitarsis* Sahlb. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 153; *Ischnopoda chalybæa* Thoms., Skand. Col. III. 5; *Ischnopoda flavitarsis* Sahlb. Seidl., Faun. Balt. 415 — Cat. Col. Eur. III. *Ischnopoda leucopus* Marsh.

Meget sjelden. Den er taget af Konsv. Løvendal ved Blykobbeaaen paa Bornholm, 1. Juli 92, af Forfatteren i Grejsdalen sammen med *constricta* o. fl., 17. Aug. 93, samt ved en Dam i Vang Skov, Vendsyssel, 3. Septbr. 93, hver Gang kun enkelte

Stykker; i stort Antal har jeg derimod fundet den paa den sandede Bred af Aaen ved Aalbæk 17. Juni 94 i Selskab med *Dyschirius*- og *Heterocerus*-Arter; i Kmhr. *Fabritius-Tengnagels* og *Cand. Schlicks Samlinger* har jeg set enkelte Stykker, henholdsvis tagne 17. Juni 92 og 10. Juni 70, men uden Oplysning om Findestederne.

398. *Umbratica* Er. — *Kraatz, Ins. Deutschl. II. 154*; *Ischnopoda umbratica* Er. *Seidl., Faun. Balt. 415* — *Cat. Col. Eur. III. Ischnopoda umbratica* Er.

Meget sjelden. Nogle faa Stykker ere fundne ved Hjortholm paa Sjælland af Konservator Løvendal, 20. Maj 80; af *Cand. Schlick* er den taget paa Korupkjærs Marker (?), 10. Juni 71, selv har jeg to Stykker fra Grejsdalen, fundne sammen med og paa samme Sted som flere af de foregaaende Arter, 17. Aug. 93.

399. *Atra* Grav. — *Kraatz, Ins. Deutschl. II. 155*; *Thinonoma atra* Thoms., *Skand. Col. III. 6*; *Thinonoma atra* Grav. *Seidl., Faun. Balt. 415* — *Cat. Col. Eur. III. Thinonoma atra* Grav.

Almindelig over hele Landet ved Aaer, Søer og Strand, i dyndede, halvtørre Grøfter og ved Bredden af Vanddamme paa fri Mark. Den løber omkring, naar den foruroliges, med pilsnar Hurtighed og er ret vanskelig at fange; sædvanligt træffes den i Selskab med *Homalota labilis*. Den er funden i alle Maaneder fra Marts til Oktober.

En nærstaaende Art, *concolor* Er., der ligner *atra*, men er mindre, med kortere Følehorn og lysere Ben, er taget paa Lerbund i Nordtyskland sammen med foregaaende; mulig kunde den ved nærmere Eftersøgning ogsaa findes hos os.

Ocyusa Kr.

400. *Maura* Er. — *Kraatz, Ins. Deutschl. II. 157*; *Thoms., Skand. Col. III. 11*; *Seidl., Faun. Balt. 463* — *Cat. Col. Eur. III. Ocyusa maura* Er.

Sjelden og stedegeen paa Mose- og Kærbund samt paa fugtig Skovbund under Løv og visne Plantedele. Af Arkitekt Koch er den samlet ved Utterslev, i Gjelte Skov og Vejle Mose, af Prof. Schiødte i Damhusmosen, af Konsv. Løvendal og af Cand. Schlick ligeledes i Kjøbenhavns Omegn; i Jylland er den funden ved Randers af Købmand O. G. Jensen, men ikke længere nordpaa. Findetiderne strække sig fra April til Juli.

401. *Ruficornis* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 158; *Ocyusa longitarsis* Thoms., Skand. Ins. I. 46; *Ocyusa picina* Aubé Seidl., Faun. Balt. 463 — Cat. Col. Eur. III. *Ocyusa picina* Aubé.

Endnu mere stedegeen end foregaaende og sjeldnere. En lille Række er taget af Arkitekt Koch i Lyngby Mose i Marts 74 og en anden Gang i April uden Oplysning om Findestedet; af Prof. Schiødte er den funden ved Strandmølleaa mellem Rør og af Cand. Schlick i Lyngby Mose og ved Fuglevad i April og Maj.

Oxypoda Mannh.

Denne Slægt, der ifølge Kraatz nærmest tilhører vor Verdensdel, tæller i det Hele et ret betydeligt Antal Arter; for Europas vedkommende noget over 100. Af dette Antal er der hos os fundet omtrent en Fjerdedel. Oxypodernes mere eller mindre tydelige og tætte silkeagtige Haarklædning, deres slanke, i Reglen tilspidsede Bagkrop, og deres temmelig lange Fodled, især paa Bagfodderne, gør dem velskikkede til at færdes paa fugtig Bund og smutte omkring under Løvet og mellem Jordklumper. Her træffer man ogsaa en betydelig Del af dem, gerne i Selskab med Myllæna-Arter og forskellige Homalotaer, der i Levevis og Udseende nærme sig Oxypoderne. En Del søger Svampe, andre opholde sig i og ved Myretuer. Deres Farve, der samstemmer godt med det gulbrune, visne Løv og med den mørke Jord-

bund, er i Reglen kun lidet afstikkende og indenfor Arten ofte noget ubestemt, udvisket og foranderlig. Dette bidrager i mange Tilfælde til at vanskeliggøre Bestemmelsen, der hos en Del Arter ingeniunde er let. — Af Prof. Thomson o. a. er denne Slægt delt i flere Underafdelinger.

402. *Ruficornis* Gyll. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 161; Thoms., Skand. Col. III. 17; Seidl., Faun. Balt. 457 — Cat. Col. Eur. III. *Oxypoda ruficornis* Gyll.

En smuk og anselig Art, der træffes i halvraadne Svampe og under muldnende, gammelt Løv indtil sent paa Efteraaret; udbredt, men sjelden. Den haves fra Strandmøllen (Prof. Schiødte), fra Brede, hvor den er taget i en Hvepserede (Løvendal) og ved en Myretue (Schlick) samt fra Harreskov (Løvendal). I Midtjylland er den funden ved Tjele (Løvendal), i Vendsyssel ved Skovlund og Vang og syd for Aalborg i Lundby Krat (Forf.); i Arkitekt Kochs Samling findes et Par Stykker uden Oplysning. De fleste Findetider ere om Efteraaret, enkelte i Maj—Juni.

Oxypoda spectabilis Mærkel, Kraatz, Ins. Deutschl. II. 162, er en mørkere Varietet af *ruficornis*. Hvad jeg i flere Samlinger har set opstillet som *spectabilis*, har i Reglen været følgende Art.

403. *Luteipennis* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 162; *Oxypoda lividipennis* Thoms., Skand. Col. III. 18; *Oxypoda lividipennis* Mannh. Seidl., Faun. Balt. 458 — Cat. Col. Eur. III. *Oxypoda luteipennis* Er.

Udbredt og ikke sjelden i Svampe, under Løv og i Plantemøddinger, stundom ogsaa ved Myretuer, navnlig hos *Form. fuliginosa*. Den er taget af de fleste Samlere og saavel i Foraarsmaanederne som fra Aug. til Nvbr.

404. *Metatarsalis* Thoms. — Thoms., Skand. Ins. I. 47; *Oxypoda luteipennis* Er. Seidl., Faun. Balt. 458 = *longipes* Rey — Cat. Col. Eur. III. *Oxypoda longipes* Rey.

Fra Hvorup, nord for Nørre-Sundby, har jeg tre Stykker, der med Aars Mellemrum alle ere fundne sent paa Efteraaret; forøvrigt er den taget ved Kjøbenhavn i en Humlerede af Konsv. Løvendal, Juli 93.

405. *Vittata* Mærkel. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 163; Thoms., Skand. Ins. I. 47; Seidl., Faun. Balt. 458 — Cat. Col. Eur. III. *Oxypoda vittata* Mrkl.

En ægte *Myrmecophil*, der kun (?) findes i og ved *Form. fuliginosas* Tuer. Den er udbredt sammen med denne Myre, men er i det Hele sjelden, navnlig mod Nord i Landet, hvor jeg kun har taget den enkelt i en lille Skov ved Aalborg. Paa Øerne og mod Syd er den taget af Prof. Schiødte, Konsv. Løvendal, Cand. Schlick, Sparekassedirektør Jakobsen og Lærer Andersen, enkelte Gange i Antal. Undtagelsesvis skal den kunne træffes ved Egesaft og i Humleboer (E. Wasmann). De anførte Findetider ere i Maj, Juni og Aug.

406. *Opaca* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 165; Thoms., Skand. Col. III. 19; Seidl., Faun. Balt. 458 — Cat. Col. Eur. III. *Oxypoda opaca* Gr.

Almindelig overalt under Løv og muldnende Plantedele, saavel i som udenfor Skove; den er taget i de fleste af Aarets Maaneder.

407. *Umbrata* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 168; *Oxypoda humidula* Kr. 1865 Seidl., Faun. Balt. 458 = *umbrata* Er., Kr. 1857 nec. Gyll. — Cat. Col. Eur. III. *Oxypoda humidula* Kr.

Nogle Stykker i Museets Samling, fundne af Arkitekt Koch, 12. April 74, uden Oplysning om Findested, høre sandsynligvis til denne Art.

408. *Cuniculina* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 169; *Oxypoda umbrata* Thoms., Skand. Col. III. 19; *Podoxya umbrata* Gyll. Seidl., Faun. Balt. 460 — Cat. Col. Eur. III. *Oxypoda umbrata* Gyll.

Paa fugtig Bund i Skove, Enge og Moser, ved Søer,

og Fjordbred under Løv og raadnende Planteemner, ikke sjelden, men mest dog kun enkelt eller i ringe Tal. Den er taget om Foraaret og om Høsten.

409. *Exigua* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 174; *Podoxya exigua* Er. Seidl., Faun. Balt. 460 — Cat. Col. Eur. III. *Oxypoda exigua* Er.

Sjelden. En mindre Række er samlet af Prof. Schiødtte ved Skagen paa fugtig Hedegrund, ved Tidsvilde og paa Fælleden ved Kjøbenhavn; selv har jeg taget den ved Skagen paa Stranden under visne Planter og under lignende Forhold ved Limfjorden, Aalborg. Findetiderne ere i April, Juli, Septbr. og Oktbr.

410. *Longiuscula* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 167; *Disochara longiuscula* Thoms., Skand. Col. III. 30; *Disochara longiuscula* Er. Seidl., Faun. Balt. 457 — Cat. Col. Eur. III. *Disochara longiuscula* Er.

Udbredt overalt paa fugtig Bund saavel i som udenfor Skove og ikke sjelden. Den er taget i alle Aarets Maaneder undtagen Juli, Aug. og Januar.

Denne Art varierer ikke lidet med Hensyn til Antennernes Længde og Styrke, Hovedets og Forryggens forholdsvis Brede, Kroppens og Benenes Farve m. m. Jeg har saaledes et Stykke fra Skørping Skov, hos hvilket Kroppen er langt mere firskaaren end hos typiske Individuer, navnlig er Forryggen kort; hos et andet Stykke fra Lundby Bakker er Hovedet forholdsvis stort, Følehornene derimod fine, hele Dyret mindre end Hovedarten. Blandt de forskellige Varieteter ere flere med mørke Ben, der føre Tanken hen paa *obscura* Kr. uden dog helt at stemme overens med Kraatz's Beskrivelse af denne Art (Varietet?).

411. *Togata* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 170; *Thliboptera togata* Thoms., Skand. Col. III. 21; *Sphenoma togata* Er. Seidl., Faun. Balt. 459 — Cat. Col. Eur. III. *Sphenoma togata* Er.

Udbredt og ikke meget sjelden paa Sandmarker under Sten og ved Roden af Artemisiabuske, under Mos paa tørre Hedebakker og i Klitter; den træffes tidt nedblæst i Sandhuller. Den er funden i alle Maaneder fra Maj til Septbr.

412. *Sylvicola* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 173; *Thliboptera planipennis* Thoms., Skand. Col. III. 22; *Sphenoma planipennis* Thoms. Seidl., Faun. Balt. 459 — Cat. Col. Eur. III. *Sphenoma atricapilla* Mrkl.

Tre Stykker, som jeg i Løbet af flere Aar har fundet i Lindum Skov under Løv, ere de eneste, jeg har set af denne Art; de ere alle tagne i Juni.

413. *Alternans* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 177; *Mycetodrepa alternans* Thoms., Skand. Col. III. 28; *Mycetodrepa alternans* Grav. Seidl., Faun. Balt. 461 — Cat. Col. Eur. III. *Mycetodrepa alternans* Grav.

En udbredt og ret hyppig Art i Skove, hvor den ofte træffes skarevis i Svampe. Den er talrigst tilstede om Høsten, men er ogsaa taget i Maj og Juni.

414. *Exoleta* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 179; *Oxypoda riparia* Thoms., Skand. Col. III. 20; *Bæoglæna exoleta* Er. Seidl., Faun. Balt. 459 — Cat. Col. Eur. III. *Oxypoda exoleta* Er.

Sjelden eller meget sjelden. Jeg har fundet den et Par Gange ved Aalborg, nemlig et enkelt Stykke i en Sandgrav i Hvorup og en mindre Række i Restrup i en Bladdyng, April 1894.

415. *Testacea* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 175; *Bessopora testacea* Thoms., Skand. Col. III. 25; *Demosoma testacea* Er. Seidl., Faun. Balt. 460 — Cat. Col. Eur. III. *Bæoglæna testacea* Er.

Meget sjelden. Enkelte Stykker ere fundne af Dr. Meinert i Kjøbenhavns Omegn (?), af Konsv. Løvendal i Storskoven i Vendsyssel, Septbr. 71, og af Forf. i Hvo-

rup i en Sandgrav, Aug. 91; i Cand. Schlicks Samling findes et Stykke uden Oplysninger.

416. *Flava* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 175; *Bessopora soror* Thoms., Skand. Col. III. 24 (?); *Bæoglæna flava* Kr. Seidl., Faun. Balt. 459 Anm. 2 — Cat. Col. Eur. III. *Bessopora soror* Thoms. (?).

Funden af Sparekassedirektør O. Jakobsen ved Skjoldnæsholm, Sjælland, i Maj og Juni 1887 og af Konsv. Løvendal i en hul Eg ved Valsøllille, Maj 1887.

417. *Præcox* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 176; *Bæoglæna præcox* Thoms., Skand. Ins. I. 47; *Bæoglæna præcox* Er. Seidl., Faun. Balt. 459 — Cat. Col. Eur. III. *Bæoglæna præcox*.

Under Løv paa halvfugtig Skovbund. Den er taget af Cand. Schlick den 11. Mai 76 i Nordsjælland.

418. *Formiceticola* Mrkl. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 182; *Demosoma formiceticola* Thoms., Skand. Col. III. 33; *Demosoma formiceticola* Mrkl. Seidl., Faun. Balt. 460 — Cat. Col. Eur. III. *Demosoma formiceticola* Mrkl.

Udbredt overalt i Tuerne hos *Formica rufa*, stundom i Antal, sjeldnere hos *Form. exsecta* (Sælsø, Løvendal). Den er taget i Foraars- og Efteraarsmaanederne.

419. *Hæmorrhœa* Sahlb. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 184; *Bessopora hæmorrhœa* Thoms., Skand. Col. III. 26; *Demosoma hæmorrhœa* Mannh. Seidl., Faun. Balt. 460 — Cat. Col. Eur. III. *Bessopora hæmorrhœa* Sahlb.

Ligesom foregaaende en velkendt og udbredt Myregæst, navnlig hos *Form. rufa*, i hvis Tuer den ofte kan træffes skarevis; mindre hyppig er den hos *Form. exsecta*; forøvrigt er den ikke som *formiceticola* bunden til Myretuer; den er saaledes taget under Bark (Løvendal, Forf.) under Løv og i Opskyl (Forf.). Findetiderne strække sig fra Marts til Aarets Slutning.

420. *Annularis Mannh.* — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 188; *Bessopora helvola* Thoms., Skand. Col. III. 24; *Bessopora annularis* Mannh. Seidl., Faun. Balt. 461 — Cat. Col. Eur. III. *Bessopora annularis* Sahlb.

Udbredt og ikke sjelden. Den er oftest taget under Løv paa halvtør Bund, dog ogsaa under Bark og Svamp paa Stubbe, saavel som i og ved Myretuer. Findetiden er fra Marts til Novbr.

421. *Ferruginea* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 189; *Bessopora ferruginea* Thoms., Skand. Col. III. 27; *Bessopora ferruginea* Er. Seidl., Faun. Balt. 461 — Cat. Col. Eur. III. *Bessopora brachyptera* Steph.

Kraatz omtaler, at den findes under Bark; her i Landet er den saa godt som al Tid taget i Sandhuller, i tørre Grusgrave eller ved Roden af Planter paa Sandbund; ogsaa i og ved Form. rufas Tuer er den funden. Den er udbredt overalt og ikke sjelden. De fleste Findetider ere i Septbr. og Oktbr.

Foruden de nu optalte Arter af *Oxypoda* findes endnu, dels i min egen, dels i andres Samlinger forskellige Stykker, formodentlig henhørende til Arterne *islandica*, *obscura*, *rugulosa* o. fl.; men da der af hver Art kun forekommer et enkelt, tildels defekt Eksempplar, og da Bestemmelsen som Følge deraf maa blive noget usikker, har jeg ikke villet tælle dem med. Foreløbigt henstilles disse Arters Forekomst hos os til nærmere Undersøgelse.

Homalota Mannh.

Homalotaslægtens talrige Arter føre en meget forskellig Levevis. Der lader sig derfor vanskeligt sige noget almengyldigt om deres Opholdssteder; man træffer *Homaloter* saa godt som overalt i den frie Natur, hvor *Staphyliner* i det Hele kunne trives. En stor Del op-

holder sig paa fugtig Bund, paa mere eller mindre skyggefulde Steder under Løv og Mos, ved Bredden af Søer, Damme og Vandløb, hvor de smutte omkring mellem Sten og Plantedele, eller ved Havets og Fjordenes Kyster under Tang. Paa saadanne Steder træffes de sædvanligt i Selskab med Tachyusa-, Myllæna- og Stenus-Arter. Et andet betydeligt Antal søger Svampe og findes derfor især om Efteraaret, naar Stubbene og det visne Løv i Skovbunden bringe deres Vegetation af mangfoldige kødfulde Svampearter; atter andre ere henviste til Gødning, Aadsler eller raadnende Planter, og paa Lokalteter, hvor slige Næringsemner forefindes, kan man i stille Aftener eller efter en mild Regn se dem sværme i Selskab med andre Insekter, der søge samme Slags Næring. En mindre Del vil Samleren finde under Barken af Stubbe eller ved udflydende Træsæft, ja selv Bladskederne af Dunhammer og Rør afgive Opholdssted for enkelte Arter. Endelig kan endnu nævnes, at der ogsaa blandt Homaloterne findes et lille Antal Myregæster, der udelukkende holder sig til Myretuen og dens Beboere, medens en Del andre vel lejlighedsvis indfinde sig i og ved Tuen uden dog at staa i noget nærmere Forhold til Myrerne. For Samlere vil Sigten overalt være det Redskab, ved hvilket man med størst Lethed kan skaffe sig et rigeligt Udbytte paa en Ekursion efter Homaloter.

Homaloternes store Antal, mange af Arternes ringe Størrelse, deres ofte forvildende indbyrdes Lighed eller Overensstemmelse med andre Slægters Arter, den deraf flydende Vanskelighed ved at bestemme dem eller ved at faa et sikkert Indtryk af hver Arts ejendommelige Udseende, alt dette gør det her mere end noget andet Steds nødvendigt for Samleren at sørge for et godt og righoldigt Materiale. Saa vidt muligt bør hver Art opstilles ved en mindre Række, der indeholder begge Køn.

Præparationen maa være ensartet og omhyggelig og saaledes udført, at saavel Føddernes som Følehornenes og Bagkroppens enkelte Led kunne iagttages. Navnlig er det ved Opklæbningen af Vigtighed, at Dyret fremstilles saaledes i hele sin Længde, at Bagkroppens 2—3 sidste Led ikke trække sig ind, saa de helt eller delvis skjules. Her findes nemlig, som bekendt, hos en stor Del Arter særlige Kønsmærker, der navnlig ere til Stede hos Hannen, og som i de fleste Tilfælde afgive et godt og sikkert Skelnemærke mellem nærstaaende Arter. For at kunne undersøge Hovedets Underside med Kindernes fine Rand, Mellembrystet og mulige Udsnit paa Undersiden af Bagkroppens sidste Led, bør man opklæbe nogle Stykker af hver Art paa Ryggen.

Ved Undersøgelsen vil en sædvanlig god Loupe ikke være tilstrækkelig; de smaa Dyr's fine Former kræve en Forstørrelse af 50—75 Gange for at kunne ses med nogenlunde Lethed.

Af Prof. Thomson er Slægten *Homalota*, som den opfattes af Erichson, Kraatz o. a., delt i et stort Antal mindre Slægter. Denne Deling er benyttet af Dr. Seidlitz i *Fauna Baltica*, medens Dr. Sharp i sin »Revision of the British Species of *Homalota*» væsentlig følger Kraatz.

422. *Insecta* Thoms. — *Aloconota insecta* Thoms., Skand. Col. III. 8; *Aloconota insecta* Thoms. Seidl., Faun. Balt. 417; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 97 — Cat. Col. Eur. III. *Aloconota insecta* Thoms.

Meget sjelden og stedsiden ved Randen af Søer og Aaløb under Opskyl. I Cand. Schlicks Samling findes et Stykke taget ved Fuglevad, Sjælland, et andet er taget af Sparekassedirektør Jakobsen ved Langesø, Silkeborg, under Opskyl; selv har jeg en længere Række fra Kølske Dam i Vendsyssel, sigtet af fugtigt Løv sammen

med graminicola og hygrotopora; samme Steds er den samlet af Student Hoffmeyer. Findetiderne ere i April, Maj og Septbr.

423. *Velox* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 201; *Aloconota velox* Kr. Seidl., Faun. Balt. 417; *Homalota cambrica* Woll. Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 100 — Cat. Col. Eur. III. *Aloconota cambrica* Woll.

Særdeles sjelden. Et Stykke er fundet af Kmrhr. Fabritius-Tengnagel ved Væggeløse paa Falster, April 1892, et andet, uden Oplysninger om Findested, har jeg set i Museets Samling. Den opholder sig som foregaaende paa meget fugtig Bund.

424. *Pavens* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 214; *Aloconota lissonura* Thoms., Skand. Col. III. 9; *Aloconota pavens* Er. Seidl., Faun. Balt. 417; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 98 — Cat. Col. Eur. III. *Aloconota sulcifrons* Stephs.

Meget sjelden og sparsomt, ved Randen af Aaer og Søer under Opskyl. Den er funden ved Lethrabort af Skolebestyrer Jørgensen og Sparekassedirektør Jakobsen under fugtigt Løv og af Forfatteren ved Bredden af Juul Sø, Silkeborg, og Kølske Dam i Vendsyssel. Findetiderne er i April og Maj.

425. *Gregaria* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 215; *Aloconota immunita* Thoms., Skand. Col. III. 10; *Aloconota gregaria* Er. Seidl., Faun. Balt. 417; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 126 — Cat. Col. Eur. III. *Aloconota gregaria* Er.

Overalt paa fugtig Bund, stundom skarevis i Opskyl paa Enge og Kær sammen med *elongatula*. Foraar og Efteraar.

426. *Languida* Gr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 213; *Disopora languida* Thoms., Skand. Col. III. 58; *Disopora languida* Er. Seidl., Faun. Balt., 422; Sharp,

Rev. of the Brit. Hom. 95 — Cat. Col. Eur. III. *Disopora languida* Er.

Saavidt vides er denne Art hidindtil ikke funden udenfor Sjælland, hvor den af flere Samlere: Schlick, Jakobsen, Koch, Holstebro og Hoffmeyer, er taget i Damhusmosen og Frederiksdal i Opskyl; Konsv. Løvendal har den fra Lellinge og Lethrabort. De opgivne Findetider ere i Februar, April, Maj og November.

427. *Silvicola* Fuss. — Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 132; *Liogluta hypnorum* Thoms., Skand. Col. IX. 265; Hom. *hypnorum* Kiesw. (?) Kraatz, Ins. Deutschl. II. 203 — Cat. Col. Eur. III. *Liogluta silvicola* Fuss.

Særdeles sjelden og hidindtil kun fundet i Nærheden af Aalborg, hvor jeg i Skørping Holme har taget tre Stykker til forskellige Tider paa samme Sted i en fugtig Grøft under Løv; et fjerde Stykke, en mørk Varietet, har jeg fra Skovlund i Vendsyssel, sigtet af fugtig Skovbund. Findetiderne ere dels i Maj, dels fra Aug. til Oktbr.

428. *Oblonga* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 205; *Liogluta oblonga* Er. Seidl., Faun. Balt. 424; Hom. *oblongiuscula* (?) Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 130 = *Liogluta microptera* Thoms., Skand. Col. IX. 266 (?). — Cat. Col. Eur. III. *Liogluta oblonga* Er.

Udbredt over hele Landet og ikke sjelden i Opskyl og under Løv paa fugtig Bund; hyppigst i Foraars- og Efteraarsmaanederne.

Oblonga varierer ikke lidet med Hensyn til Tydeligheden af Indtrykkene paa Forryggen, Benenes og Følehornenes mere eller mindre mørke Farve, saavel som Dækvingernes. Derved kunne mange Eksemplarer komme til at stemme overens med *oblongiuscula* Sharp og *microptera* Thoms. Om denne sidste udtaler Dr. Sharp, at den, saavidt han kan dømme efter Thomsons Beskrivelse, vistnok maa være enten hans *oblongiuscula* eller *oblonga*

Er., og angaaende Sharps Art, da stemme mørke Varieteter af oblonga godt overens med den. Formen oblonga Er. har Sharp ikke fundet i England.

429. *Pagana* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 206; *Liogluta arvicola* Thoms., Skand. Col. III. 55; *Liogluta pagana* Er. Seidl., Faun. Balt. 423; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 136 — Cat. Col. Eur. III. *Liogluta pagana* Er.

En anselig Art, der ikke er meget sjelden i Skove, Anlæg og Haver under Løv, Kvas og i Plantemøddinger; en længere Række fandt jeg et Foraar i min Have ved at sigte den gødningsblandede Muld i et Bed; forøvrigt er den taget af de fleste Samlere, men i Reglen kun enkeltvis. Findetiderne ere Maj—Juni og igen fra Septbr. til Slutningen af Aaret.

430. *Granigera* Kiesw. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 207; *Liogluta crassicornis* Thoms., Skand. Col. III. 56; *Liogluta crassicornis* Gyll. Seidl., Faun. Balt. 423; Hom. *crassicornis* Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 135 — Cat. Col. Eur. III. *Liogluta granigera* Kiesw.

Meget sjelden. I Restrup ved Aalborg fandt jeg i Septbr. 91 under en Bunke gammelt Kvas syv Stykker, alle Hunner; et Par Aar senere, Septbr. 93, tog jeg et Par, ♂ og ♀, i Skørping Holme ved at sigte det fjorgamle Løv i en halvtør Grøft. I andres Samlinger har jeg ikke set den.

431. *Vestita* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 208; *Thinobæna quisquiliarum* Thoms., Skand. Col. III. 59; *Thinobæna vestita* Grav. Seidl., Faun. Balt. 423; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 128 — Cat. Col. Eur. III. *Thinobæna vestita* Grav.

Almindelig ved alle vore Kyster under Tang; den er en ægte Strandart, der kan tages dér fra tidlig om Foraaret til sent paa Høsten.

432. *Umbonata* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 209; *Liogluta umbonata* Thoms., Skand. Col. III. 56;

Seidl., Faun. Balt. 424; Hom. vicina Steph. Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 133 — Cat. Col. Eur. III. *Liogluta vicina* Steph.

Den forekommer saavel ved Stranden under Tang som inde i Landet paa fugtig Bund, især i lavtliggende Skove og Krat, men den er sjelden og temmelig stedegen. I Museets Samling findes flere Stykker fra Frederikshavn (Prof. Shiødte); forøvrigt er den taget flere Steder ved Aalborg (Cand. Schlick og Forf.) samt i Dyrehaven og Fortunens Indelukke (O. Jakobsen). Findetiderne ere i April—Maj, Aug. og Septbr.

433. *Nitidula* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 211; *Atheta nitidula* Thoms., Skand. Col. III. 64; *Liogluta nitidula* Kr. Seidl., Faun. Balt. 424; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 129 — Cat. Col. Eur. III. *Liogluta nitidula* Kr.

Udbredt over hele Landet og ikke sjelden i Skov og Krat saavel som paa Mark og Eng; den indfinder sig nu og da ved Form. *fuliginosas* Tuer, hvor den ligesom *Myrmedonia funesta* og *laticollis* kan være til Stede i stort Antal. Foraar og Efteraar, hyppigst i Septbr.

434. *Graminicola* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 212; *Atheta graminicola* Thoms., Skand. Col. III. 62; *Liogluta graminicola* Grav. Seidl., Faun. Balt. 423; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 137 — Cat. Col. Eur. III. *Liogluta graminicola* Grav.

Almindelig paa fugtig Bund over hele Landet, især talrig om Foraaret i Opskyl fra Enge, Aa- og Søbredder; ogsaa i Plantemøddinger i Haver er den taget. Varieteten med brune Dækvinger og lyse Ben (*A. brunnipennis* Th. er sjelden.

435. *Elongatula* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 216; *Atheta elongatula* Thoms., Skand. Col. III. 67; *Metaxya elongatula* Gr. Seidl., Faun. Balt. 430; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 121 — Cat. Col. Eur. III. *Metaxya elongatula* Grav.

Almindelig overalt paa fugtige Steder, især om Foraaret ofte skarevis i Opskyl. Den er taget i saa godt som alle Aarets Maaneder.

436. Gyllenhali Thoms. — *Atheta Gyllenhali* Thoms., Skand. Col. III. 68; Hom. londinensis Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 118.; *Metaxya Gyllenhali* Thoms. = *elongatula* Gr. Seidl., Faun. Balt. 430 — Cat. Col. Eur. III. *Metaxya Gyllenhali* Thoms. = *terminalis* Gyll.

Meget sjelden. Jeg har taget en Række i en Enggrøft ved Skørping Holme samt et enkelt Stykke i Trelde Skov under fugtigt Løv, begge Gange i Maj 1893; Konsv. Løvendal har fundet den ved Gaabense, April 93.

Dr. Seidlitz slaar denne Art sammen med *elongatula*, fra hvilken den dog bestemt skiller sig bl. a. ved Hannens forskelligt formede Kønsmærker, der snarere nærmer den til *luridipennis*.

437. *Luridipennis* Mannh. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 221; *Atheta producta* Thoms., Skand. Col. III. 66; *Pelurga luridipennis* Mannh. Seidl., Faun. Balt. 431; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 117 — Cat. Col. Eur. III. *Pelurga luridipennis* Mannh.

Udbredt paa fugtige Steder, men sjelden og oftest enkeltvis eller i ringe Tal. Den er taget flere Steder i Nordsjælland af københavnske Samlere, ved Nykjøbing F. af Kmrhr. Fabritius-Tengnagel, paa Fyen (Odense?) af Skolebestyrer Jørgensen, i Jylland ved N. Vosborg af Dr. Meinert; ved Frederits og flere Steder omkring Aalborg af Forfatteren. Findetiderne ere i April—Maj og igen i Aug.—Septbr.

438. *Hygrotopora* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 220; *Atheta opacula* Thoms., Skand. Col. IX. 272; *Phryogora hygrobica* Th. Seidl., Faun. Balt. 431 — Cat. Col. Eur. III. *Metaxya hygrotopora* Kr.

Udbredt og ofte i Antal paa skyggefulde meget fugtige Steder i Krat og Skov, ved Randen af Skovdamme og Søer,

i halvtørre Grøfter osv. under og mellem det i Vandet nedfaldne Løv, ogsaa ved Stranden under Tang. Den er funden ved Lethrabort af Konsv. Løvendal, i Grejsdalen i en delvis tørlagt Aa, i Lundby Krat ved Aalborg, ved Kølske Dam i Vendsyssel, samt ved Limfjorden og Ringkjøbing Fjord af Forfatteren. Finde-tiderne ere i Maj, Aug. og Septbr.

439. *Terminalis* Gr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 219; *Atheta grisea* Thoms., Skand. Col. III. 69 — Cat. Col. Eur. III. *Metaxya terminalis* Gr.

Meget sjelden. Jeg har set nogle Stykker fra Damhusmosen (Løvendal og Hoffmeyer), Tjustrup Sø (Dr. Meinert) og Silkeborg (O. Jakobsen). alle tagne om Foraaret.

440. *Volans* Scriba. — Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 122; *Atheta melanocera* Thoms. og *halophila* Thoms., Skand. Col. III. 69 og 71; *Metaxya melanocera* Thoms. Seidl., Faun. Balt. 431 — Cat. Col. Eur. III. *Metaxya melanocera* og *halophila* Thoms.

Udbredt paa al Slags fugtig Bund og paa sine Steder, f. Eks. omkring Aalborg, ligesaa hyppig som *elongatula*. Den er taget i de fleste af Aarets Maaneder, men især om Foraaret og Efteraaret.

Af dens mange Varieteter, der nu og da kunne træffes pletvis sondrede, falde nogle sammen med et Par af Prof. Thomsons Arter, nemlig *melanocera* og *halophila* (Dr. Sharp). Jeg har derfor valgt at opstille den under Navnet *volans* Scriba, skønt Thomsons Artsnavne ere ældre.

441. *Clavipes* Sharp. — Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 124 — Cat. Col. Eur. III. *Metaxya clavipes* Sharp.

Denne ret anselige Homalot, der ifølge Sharp først er funden i de skotske Bjerge, men senere ogsaa i Tyskland og Finland, er ikke meget sjelden i den nordlige Del af Jylland. Jeg har den saaledes fra Lindum,

Skjern Eng, Brønderslev Enge, Kølske Dam og Skørping Holme, alle vegne taget under Løv og i Opskyl; ogsaa fra Københavns Omegn har jeg set en mindre Række samlet i Bøllemosen af Prof. Schiødte. April—Maj og Aug.—Septbr.

442. *Luteipes* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 224; *Dilacra luteipes* Thoms., Skand. Col. III. 32; Seidl., Faun. Balt. 437; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 111 — Cat. Col. Eur. III. *Dilacra luteipes* Er.

Paa Eng- og Mosebund; sjelden. Af Konsv. Løvedal er den funden ved Lethrabort hos Form. *fuliginosa*, i Damhusmosen af Cand. Schlick og Student Hoffmeyer, et Par andre Steder i Nordsjælland af Dr. Meinert, i Kagsmose af Arkitekt Koch; i Jylland er den taget i Opskyl fra Gravlev Enge og ved Kølske Dam af Forfatteren. Findetiderne ere i Foraarsmaanederne og i Septbr.

443. *Littorea* Sharp. — Sharp., Rev. of the Brit. Hom. 109 — Cat. Col. Eur. III. *Metaxya meridionalis* Rey.

En lille Række i Museets Samling er for en Del Aar tilbage funden paa Amagers Øststrand af Prof. Schiødte, et Par Stykker sammesteds eller ved Vordingborg af Dr. Meinert; nyere Fund foreligge ikke.

Denne Art er maaske den samme som den hos Kraatz, Ins. Deutschl. II. 225, beskrevne *meridionalis*; men da Kraatz's Beskrivelse forekom mig at passe mindre godt end Sharps paa de undersøgte Stykker, har jeg foretrukket dennes Navn *littorea*.

444. *Labilis* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 226; *Gnypeta labilis* Thoms., Skand. Col. III. 7; Seidl., Faun. Balt. 417; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 113 — Cat. Col. Eur. III. *Gnypeta carbonaria* Mannh.

Meget hyppig overalt ved Randen af Vandsteder, ved Aaer og Søer, i udtørrede, dyndede, men endnu

fugtige Grøfter o. s. v., oftest i stort Antal. Den er særdeles hurtig i sine Bevægelser; ved hele sit Udseende, sine smidige Bagkropsbevægelser, sin Tilbøjelighed til at færdes i Solskin m. m. minder den meget om Tachyusa-Arter. Den træffes ogsaa næsten al Tid i Selskab med Tachyusa atra. Varieteten med lyse Ben er sjelden. Den er taget i alle Maaneder fra Marts til Oktbr.

445. *Ripicola* Kiesw. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 227; *Gnypeta ripicola* Kiesw. Seidl., Faun. Balt. 417; *Hom. carbonaria* Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 114 — Cat. Col. Eur. III. *Gnypeta cærulea* Sahlb.

I Skolebestyrer Jørgensens Samling (Odense) findes to Stykker af denne særdeles sjeldne Art, desværre uden Oplysninger om Findested eller Tid; ifølge Kraatz og Sharp opholder den sig især paa sandede Aabredder.

446. *Fallax* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 227; *Dilacra fallax* Kr., Seidl. Faun. Balt. 437; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 116 — Cat. Col. Eur. III. *Dilacra fallax* Kr.

Sjelden eller meget sjelden. Dr. Kraatz udtaler om den, at den synes udelukkende at være henvist til Kysten. Dette er dog ikke Tilfældet, idet den her i Landet ogsaa er taget længere inde i Landet paa Engbund. Den foreligger fra følgende Steder: Bremersvold (Engelhart), Københavns Omegn (?) (Cand. Schlick) Gravlev Enge og Aalborg ved Limfjorden (Forf.).

Alle Findetider ere om Foraaret fra Febr. til Maj.

447. *Halobrechta* Sharp. — Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 139; *Halobrechta flavipes* Thoms., Skand. Col. III. 50; Seidl., Faun. Balt. 429 — Cat. Col. Eur. III. *Halobrechta atricilla* Er.

En ægte Strandbille, almindelig ved Englands Kyster og ligeledes funden ved Østersøen i Meklenborg og

Sverrig; hos os synes den at være sjelden. Jeg har kun taget den ved Limfjorden i Nærheden af Aalborg samt enkelt ved Frederikshavn sammen med vestita; i andres Samlinger har jeg ikke set den. Juni og Juli.

448. *Puncticeps* Thoms. — Thoms., Skand. Col. III. 49; Kraatz, Ins. Deutschl. II. 232; Seidl., Faun. Balt. 429; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 140 — Cat. Col. Eur. III. *Halobrechta* algæ Hardy.

Ligesom foregaaende udelukkende henvist til Kysten. Den er hos os mere almindelig end hin, men ikke overalt lige talrig. I større Antal har jeg fundet den paa Skagens Nordspids under opkastet Tang, mere enkeltvis ved Limfjorden sammen med foregaaende. Forøvrigt har jeg set den fra Tidsvilde (Løvendal), Kysten ved Sundet (Prof. Schiödte), Nyraad (Engelhart) og Gjedser Odde (Kmrhr. Fabr.-Tengnagel). Findetiderne ere fra Juni til Septbr.

449. *Occulta* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 233; *Bessobia occulta* Thoms., Skand. Col. III. 43; Seidl., Faun. Balt. 428; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 143 — Cat. Col. Eur. III. *Bessobia occulta* Er.

Sjelden og stedege, i Svampe og ved raadne Plantedele. Den er funden ved Kjøbenhavn og i Dyrehaven (Cand. Schlick), i Nordsjælland (Dr. Bergsøe), ved Nykjøbing F. og Thisted (Kmrhr. Fabr.-Tengnagel), ved Brønderslev (Hoffmeyer) og i Restrup ved Aalborg i en Plantemødding (Forf.), hver Gang om Efteraaret i Oktbr.—Nvbr.

450. *Monticola* Thoms. — *Bessobia monticola* Thoms., Skand. Col. III. 43; Kraatz, Ins. Deutschl. II. 234; Seidl., Faun. Balt. p. 428; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 147 — Cat. Col. Eur. III. *Bessobia monticola* Thoms.

Meget sjelden. I Museets Samling har jeg set to Stykker, det ene med Lokalitetsmærke for Vordingborg (?),

det andet taget af Arktk. Koch i Oktbr. 1875, uden Oplysning om Stedet; en lille Række er funden af Cand. Schlick d. 27 Aug. 1874 i Nordsjælland (?), og endelig ejer jeg selv en ♀, men uden Oplysninger. Den lever i Svampe.

451. *Incana* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 236; *Alianta incana* Thoms., Skand. Col. III. 44; Seidl., Faun. Balt. 429; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 150 — Cat. Col. Eur. III. *Alianta incana* Er.

Stedegen og i det Hele sjelden. Den lever i Bladskederne af forskellige Vandplanter, f. Eks. Dunhammer, Tagrør og Pindsvineknop, og kan derfor findes ved Søer og Moser, hvor disse Planter vokse. I størst Antal er den af flere Samlere taget i Nordsjælland, f. Eks. i Bøllemosen, Damhusmosen og Vejlemose; paa Nykjøbing Eng (F.) er den funden af Kmrhr. Fabritius-Tengnagel, og i Gravlev Enge ved Aalborg af Forfatteren. Alle opgivne Findetider ere i Jan., Marts og April.

452. *Nigella* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 237; *Dinaræa punctiventris* Thoms., Skand. Col. II. 292; *Dinaræa nigella* Er. Seidl., Faun. Balt. 418; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 151 — Cat. Col. Eur. III. *Dinaræa nigella* Er.

Ligesom foregaaende i Enge og Moser, ved Aa- og Søbredder i Opskyl af Rør og Vandplanter, sjelden og oftest i ringe Tal. Den er taget paa Sjælland ved Søborg Sø (Jørgensen), Lyngby Mose (Schlick), Furesø, Damhusmosen, Strandmølleaa (Prof. Schiödte), Vejlemose (Koch) samt i Gravlev Enge ved Aalborg (Forf.). De fleste Findetider ere i Febr., Marts og April, umodne Eksemplarer ere tagne i Aug.

453. *Æquata* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 238; *Dinaræa æquata* Thoms., Skand. Col. II. 290; Seidl., Faun. Balt. 418; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 152 — Cat. Col. Eur. III. *Dinaræa æquata* Er.

I Skovegne under Bark paa Stubbe af Løv- og Naaletrær, ikke sjelden. Foraar og Efteraar.

454. *Angustula* Gyll. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 238; *Dinaræa angustula* Thoms., Skand. Col. II. 290; Seidl., Faun. Balt. 418; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 153 — Cat. Col. Eur. III. *Dinaræa angustula* Gyll.

Udbredt paa Eng- og Kærbund og ikke sjelden. Den faas lettest i Sigtegods fra de Steder, hvor den forekommer, og er taget saavel om Foraaret som i Aug.—Septbr.

455. *Linearis* Gr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 240; *Dinaræa linearis* Thoms., Skand. Col. II. 291; Seidl., Faun. Balt. 418; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 154 — Cat. Col. Eur. III. *Dinaræa linearis* Gr.

Ligesom *æquata* lever *linearis* under Bark paa Stubbe saavel af Løvtrær som Naaletrær, især saadanne, der ere bevoksede med Svampe; sjeldnere er den sigtet af Skovbundens Løv. Den er i Reglen taget enkeltvis eller i ringe Tal, men er dog i det Hele ikke sjelden. Foraar og Efteraar.

456. *Pilosa* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 241; *Atheta pilicornis* Thoms., Skand. Col. III. 82; *Mycota pilicornis* Th.; Seidl., Faun. Balt. 433; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 155 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta pilicornis* Th.

I Skove og Krat i Svampe, især saadanne, der vokse paa Stubbe, udbredt og taget af de fleste Samlere, dog oftest kun i ringe Tal; en længere Række har jeg en Gang fundet i Lundbykrat i Selskab med *linearis*, begge Arter i kraftige, meget udprægede Eksemplarer. Den er taget i alle Maaneder fra Marts til Nvbr., undtagen i Juli, hyppigst i Septbr. — Oktbr.

457. *Debilis* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 243; *Atheta debilis* Thoms., Skand. Col. III. 72; *Hygroecia debilis* Er. Seidl., Faun. Balt. 450; Sharp, Rev. of

the Brit. Hom. 157 — Cat. Col. Eur. III. *Hygroecia debilis* Er.

Paa Enge, i Kær og ved Strand, udbredt, men sparsomt og temmelig sjelden. Den er funden ved Ladegaardsaa, Kjøbenhavn (Prof. Schiödt og Arktkt. Koch), i Lyngby Mose og Damhus Mose (O. Jakobsen), paa Fyen ved Odense(?) (Jørgensen), i Jylland i Opskyl fra Skjern Enge, Gravlev Enge, Skørping Holme og Kølske Dam (Forf.). April og Septbr.

458. *Magniceps* J. Sahlb. — *Hygroecia magniceps* J. Sahlb. Seidl., Faun. Balt. 430 — Cat. Col. Eur. III. *Hygroecia magniceps* J. Sahlb.

Fire Stykker, der sandsynligvis høre til denne Art, har jeg i Juli 1892 fundet under Tang ved Limfjorden; da jeg ikke har nogen udførligere Beskrivelse af *magniceps* for Haanden, anser jeg dog Bestemmelsen for noget tvivlsom.

459. *Deformis* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 244; *Hydrosmeeta deformis* Kr. Seidl., Faun. Balt. 419; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 159 — Cat. Col. Eur. III. *Hygroecia complana* Mannh.

I Maj 1892 sigtede jeg i min Have i et skyggefuldt Hjørne med Planteaffald et enkelt Stykke; i andres Samlinger har jeg ikke set den.

460. *Splendens* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 246; *Aleuonota splendens* Kr. Seidl., Faun. Balt. 422; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 163 — Cat. Col. Eur. III. *Aleuonota splendens* Kr.

Der foreligger kun et enkelt noget defekt Stykke i i min Samling uden Oplysning; saavidt jeg véd, hidrører det fra en Lollandsrejse i 1878.

461. *Immersa* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 252; *Dadobia planicollis* Thoms., Skand. Col. II. 287; *Thectura immersa* Er. Seidl., Faun. Balt. 421; Sharp,

Rev. of the Brit. Hom. 165 — Cat. Col. Eur. III. *Dadobia immersa* Er.

Under Bark paa ikke helt tørre Stubbe og Stammer af Løv- og Naaletrær, udbredt, men ikke hyppig.

Den er funden i Nordsjællands Skove af Prof. Schiødte, i Trelde Skov under Bøgebark, i Lindum under Granbark og i Skørping Holme under Egebark af Forfatteren. Maj—Juni.

462. *Cuspidata* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 253; *Thectura cuspidata* Thoms., Skand. Col. II. 286; Seidl., Faun. Balt. 421; Skarp, Rev. of the Brit. Hom. 168 — Cat. Col. Eur. III. *Thectura cuspidata* Er.

Ligesom foregaaende under Barken af Løv- og Naaletræsstubbe, men hyppigere end denne og stundom i Antal; den er taget af de fleste Samlere, oftest i Forarsmaanederne, men ogsaa i Septbr.

Denne og den foregaaende Arts ringe Størrelse og flade Form, der gør det let for dem at skjule sig i Vedets Revner og Ujevnheder eller i Gnavsmuld, har vistnok ofte været Aarsag i, at de ere undgaaede Samlernes Opmærksomhed. De faas lettest ved med en blød Børste at stryge alt Gnavsmuld mellem Bark og Ved ned paa Sigtekluden og derefter undersøge dette ved Hjælp af en fin Sigte.

En med *immersa* og *cuspidata* i Levevis beslægtet og karakteristisk Art er *plana* Gyll. Den opholder sig som disse under Træbark, men er ikke hidindtil funden i Danmark. Da den imidlertid forekommer saavel i Nordtyskland som i det sydlige Sverrig, er der Sandsynlighed for, at den ogsaa vil kunne findes hos os. I England skal den være ret almindelig under Bark paa Elimestubbe (Sharp), i Sverrig »sålsynt och ändast under barken af barträd« (Thoms.)

463. *Gemina* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 255; *Atheta gemina* Thoms., Skand. Ins. 50; *Metaxya* ge-

mina Er. Seidl., Faun. Balt. 431; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 172 — Cat. Col. Eur. III. *Metaxya gemina* Er.

Sjelden og sparsomt paa Eng- og Kærbund. I Skolebestyrer Jørgensens Samling findes et enkelt Stykke fra Fyen; forøvrigt er den taget i Gravlev Enge, i Opskyl fra Ryaa ved Brønderslev og under fugtigt Løv i Skovlund nord for Aalborg, hver Gang enkeltvis. Findetiderne ere i April og Nvbr.

464. *Curtipennis* Sharp. — Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 173 — Cat. Col. Eur. III. *Metaxya curtipennis* Sharp.

Jeg har to Stykker, som utvivlsomt maa henføres til denne Art, fundne ved Sigtning af Muld og visne Plantedele ved et udtørret Vandsted i Skørping Skov, Mai 1892. Den ligner *gemina*, men har kortere Dækvinger og Følehorn.

465. *Analisis* Gr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 256; *Amischa analisis*, Thoms., Skand. Col. II. 293; Seidl., Faun. Balt. 419; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 175 — Cat. Col. Eur. III. *Amischa analisis* Gr.

Meget almindelig overalt paa enhver Slags Bund og ofte skarevis i Sigtegods; den forekommer ogsaa i og ved Myretuer. Den er taget til enhver Tid paa Aaret.

466. *Cavifrons* Sharp. — Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 177; Seidl., Faun. Balt. 419 — Cat. Col. Eur. III. *Amischa cavifrons* Sharp.

Sammen med *analysis*, hvilken den meget ligner, og i Samlingerne sammenblandet med denne; den foreligger fra de forskellige Landsdele og synes ikke at være sjelden. Findetiderne ere spredte over Foraars- og Efteraarsmaanederne.

467. *Soror* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 257; Seidl., Faun. Balt. 419; Sharp Rev., of the Brit. Hom. 178 — Cat. Col. Eur. III. *Amischa soror* Kr.

To Stykker i Cand. Schlichs Samling uden Oplysninger.

468. *Vilis* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 257; *Atheta vilis* Thoms., Skand. Ins. I. 50; *Dilacra vilis* Er. Seidl., Faun. Balt. 437; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 174 — Cat. Col. Eur. III. *Metaxya vilis* Er.

I Museets Samling findes et Stykke med Lokalitetsmærke for Roskilde og med Paategning af Prof. Schiødte(?) Det er fundet i en »*Carex-Mose*«. Bestemmelsen er noget tvivlsom.

469. *Palleola* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 259; *Hilara palleola* Er. Seidl., Faun. Balt. 434; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 181 — Cat. Col. Eur. III. *Hilara palleola* Er.

Meget sjelden og enkeltvis i Svampe. Jeg har den fra Restrup, Lundby Krat, Skovlund og Frederits; forøvrigt har jeg kun set et Stykke fra Holte i Nordsjælland (Hoffmeyer). April, Oktbr.—Nvbr.

470. *Exilis* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 260; *Aleuonota exilis* Thoms., Skand. Col. III. 54; *Meotica exilis* Er.; Seidl., Faun. Balt. 419; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 180 — Cat. Col. Eur. III. *Meotica exilis* Er.

Udbredt og ikke sjelden i Kær, Enge og paa fugtig Skovbund, stundom i Antal; den er taget af de fleste Samlere, enkelte Gange i Myretuer. Foraar og Efteraar.

471. *Pallens* Redt. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 261; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 181 — Cat. Col. Eur. III. *Meotica indocilis* Heer.

Meget sjelden; hidindtil kun funden i Dyrehaven af Konsv. Løvendal, i Rosenborg Have af Prof. Schiødte og ved Nykjøbing. F. af Kmrhr. Fabr. Tengnagel. April og Maj.

472. *Parallela* Mannh. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 262; *Amidobia parallela* Thoms., Skand. Col. II. 295; *Amidobia talpa* Heer Seidl., Faun. Balt. 420; Skarp,

Rev. of the Brit. Hom. 183 — Cat. Col. Eur. III. *Amidobia talpa* Heer.

En ægte *Myrmecophil*, der kun forekommer i Tuerne hos *Form. rufa* (og *pratensis*?) undertiden i meget stort Antal. Den er funden af Prof. Schiødte, Dr. Meinert, Cand. Schlick og Arktk. Koch i Nordsjælland, af Skolebestyrer Jørgensen ved Odense, af Forfatteren ved Skørping og Skovlund, Aalborg. De fleste Findetider ere om Foraaret, enkelte i Oktbr.

473. *Flavipes* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 263; *Notothecta flavipes* Thoms., Skand. Col. III. 107; Seidl., Faun. Balt. 420; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 233 — Cat. Col. Eur. III. *Notothecta flavipes* Gr.

I Tuerne hos *Form. rufa*, udbredt over hele Landet og taget af de fleste Samlere, ofte i Antal, i Foraars- og Efteraarsmaanederne.

474. *Confusa* Mrkl. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 264; *Notothecta confusa* Thoms., Skand. Col. III. 107; Seidl., Faun. Balt. 420; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 234 — Cat. Col. Eur. III. *Notothecta confusa* Mrkl.

Udelukkende (?) hos *Form. fuliginosa*, men sjelden. Den er funden ved Donse af Sparekassedirektør O. Jakobsen og ved Lyngby Sø, Brede, Stenholtsvang, Ruderhegn af Konsv. Løvendal. I begge de nævnte Herrers Samlinger findes Stykker, der have Vedtegning om at være funden hos *Form. rufa*; men da Oplysninger anden Steds fra gaa ud paa, at den kun er Gæst hos *Form. fuliginosa*, anbefales Sagen til nøjere Undersøgelse. Findetiderne ere alle i Marts, April og Maj.

475. *Anceps* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 264; *Lyprocorrhe anceps* Thoms., Skand. Col. III. 108; Seidl., Faun. Balt. 421; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 232 — Cat. Col. Eur. III. *Lyprocorrhe anceps* Er.

Som de nærmest foregaaende en afgjort *Myreven*, hyppigst hos *Form. rufa* og i Reglen i stort Antal,

sjældnere hos *Form. fuliginosa*. Den er udbredt overalt og er taget af saa godt som alle Samlere. Foraar og Efteraar afgive de fleste Findetider, men den kan forøvrigt tages hele Sommeren igennem.

476. *Brunnea F.* — Kraatz, *Ins. Deutschl.* II. 265; *Plataræa brunnea* Thoms., *Skand. Col.* III. 46; *Seidl. Faun. Balt.* 422; Sharp, *Rev. of the Brit. Hom.* 184 — *Cat. Col. Eur.* III. *Plataræa brunnea F.*

En anselig og let kendelig Art; ikke sjelden paa Øerne ved Bredden af Aaer og Søer og paa anden fugtig Bund i Opskyl og der taget af de fleste Samlere; i det nordlige Jylland synes den derimod at være meget sparsomt til Stede, idet kun to Stykker foreligge, det ene fra Thisted (Kmrhr. Fabr.-Tengnagel) det andet fra Restrup Krat (Forf.). Findetiderne strække sig fra Maj til Oktbr.

Dr. Sharp antager, at *Hom. depressa* Er, der ogsaa af Thomson opstilles som en egen Art, er en Varietet af *brunnea*; Dr. Kraatz mener det samme. Den er ikke endnu funden hos os.

477. *Aquatica* Thoms. — *Atheta aquatica* Thoms., *Skand. Col.* III. 65; *Homalota subænea* Sharp, *Rev. of the Brit. Hom.* 187 — *Cat. Col. Eur.* III. *Atheta aquatica* Thoms.

Ligeledes en anselig Art; den søger Ophold paa meget fugtige Steder. Jeg har taget den ved Ravn-Kilde (Gravlev Enge), hvor jeg sigtede den ud af det vaade Kildemos og andre Planter, som voksede i selve Kilden; ved Svejlbæk (Silkeborg) fandtes den mellem opskyllede Planter ved Bredden af Jul Sø, i Skørping Holme og Vang Skov under Løv i vaade Grøfter; i andres Samlinger har jeg ikke set den. Findetiderne ere i Maj og Juli; i Maj samledes kraftige overvintrede Expl., i Juli paa samme Sted kun enkelte umodne Stykker.

478 *Incognita* Sharp. — Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 191; *Atheta incognita* Sharp. Seidl., Faun. Balt. 434 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta incognita* Sharp.

Fra Restrup Krat ved Aalborg har jeg to Stykker tagne i Svamp, Maj 1890.

479. *Merdaria* Thoms. — *Atheta merdaria* Thoms., Skand. Col. III. 81; Seidl., Faun. Balt. 434; Hom. merdaria Thoms. Kraatz, Ins. Deutschl. II. 269; Hom. xanthoptera Steph. Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 189 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta castanoptera* Mannh.

Udbredt overalt i Skove, Krat og Anlæg og hyppig især om Efteraaret i halvforraadnede Svampe og ved muldnende Plantedele; ogsaa ved Aadsel er den funden, sjeldnere ved Myretuer (Arktkt. Koch).

480. *Validicornis* Mrkl. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 271; *Atheta succicola* Thoms., Skand. Col. III. 78; *Atheta validicornis* Mrkl. Seidl., Faun. Balt. 434; *Homalota succicola* Th. Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 193 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta euryptera* Steph.

Ved udflydende Træsæft især paa Stammer og Stubbe af Eg. Den synes at være ret sjelden, idet den kun foreligger fra faa Steder, saaledes Hunderup paa Fyn (Jørgensen), Livø i Limfjorden, Hals Nørreskov og Lindum (Forf.). Findetiderne ere i Maj og Juni.

481. *Trinotata* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 272; *Atheta socialis* Thoms., Skand. Col. III. 76; *Mycota socialis* Payk. Seidl., Faun. Balt. 433 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta trinotata* Kr.

Overalt og hyppig ved alle Slags muldnende og raadnende Planteemner, især talrig i gammelt Hø og Halm; den træffes hele Aaret igennem; navnlig fra Maj til Septbr.

482. *Fungicola* Thoms. — *Atheta fungicola* Thoms. Skand. Col. III. 76; Kraatz, Ins. Deutschl. II. 274; *Mycota*

fungicola Thoms. Seidl., Faun. Balt. 433; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 199 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta nitidicollis* Fairm.

Meget almindelig overalt i Skove, Krat og Anlæg i Svampe, især hyppig om Efteraaret, men forøvrigt funden i alle Maaneder med Undtagelse af Jan. og Juli. Den varierer en Del i Størrelse og Farve.

483. Nov. sp.? — Oftest sammen med *fungicola* og i Samlingerne blandet med denne findes en meget nærtstaaende Form, der muligvis er en egen Art. Dens Han er vanskelig eller ikke til at skille fra *fungicolas* Han, men Hunnen har særegne og bestemte Kønsmærker, idet syvende Bagkropsleds Dorsalplade er svagt og bredt udrandet, men Ventralpladen temmelig dybt og skarpere, medens *fungicolas* Hun har de tilsvarende Plader rundede uden Spor af Udbugtning. Den synes ikke at være meget sjelden, idet den er funden saavel paa Sjælland (Museets Samling) og Lolland (Kmrhr. Fabr.-Tengnagel) som flere Steder i Jylland, saaledes Stendalsgaards Plantage (O. Jakobsen), Vejle, Lindum, Hobro og Restrup (Forf.), kun sidstnævnte Sted uden Iblanding af *fungicola*. Ogsaa i England er den bemærket (Dr. Sharp).

484. *Ignobilis* Sharp. — Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 200 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta nitidicollis* Fairm.

Ligesom *fungicola*, hvilken den meget ligner, om Efteraaret i Svampe, ofte i Selskab med den. Den er samlet i Charlottenlund (Prof. Schiödte) samt i Skovene nord og syd for Aalborg, hvor den er temmelig hyppig (Forf.).

485. *Sublinearis* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 275; *Atheta xanthopus* Thoms., Skand. Col. III. 77; *Mycota xanthopus* Th. Seidl., Faun. Balt. 433 ; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 196 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta xanthopus* Thoms.

Sjelden og enkeltvis. Den er funden i Dyrehaven af Konsv. Løvendal, ved Odense af Skolebestyrer Jørgensen i Boletussvampe og af Forfatteren i Lundby Krat og Skørping Skov i Svampe, ved Aalborg i Gnavsmuldet i de af Cossuslarver angrebne Popler, samt i Lindum i Fugleekskremitter. Findetiderne sprede sig over hele Sommeren fra April til Oktbr.

486. *Nigritula* Gyll. — *Atheta nigritula* Thoms., Skand. Col. III. 80; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 203; *Tetropla erythrocerata* Heer. Seidl., Faun. Balt. 432 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta liturata* Steph.

En lille Række findes i Museets Samling og er taget paa Bornholm af Prof. Schiødte i »*Polyporus fraxini*.«

487. *Humeralis* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 278; *Atheta pallidicornis* Thoms., Skand. Col. III. 85; *Mycota pallidicornis* Thoms. Seidl., Faun. Balt. 433 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta pallidicornis* Thoms.

Meget sjelden i Svampe paa Træstød; jeg har faa Stykker, fundne dels i Hals Nørreskov i Juni 1892, dels i Trelde Skov ved Frederits i Maj 1893; i andres Samlinger har jeg ikke set den.

488. *Sodalis* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 279; *Atheta sodalis* Thoms., Skand. Col. III. 84; *Mycota sodalis* Er. Seidl., Faun. Balt. 433; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 205 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta sodalis* Er.

Udbredt, men ikke overalt hyppig. Den findes i Svampe, i hule Trær, under Løv o. s. v., ogsaa i Myretuer er den funden. Foraar og Efteraar.

489. *Nigricornis* Thoms. — *Atheta nigricornis* Thoms., Skand. Col. III. 86; Kraatz, Ins. Deutschl. II. 281; *Traumoecia nigricornis* Thoms. Seidl., Faun. Balt. 430; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 209 — Cat. Col. Eur. III. *Traumoecia nigricornis* Thoms.

Som det synes sjelden eller meget sjelden, idet den kun er taget faa Gange. I Cand. Schlicks Samling fin-

des et enkelt Stykke af ældre Dato ($5\frac{1}{4}$ 74); forøvrigt er den kun funden i Lindum Skov i Fugleekskremitter under en Fuglerede i et hult Træ, samt ved Aalborg i Gnavsmuldet i de af Cossuslarven angrebne og saftflydende Popler (Forf.); det sidstnævnte Sted fandtes den i stort Antal, og jeg antager, at den ved nærmere Undersøgelse vil vise sig udbredt i saadanne Trær hele Landet over.

Ved Cossuslarvens voldsomme og graadige Angreb paa Popler, Pil og Elm fremkommer der i Reglen store Mængder af Gnavsmuld og Ekskremitter. Disse blande sig med den af Saarene udflydende Saft til en syrlig, gærende Masse, som ved sin kraftige Duft, ved den Varme, der udvikles ved Gæringen, og den rigelige Næring, den frembyder, hidlokker mangfoldige Insekter af forskellig Art. Det anbefales Samlere at tage saadanne gærende Masser med hjem for dér omhyggeligt at undersøge deres Indhold eller bruge dem til Udclækning af de mange Larver, der som oftest findes deri.

Her vil i Reglen *nigricornis* og *vistnok* ogsaa dens Larve være at finde.

490. *Divisa* Mrkl. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 279; *Atheta aridula* Thoms., Skand. Col. III. 75; *Traumoezia divisa* Mrkl. Seidl., Faun. Balt. 430; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 208 — Cat. Col. Eur. III. *Traumoezia divisa* Mrkl.

Sjelden og sparsom. Den lever paa fugtig Bund og er taget af Dr. Meinert i Ruderhegn, af Sparekassedrakt. Jakobsen ved Randers og af Forfatteren i Skørping Holme og Hvorup ved Aalborg. Findetiderne ere i Juni, Aug. og Septbr.

491. *Gagatina Baudi*. — *Tetropla gagatina Baudi*. Seidl., Faun. Balt. 432; Hom. *variabilis* Kraatz, Ins. Deutschl. II. 284; *Atheta compressicollis* Thoms., Skand.

Col. III. 85; Hom. *gagatina* Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 206 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta gagatina* Baudi.

I Svampe og ved udflydende Træsæft, udbredt og ikke meget sjelden, ofte i stort Antal. Den er taget flere Steder i Nordsjælland af Prof. Schiødte, Konsv. Løvendal, Cand. Schlick o. fl.; i Jylland er den samlet af Forfatteren i Lundby Krat, Skørping og Lindum. Den varierer en Del saavel i Størrelse og Farve som med Hensyn til Udviklingen af Hannens Kønsmærker. Finde-tiderne ere i Juni—Septbr.

492. *Myrmecobia* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 285; *Atheta myrmecobia* Thoms., Skand. Ins. 51; *Xenota myrmecobia* Kr. Seidl., Faun. Balt. 431 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta myrmecobia* Kr.

I Tuerne hos Form. *rufa*, sjelden og oftest i ringe Antal. Den er taget af Prof. Schiødte, Dr. Meinert og Konsv. Løvendal i Ruderhegn og andre Steder i Nordsjælland, af Skolebestyrer Jørgensen ved Odense, af Lærer Andersen ved Haderslev og flere Steder i Nordslesvig og af Forfatteren ved Aalborg. Marts, Maj og Aug.

493. *Atrata* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 285; *Dochmonota funebris* Thoms., Skand. Col. III. 99; *Dochmonota clancula* Er. Seidl., Faun. Balt. 437 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta clancula* Er.

Meget sjelden under Løv paa fugtig Skovbund, fundet ved Donse og i Ravnsnæs Skov af Arktk. Koch i Marts og April; i Cand. Schlicks Samling findes en mindre Række uden nærmere Oplysninger.

494. *Nigra* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 287; *Atheta zosteræ* Thoms., Skand. Col. III. 90; *Datomicra zosteræ* Thoms. Seidl., Faun. Balt. 436; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 234 — Cat. Col. Eur. III. *Microdota zosteræ* Thoms.

Overalt almindelig i raadnende Planteemner til de

fleste Tider af Aaret, især hyppig Foraar og Efteraar i Plantemøddinger.

495. *Hodierna* Sharp. — Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 236 — Cat. Col. Eur. III. *Microdota hodierna* Sharp = *zosteræ* Thoms. = *nigra* Kr.

Et Par Stykker af denne Art har jeg taget sammen med *nigra* i en Bunke fugtigt og muldnende Hø ved Limfjorden, Aug. 93, en mindre Række er funden af Prof. Schiødte ved Damhus Søen, København. Saavel i Cat. Col. Eur. som hos Dr. Seidlitz i Faun. Balt. er den opført som Synonym til *nigra* Kr.; den adskiller sig imidlertid fra dennes typiske Form ved, at den er større, forholdsvis bredere, ved længere Følehorn, lysere Dækvinger og Ben.

496. *Celata* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 320; *Atheta dadopora* Thoms., Skand. Ins. 52; *Datomicra celata* Er. Seidl., Faun. Balt. 436; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 237 — Cat. Col. Eur. III. *Microdota celata* Er.

Sjelden. Den forekommer i Svampe, ved Træsæft, i Mulden under Aadsel saa vel som ved raadnende Planter. Jeg har taget den nogle Gange i Restrup og Lundby Krat ved Aalborg, samt i Lindum Skov; forøvrigt har jeg kun set et enkelt Stykke i Sparekassedrkt. Jakobsens Samling, Randers. Den er funden i Juni, Juli og Oktober.

497. *Canescens* Sharp. — Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 239; *Atheta canescens* Thoms., Skand. Ins. 52 — Cat. Col. Eur. III. *Microdota canescens* Sharp.

Som foregaaende sjelden eller meget sjelden. Jeg har fundet den ved Fugleekskrementer i Lindum og i Skørping Holme under Aadsel; fire Stykker findes i Mu-seets Samling, tagne i Boserup i Svampe af Prof. Schiødte. Maj, Juli og Oktbr.

498. *Sordidula* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 296; *Atheta sordidula* Thoms., Skand. Col. III. 91; Dato-

micra sordidula Er. Seidl., Faun. Balt. 435; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 238 — Cat. Col. Eur. III. *Microdota sordidula* Er.

Udbredt og ikke meget sjelden i Gødning, raadnende Planteemner og i Mulden under Aadsel. Den er funden af Prof. Schiødte, Arkitekt Koch ved Riserup, Konsv. Løvendal ved Lethrabort, Cand. Schlick i Nord-sjælland, Skolebestyrer Jørgensen ved Odense samt af Forf. ved Trelde, Skørping Holme og Aalborg. Findetiderne ere især i Maj, enkelte i Oktbr.

499. *Cinnamomea* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 289; *Thamiaræa cinnamomea* Thoms., Skand. Col. III. 60; Seidl., Faun. Balt. 429; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 216 — Cat. Col. Eur. III. *Thamiaræa cinnamomea* Grav.

En af vore største Homaloter og, som det synes, tillige en af de sjeldneste, idet den kun er taget faa Gange. I Museets Samling findes to Stykker af ældre Dato uden Oplysning om Findestedet; af Konsv. Løvendal er den taget enkelt i Lindum ved Træsøft, Juni 1887; forøvrigt er den kun funden ved Aalborg i de af Cossus-larven angrebne Popler, i betydeligt Antal og i Selskab med *nigricornis* og andre Homaloter, Aug. og Septbr. 1893. I saadanne angrebne Trær, der ikke ere sjeldne langs Landevejene, især i Nærheden af Byer, turde den maaske ved nærmere Undersøgelse vise sig at være mere udbredt og hyppig end hidindtil erfaret.

En nærstaaende Art, *hospita* Mærkel, der endnu ikke er funden her i Landet, skal, ifølge Sharp, ofte træffes sammen med *cinnamomea* især i saadanne saftflydende Trær, der tillige ere beboede af *Form. fuliginosa*.

500. *Scapularis* Sahlb. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 291; *Alaobia scapularis* Thoms., Skand. Col. III. 100;

Seidl., Faun. Balt. 423; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 218 — Cat. Col. Eur. III. *Alaobia scapularis* Sahlb.

Meget sjelden og sparsomt. Den kendes her i Landet fra Sjælland, hvor den er funden af Prof. Schiødte, Dr. Bergsøe, af Arkitekt Koch i Ermelund og Dyrehaven, sidstnævnte Sted hos Form. rufa, og af Konsv. Løvendal paa en Tømmerplads i København under Birkebark, samt fra Lolland (Cand. Schlick). De opgivne Findetider ere alle i Maj.

501. *Dilaticornis*. Kr. -- Kraatz, Ins. Deutschl. II. 293; *Ceritaxa dilaticornis* Kr. Seidl., Faun. Balt. 435; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 220 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta dilaticornis* Kr.

To Stykker (♀♀) med Lokalitetsmærke for Roskilde og Omegn findes i Museets Samling (Prof. Schiødte); et Par andre, om hvilke jeg ikke har faat nogen Oplysning, ere fundne af Cand. Schlick.

502. *Autumnalis* Sharp. — Rev. of the Brit. Hom. 224 — Cat. Col. Eur. III. *Atheta basicornis* Rey.

Jeg har i min Samling et Stykke, ♀, der passer godt med Sharps Beskrivelse. Det er overladt mig af en yngre Samler og saavidt vides fundet i Nordsjælland i Svamp.

503. *Sericea* Muls. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 295; *Atheta sericea* Thoms., Skand. Col. III. 89; *Microdota sericea* Muls. Seidl., Faun. Balt. 435; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 225 — Cat. Col. Eur. III. *Microdota amicula* Steph.

Udbredt og ikke sjelden. Den opholder sig i Plantemøddinger, ved Træsæft, Svampe osv. I Nordsjælland er den samlet af Prof. Schiødte og Cand. Schlick, paa Fyen af Skolebestyrer Jørgensen, i Nordjylland ved Aalborg, Skørping, Restrup, Skagen af Forf.; talrigst har jeg fundet den i Gnavsmuldet fra

Cossuslarvens Gange i Popler. De fleste Findetider ere om Efteraaret i Aug.—Septbr., faa i Maj.

504. *Indubia* Sharp. — Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 227 — Cat. Col. Eur. III. *Microdota indubia* Sharp.

Et enkelt Stykke (♂) fra Nordsjælland, overladt mig af en ung Samler, er det eneste, jeg har set af denne Art.

505. *Subtilis* Scriba. — Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 226 — Cat. Col. Eur. III. *Microdota subtilis* Scriba.

Funden ved Svampe i Skørping og ved Fuglekskrementer i Lindum, Aug. og Septbr. 1893 (Forf.).

506. *Inquinula* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 297; *Microdota inquinula* Er. Seidl., Faun. Balt. 435; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 231 — Cat. Col. Eur. III. *Microdota inquinula* Er.

Skolebestyrer Jørgensen har fundet nogle Stykker ved Odense, Aug. 1893, Prof. Schiødte et enkelt ved Ry.

507. *Marcida* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 298; *Dimetrota marcida* Er. Seidl., Faun. Balt. 436; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 240 — Cat. Col. Eur. III. *Dimetrota marcida* Er.

Sjelden. Den træffes i Svampe om Efteraaret, nu og da i Antal, og er samlet af Prof. Schiødte og Konsv. Løvendal i Dyrehaven, af Sparekassedirektør Jakobsen ved Randers og af Forf. i Lindum, Skørping og Lundby Krat ved Aalborg.

508. *Intermedia* Thoms. — *Atheta intermedia* Thoms., Skand. Col. III. 95; Kraatz, Ins. Deutschl. II. 301; *Dimetrota intermedia* Thoms. Seidl., Faun. Balt. 436; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 242 — Cat. Col. Eur. III. *Dimetrota intermedia* Thoms.

Meget sjelden. Jeg har set et Stykke fra Jægers-

borg paa Sjælland og selv taget to Stykker ved Kølske Dam i Vendsyssel, sigtet af fugtigt Løv, Septbr. 1893.

509. *Longicornis* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 301; *Atheta longicornis* Thoms., Skand. Col. III. 95; *Chætida longicornis* Grav. Seidl., Faun. Balt. 435; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 243 — Cat. Col. Eur. III. *Dimetrota longicornis* Grav.

Almindelig overalt i Gødning, raadne Planteemner samt ved Aadsel. Den er taget til enhver Aarstid, hyppigst om Foraaret og Efteraaret.

510. *Macrocera* Thoms. — *Atheta macrocera* Thoms., Skand. Col. III. 96; *Chætida macrocera* Thoms. Seidl., Faun. Balt. 435; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 244 — Cat. Col. Eur. III. *Dimetrota macrocera* Thoms.

Den forekommer i Gødning, raadnende Planter og ved Træsæft og er funden af Prof. Schiødte paa Sjælland (?) samt af Forf. i Skørping, Lindum og Hvorup. Juni og Juli.

511. *Cadaverina* Bris. — *Dimetrota cadaverina* Bris. Seidl., Faun. Balt. 436; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 245 — Cat. Col. Eur. III. *Dimetrota cadaverina* Bris.

I Svampe, Plantemøddinger og Ekskrementer, men sjelden og oftest i ringe Antal. I Museets Samling findes to Stykker fra Københavns Omegn (?), forøvrigt er den kun taget af Skolebestyrer Jørgensen ved Odense og af Forfatteren ved Aalborg, i Skørping, Restrup og Vang Skove.

512. *Lævana* Muls. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 306; *Dimetrota lævana* Muls. Seidl., Faun. Balt. 436; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 246 — Cat. Col. Eur. III. *Dimetrota lævana* Rey.

I Gødning og ved Aadsel. Jeg har samlet den i Antal i Skørping Holme, Restrup og Lundby Krat ved

Aalborg; forøvrigt er den kun taget af Cand. Schlick. Findetiderne ere i Maj, Juni og Oktbr.

513. *Setigera* Sharp. — Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 251; *Dimetrota lævana* Muls = *setigera* Sharp Seidl., Faun. Balt. 436 — Cat. Col. Eur. III. *Dimetrota lævana* Rey, var. *setigera* Sharp.

Nogle Stykker, fundne af Skolebestyrer Jørgensen ved Hunderup paa Fyen, samt faa andre i min Samling uden sikre Oplysninger stemme godt overens med Sharps Beskrivelse. Den ligner *lævana* en Del, og anses af nogle for en Varietet af denne, men er betydeligt mindre, har forholdsvis tykkere Følehorn og andre Kønsmærker.

514. *Villosula* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 305; *Atheta nigripes* Thoms., Skand. Col. III. 94; Hom. *villosula* Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 249 — Cat. Col. Eur. III. *Dimetrota villosula* Kr.

Sjelden og enkeltvis ved Planteaffald, Gødning og under fugtigt Løv. Den er taget af Prof. Schiødte, Dr. Meinert, Lærer Andersen, Haderslev; af Forfatteren ved Aalborg, Skørping Holme og Skovlund; talrigst har jeg fundet den i Gnavsmuldet i de af Cossuslarven angrebne Popler. Maj og Septbr.

515. *Atramentaria* Gyll. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 303; *Atheta atramentaria* Thoms., Skand. Col. III. 92; *Dimetrota atramentaria* Gyll. Seidl., Faun. Balt. 437; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 250 — Cat. Col. Eur. III. *Dimetrota atramentaria* Gyll.

En overalt hyppig og lidet bundkræsen Art. Den findes ved Stranden under Tang saavel som paa tørre Sandmarker i Gødning, i Skove ved Svampe og under raadnende Planter osv., og saa godt som hele Aaret igennem. Dens i Reglen tydeligt metalglindsende sorte Farve gør den blandt nærstaaende Arter temmelig let kendelig.

516. *Angusticollis* Thoms. — *Atheta angusticollis* Thoms., Skand. Col. III. 87; *Dimetrota angusticollis* Thoms. Seidl., Faun. Balt. 437; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 210 — Cat. Col. Eur. III. *Philhygra ravilla* Er. ♀ *angusticollis* Thoms.

Sjelden og sparsom i Efteraarsmaanederne i Svampe. Den er funden i Dyrehaven og Charlottenlund i »Egeboletus« af Prof. Schiødte samt i Lundby Krat og Skovlund ved Aalborg af Forfatteren.

517. *Ravilla* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 308; *Atheta ravilla* Thoms., Skand. Ins. 51; *Dimetrota ravilla* Er. = *angusticollis* Thoms. Seidl., Faun. Balt. 437 — Cat. Col. Eur. III. *Philhygra ravilla* Er.

Et enkelt Stykke, noget defekt, sandsynligvis hørende til denne Art, findes i Museets Samling; det er taget ved Lersøen i en *Lycoperdinasvamp* i Septbr. af Prof. Schiødte. Arten adskiller sig fra foregaaende navnlig derved, at Antennernes Slutled er betydeligt længere.

518. *Palustris* Kiesw. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 309; *Atheta brunnipes* Thoms., Skand. Col. III. 72; *Philhygra palustris* Kiesw. Seidl., Faun. Balt. 434; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 211 — Cat. Col. Eur. III. *Philhygra palustris* Kiesw.

Paa fugtig Bund, udbredt, men ikke hyppig. Jeg har samlet den i Opskyl ved Jul Sø, Silkeborg, sigtet den af fugtigt Løv i Skørping Holme, Kølske Dam, Lindum, Lundby Krat og flere Steder i Aalborgs Omegn, ogsaa ved Ringkjøbing Fjord under Tang har jeg fundet den. De fleste Findetider ere i Aug., Septbr. og Oktbr., færre om Foraaret.

519. *Corvina* Thoms. — *Atheta corvina* Thoms., Skand. Col. III. 88; Hom. *lepida* Kraatz, Ins. Deutschl. II. 309; *Anopleta corvina* Thoms. Seidl., Faun. Balt. 428; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 212 — Cat. Col. Eur. III. *Anopleta corvina* Thoms.

I Skovegne i Svampe, ikke hyppig; den er taget flere Steder i Nordsjælland af Prof. Schiødte samt i Jylland ved Aalborg, i Lundby Krat, Skørping Skov og Lindum Skov af Forfatteren. Alle Findetider ere i Septbr. og Oktbr.

520. *Lividipennis* Mannh. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 311; *Coprothassa melanaria* Thoms., Skand. Col. III. 34; *Coprothassa lividipennis* Mannh. Seidl., Faun. Balt. 438; *Hom. melanaria* Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 254 — Cat. Col. Eur. III. *Coprothassa sordida* Marsh.

Udbredt og ikke sjelden, ofte i stort Antal i Plante-møddinger og raadnende Planterester, ogsaa ved Gødning. Foraar og Efteraar.

521. *Melanaria* Mannh. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 312; *Coprothassa testudinea* Er. Thoms., Skand. Col. III. 35; Seidl., Faun. Balt. 438; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 255 — Cat. Col. Eur. III. *Coprothassa melanaria* Mannh.

Ligesaa udbredt, men sjeldnere end foregaaende og oftest enkeltvis; den findes især ved Gødning, navnlig Hestegødning, men ogsaa i Opskyl ved Aaer og Søer og i Haver ved raadne Planterester. Den er taget ved Sorgenfri Aa, i Bøllemosen og ved Frederikshavn af Prof. Schiødte, af Koch ved Riserup, af Engelhart, O. Jakobsen og Konsv. Løvendal forskellige Steder paa Sjælland, samt af Forf. ved Aalborg. Findetiderne ere i Marts til Juli og igen i Septbr. — Oktbr.

522. *Aterrima* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 313; *Acrotona aterrima* Thoms., Skand. Col. III. 36; *Colpodota aterrima* Grav. Seidl., Faun. Balt. 438; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 256 — Cat. Col. Eur. III. *Acrotona aterrima* Grav.

Meget almindelig overalt paa Skov- og Engbund, i Plantemøddinger, i Gødning og ved Aadsel, hele Aaret igennem. Den er en af vore hyppigste Arter.

523. *Pygmæa Grav.* — Kraatz, Ins. Deutsl. II. 314; *Acrotona obfuscata* Thoms., Skand. Col. III. 36; *Colpodota pygmæa Grav.*; Seidl., Faun. Balt. 438; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 257 — Cat. Col. Eur. III. *Acrotona pygmæa Grav.*

Udbredt, men ikke overalt lige hyppig, mod Syd og paa Øerne mere almindelig end mod Nord. Den findes ved Bredderne af Aaer og Søer og i det Hele taget paa fugtig Bund i Opskyl og under Planter; ogsaa i halvfugtige Plantemøddinger kan den træffes. Samlet saavel om Foraaret som i Septbr. og Oktbr.

524. *Stercoraria Kr.* — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 319; *Acrotona pilosiventris* Thoms., Skand. Col. III. 38; *Colpodota pilosiventris* Thoms. Seidl., Faun. Balt. 438; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 260 — Cat. Col. Eur. III. *Acrotona parva* Sahlb.

Sjelden og mest enkeltvis. Den er funden i Hestegødning ved Havrestrup (?) af Konsv. Løvendal, i Skørping ved Aadsel, i Lindum ved Træsaft og under Løv, samt ved Aalborg i Plantemøddinger af Forfatteren. Findetiderne ere i Maj, Juni og Oktbr.

525. *Parva* Sahlb. — Hom. *cauta* Er. Kraatz, Ins. Deutschl. II. 318; *Atheta cauta* Thoms., Skand. Col. III. 91.; *Datomicra spreta* Fairm. (?) Seidl., Faun. Balt. 436; Hom. *parva* Sharp, Rev. of Brit. Hom. 253 — Cat. Col. Eur. III. *Acrotona parva* Sahlb.

Udbredt overalt og almindelig i Gødning, raadne Planterester og under Aadsel; den træffes paa enhver Slags Bund til de fleste Tider af Aaret.

526. *Subsinuata* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 316; *Acrotona fimetaria* Thoms., Skand. Col. III. 37; *Solenia subsinuata* Er. Seidl., Faun. Balt. 438; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 262 — Catal. Col. Eur. III. *Acrotona subsinuata* Er.

Sjelden. Den er taget paa Amager af Prof. Schiødte,

samt ved Aalborg, Hvorup og Skovlund i Vendsyssel af Forfatteren; talrigst har jeg fundet den i Gnavsmuld fra Cossuslarvens Gange i Popler. Alle Findetider ere om Efteraaret.

527. *Vernacula* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 315; *Atheta vernacula* Thoms., Skand. Col. III. 84; *Solenia vernacula* Er. Seidl., Faun. Balt. 438; *Homalota fusca* Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 261. — Cat. Col. Eur. III. *Acrotona laticollis* Steph.

Ikke sjelden mod Syd og Øst, hvor den er funden af de fleste Samlere; mod Nord forekommer den derimod meget sparsomt og sjeldent; jeg har kun taget den én Gang i Vang Skov, Vendsyssel, under Løv. Den er samlet i Opskyl, saa vel som i Svampe og i de fleste af Aarets Maaneder lige til Decbr.

528. *Pulchra* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 321; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 263. — Cat. Col. Eur. III. *Acrotona pulchra* Kr.

Meget sjelden. Der er ialt kun fundet faa Stykker, nemlig 1 Stykke af Cand. Schlick ved Ørholm, 2 Stykker under Tang ved Skagen og 1 Stykke under Opskyl i Gravlev Enge af Forfatteren. Findetiderne ere April, Maj og Septbr.

529. *Fungi* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 321; *Acrotona fungi* Thoms., Skand. Col. III. 38; Seidl., Faun. Balt. 439; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 265. — Cat. Col. Eur. III. *Acrotona fungi* Grav.

Vor almindeligste Homalot og hyppig paa enhver Slags Bund under Mos og Løv saa vel som i Svampe, ogsaa ved Myretuer. Den er taget i alle Aarets Maaneder.

530. *Orbata* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 322; *Acrotona orbata* Thoms., Skand. Col. III. 39; Seidl., Faun. Balt. 439; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 264. — Cat. Col. Eur. III. *Acrotona fungi* ♀ *orbata* Er.

Sjelden. Den er funden af Kmrhr. Fabr.-Tengnagel paa Fanø og ved Nykjøbing F., samt af Forf. i Opskyl fra Brønderslev Enge og Skjern Aa. Alle Findetiderne ere i Marts, April og Maj.

531. *Clientula* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 322; *Acrotona clientula* Er. Seidl., Faun. Balt. 439; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 266 — Cat. Col. Eur. III. *Acrotona fungi* var. *clientula* Er.

Den er taget i Charlottenlund i Svampe af Prof. Schiødte, ved Sælsø af Konsv. Løvendal, ved Riserup af Artkt. Koch, ved Trelde Strand i Hestegødning samt i Lindum i Svampe af Forf. De fleste Findetider ere i April og Maj, en enkelt i Decbr.

532. *Orphana* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 323; *Acrotona orphana* Thoms., Skand. Col. III. 39; Seidl., Faun. Balt. 439; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 267 — Cat. Col. Eur. III. *Acrotona orphana* Er.

Et enkelt Stykke fra Københavns Omegn med Paa-tegning af Prof. Schiødte findes i Museets Samling. Bestemmelsen er tvivlsom.

533. *Circellaris* Er. — Kraatz, Ins. Deutsch. II. 326; *Geostiba circellaris* Thoms., Skand. Col. III. 104; Seidl., Faun. Balt. 424; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 160 — Cat. Col. Eur. III. *Geostiba circellaris* Er.

Overalt almindelig under Løv og Mos; den forekommer ogsaa jevnligt i Selskab med Myrer, saavel i som udenfor Tuerne. Den er taget i saagodtsom alle Maaneder af Aaret.

534. *Cæsula* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 328; *Sipalia brachyptera* Thoms., Skand. Col. III. 105; *Pseudosipalia cæsula* Er. Seidl., Faun. Balt. 438; Sharp, Rev. of the Brit. Hom. 159 — Cat. Col. Eur. III. *Sipalia cæsula* Er.

I Sandegne, meget sjelden. I Museets Samling fin-

des en lille Række fra Falster (Prof. Schiødte) samt et enkelt Stykke fra en Sandgrav paa Møen; forøvrigt er den kun taget af Forf. ved Hvorup i Vendsyssel og ved Hedegaardene syd for Aalborg; begge disse Steder fandtes den nedblæst i Sandhuller. Den er taget i April og Oktbr.

Placusa Er.

535. Infima Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 333; Thoms, Skand. Col. III. 102; Seidl., Faun. Balt. 440 — Cat. Col. Eur. III. *Placusa infima* Er.

Under Bark. I Museets Samling findes et enkelt Stykke, taget af Dr. Meinert i Nærheden af København; dette er det eneste Fund af denne Art og Slægt, som mig bekendt er gjort her i Landet.

Phloeopora Er.

536. Reptans Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 337; Thoms., Skand. Col. II. 289; Seidl., Faun. Balt. 414 — Cat. Col. Eur. III. *Phloeopora reptans* Grav.

Under Bark paa Stubbe og halvdøde Trær. Paa Lolland er den funden mange Steder og i Antal af forskellige Samlere, i Jylland kun enkelt i Lindum og Kølske Krat i Vendsyssel af Forfatteren. Foraar og Efteraar.

437. Corticalis Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 337; Thoms., Skand. Col. II. 289; Seidl., Faun. Balt. 414 — Cat. Col. Eur. III. *Phloeopora corticalis* Grav.

Meget sjelden. Saavidt vides kun taget af Kmrhr. Fabr.-Tengnagel, i hvis Klækkehus den er fremkommen af Træ fra forskellige Steder paa Lolland og Falster, April 91, Maj og Septbr. 92.

Hygronoma Er.

538. Dimidiata Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 341; Thoms., Skand. Col. II. 271; Seidl., Faun. Balt. 414 — Cat. Col. Eur. III. *Hygronoma dimidiata*. Er.

Ikke sjelden i Nordsjælland, hvor den er taget forskellige Steder og af de fleste københavnske Samlere, saaledes ved Ladegaardsaaen (Prof. Schiødte), Utterslev Mose, Brede, Ravnsnæs Skov (Arktkt. Koch), Dyrehaven, Lyngby Sø, Sælsø, Jonstrup (Konsv. Løvendal, Cand. Schlick o. fl.); paa Fyn er den funden ved Odense af Skolebestyrer Jørgensen; men fra andre Landsdele foreligger den endnu ikke. Foraarsmaanederne afgive de fleste Findetider.

Tomoglossa Kr.

539. Luteicornis Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 343; Seidl., Faun. Balt. 439 — Cat. Col. Eur. III. *Tomoglossa luteicornis* Er.

Kun to Stykker kjendes; de tilhøre Museets Samling og ere formodentlig fundne af Prof. Schiødte, men forøvrigt uden nogensomhelst Oplysning. Arten skal leve under Bark; er ikke funden i Sverrig og overalt sjelden i Tyskland.

Schistoglossa Kr.

540. Viduata Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 345; Thoms., Skand. Col. III. 97; Seidl., Faun. Balt. 439 — Cat. Col. Eur. III. *Schistoglossa viduata* Er.

Et enkelt Stykke er taget af Arkitekt Koch i Utterslev Mose, Nordsjælland, d. 15. April 1877.

Oligota Mannh.

541. Pusillima Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 347; Thoms., Skand. Col. II. 262; Seidl., Faun. Balt. 445 — Cat. Col. Eur. III. *Oligota pusillima* Grav.

Udbredt overalt og ret hyppig i Plantemuld i Skove, Haver og Anlæg, ogsaa i Stalde og Udhuse under Affald af Hø og Halm. Den er funden i alle Maaneder fra Marts til Novbr.

542. *Inflata* Mannh. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 348; *Oligota subtilis* Thoms., Skand. Ins. I. 40 — Cat. Col. Eur. III. *Oligota inflata* Mannh.

Meget sjeldnere end foregaaende og stedegen. Den er samlet paa Antvorskov i Kældere og Kostalde (Dr. Meinert), i Kjøbenhavns Omegn under Sten (Prof. Schiødte), i Dyrehaven og ved Svenstrup under Halm og Løv (Konsv. Løvendal, Cand. Schlick og Arktk. Koch) samt paa Falster (Kmrhr. Fabr.-Tengnagel). Foraar.

543. *Apicata* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 349; *Microcera apicata* Thoms., Skand. Ins. I. 40; *Microcera abdominalis* Scriba. Seidl., Faun. Balt. 446 — Cat. Col. Eur. III. *Microcera apicata* Er.

Faa Stykker, som vistnok maa henføres til denne Art, ere fundne af Kons. Løvendal dels i et Bageri i Kjøbenhavn, dels paa Lolland; begge Gange i Juli.

544. *Granaria* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 349; *Microcera pentatoma* Foerst. Seidl., Faun. Balt. 446 — Cat. Col. Eur. III. *Oligota granaria* Er.

En lang Række er samlet af Dr. Meinert i en Vinkælder i København; Ingeniør Engelhart har taget den i Lyngby Mølle og Skolebestyrer Jørgensen ved Søborg. De anførte Findetider ere i Aug.

II. *Gyrophænini*.

Arterne af denne Afdeling leve alle i Svampe; en Del foretrække de bløde, saftfulde Paddehatte, andre tørre Træsvampe. Deres Sædvane at sidde eller løbe omkring med Båkgroppen løftet og strakt hen over Dækvinger

og Forryg, hvorved de dels blive tilsyneladende mindre, dels skjule den ved stærkere Farver let synlige Forkrop, maa sikkert opfattes som en Stræben efter at søge Skjul eller anlægge en Maske for at undgaa Opmærksomhed. Man finder den samme Ejendommelighed hos en Del andre Staphyliner, f. Eks. Myrmedonier og Falagrier, men hos ingen mere udviklet end hos Gyrophænerne, navnlig hos *Encephalus*. I Reglen træffes de selskabeligt, ofte flere Arter sammenblandede. De bør samles og opstilles om muligt i Rækker, da Kønnene adskilles ved særegne Kønsmærker, der tillige ere et sikkert og ofte nødvendigt Kendetegn til de forskellige Arters Adskillelse.

Encephalus Westw.

545. *Complicans* Westw. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 352; Thoms., Skand. Col. II. 265. Seidl., Faun. Balt. 445 — Cat. Col. Eur. III. *Encephalus complicans* Westw.

Meget sjelden og enkeltvis. I Prof. Schiødtes Samling findes nogle ældre Stykker uden Oplysninger; forøvrigt er den funden af Dr. Meinert i Charlottenlund, af Konsv. Løvendal i Marienlund (Odense), 5. April 1889, af Skolebestyrer Jørgensen ved Lethrabort, 22. April 1886, af Sparekassedrkt. Jakobsen i Dronningborg Skov ved Randers og i Frijsenborg Lystskov, April og Septbr. 1884, sidstnævnte Sted i trøsket Træ med Svampe, samt af Forfatteren paa en Grøftevold i Lundby Krat, Aalborg, Oktbr. 94.

Gyrophæna Mannh.

546. *Nana* Mannh. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 357; Thoms., Skand. Col. II. 266. Seidl., Faun. Balt. 443 — Cat. Col. Eur. III. *Gyrophæna nana* Payk.

Udbredt og ikke meget sjelden. Den foreligger fra

Donse (Arktkt. Koch), Holte (Cand. Schlick), Viby Krat og Brabrand ved Aarhus (Kons. Løvendal), Dronningborg Skov, Randers (Sprksdrkt. O. Jakobsen), samt Vang Skov og Agdrup Krat i Vendsyssel (Forf.). Findetiderne ere dels Foraarsmaanederne, dels Aug.—Oktbr.

547. *Congrua* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 358; Thoms., Skand. Col. II. 268; Seidl., Faun. Balt. 444 — Cat. Col. Eur. III. *Gyrophæna fasciata* Marsh.

Udbredelse og Forekomst omtrent som foregaaende. Den er taget forskellige Steder i Sjælland (Dr. Meinert og Cand. Schlick), paa Lolland (Ing. Engelhart) samt i Skove omkring Aalborg (Forf.). De anførte Findetider ere i Aug.—Septbr.

548. *Lævipennis* Thoms. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 358; Thoms., Skand. Col. II. 267; Seidl., Faun. Balt. 444 — Cat. Col. Eur. III. *Gyrophæna lævipennis* Kr.

Sjelden. Den er funden ved Brede (Arktkt. Koch), i Ermelund (Konsv. Løvendal og Cand. Schlick) samt i Vang Skov, Vendsyssel (Forf.). Findetiderne ere dels i April—Maj, dels i Aug.

549. *Punctulata* Muls. — Seidl., Faun. Balt. 444; *Gyrophæna puncticollis* (?) Thoms. Skand. Ins. I. 40 — Cat. Col. Eur. III. *Gyrophæna Poweri* Crotch.

Udbredt og ikke meget sjelden. Konsv. Løvendal har taget den ved Thureby i Fyrsvamp, i Gelskov i Boletussvampe, Skolebestyrer Jørgensen ved Odense, Kmrhr. Fabr.-Tengnagel ved Vejle; jeg selv har fundet den dels ved Fredericia, dels i Skove nord og syd for Aalborg. De fleste Findetider ere om Efteraaret, en enkelt i Juni.

550. *Lucidula* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 359; Thoms., Skand. Col. II. 268; Seidl., Faun. Balt. 444 — Cat. Col. Eur. III. *Gyrophæna lucidula* Er.

Særdeles sjelden. Der foreligger kun fire Stykker

i Cand. Schliccks Samling, de tre fra Sorø, det fjerde fra Ruderhegn, d. 12. April.

551. *Bihamata* Thoms. — Thoms., Skand. Ins. I. 45; Seidl., Faun. Balt. 444 — Cat. Col. Eur. III. *Gyrophæna bihamata* Thoms. = *fasciata* Marsh. = *congrua* Er.

Sjelden eller meget sjelden. Enkelte Stkr. ere fundne af Konsv. Løvendal ved Hvalsø i Sjælland, 1. Maj 85, af Arktk. Koch ved Maribo, 21. Aug., og af Ing. Engelhart ved Aalholm.

552. *Pulchella* Heer. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 356; Thoms., Skand. Ins. I. 45. Seidl., Faun. Balt. 444 — Cat. Col. Eur. III. *Gyrophæna pulchella* Heer.

Sjelden eller meget sjelden. Den er hidintil kun funden i Jylland, nemlig ved Frederits (Forf.), ved Aarhus (Baron Rosenkrantz) og ved Hinnerup (Sparekasse-direktør O. Jakobsen). Septbr. og Oktbr.

553. *Affinis* Sahlb. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 357; Thoms., Skand. Col. II. 267; Seidl., Faun. Balt. 444 — Cat. Col. Eur. III. *Gyrophæna affinis* Sahlb.

Udbredt og ikke sjelden. Den er taget mange Steder baade paa Øerne og paa Halvøen og af de fleste Samlere. Findetiderne ere dels i Maj og Juni, dels i Aug.—Oktbr.

554. *Strictula* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 360; *Gyrophæna polita* Thoms., Skand. Col. II. 269; Seidl., Faun. Balt. 444 — Cat. Col. Eur. III. *Gyrophæna polita* Grav, var. *strictula* Er.

Udbredt og hyppig i Labyrintsvampe paa Ege- og Bøgestubbe. Findetiderne strække sig fra Maj til September.

555. *Minima* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 359; Thoms., Skand. Ins. I. 45; Seidl., Faun. Balt. 445 — Cat. Col. Eur. III. *Gyrophæna minima* Er.

Meget sjelden og sparsomt. Den er funden af

Sparekassedrkt. O. Jakobsen i Hinnerup Skov og af Forf. i Vang Skov i Vendsyssel. Aug. og Septbr.

556. *Manca* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 361; Thoms. Skand. Col. II. 268; Seidl., Faun. Balt. 445 — Cat. Col. Eur. III. *Gyrophæna manca* Er.

Taget af Arkitekt Koch ved Ørholm i Nordsjælland. 21. Aug. 76.

Agaricochara Kr.

557. *Lævicollis* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 362 — Cat. Col. Eur. III. *Agaricochara lævicollis* Kr.

Et enkelt Stykke af denne særdeles sjældne Art har jeg fundet i Skörping Skov i Svamp paa en Bøgestub. Aug. 1888.

III. Gymnusini.

Myllæna Er.

558. *Dubia* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 368; Thoms., Skand. Col. III. 15; Seidl. Faun. Balt. 465 — Cat. Col. Eur. III. *Myllæna dubia* Grav.

Paa fugtig Eng- og Skovbund i Opskyl og under Løv, udbredt over hele Landet og ikke sjelden. Den er navnlig taget i Foraarsmaanederne.

559. *Intermedia* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 369; Thoms., Skand. Col. III. 16; Seidl., Faun. Balt. 465 — Cat. Col. Eur. III. *Myllæna intermedia* Er.

Ved Aa- og Søbredder, udbredt og hyppig overalt, stundom i stort Antal i Opskyl. Foraar og Efteraar.

560. *Minuta* Er. — Kraatz Ins. Deutschl. II. 369; Thoms., Skand. Col. III. 16; Seidl., Faun. Balt. 465 — Cat. Col. Eur. III. *Myllæna minuta* Er.

Sammen med foregaaende Arter og ligesaa udbredt og hyppig. Foraar og Efteraar.

561. *Gracilis* Heer. — Kraatz, Ins. Deutschl. II.

369; Thoms., Skand. Col. III. 16; Seidl., Faun. Balt. 465
— Cat. Col. Eur. III. Myllæna brevicornis Matth.

Den lever paa lignende Steder som foregaaende Arter, men er temmelig sjelden og forekommer mest enkeltvis eller i ringe Tal; forøvrigt er den udbredt over hele Landet og taget af de fleste Samlere.

Gymnusa Er.

562. Brevicollis Payk. — Kraatz. Ins. Deutschl. II. 373; Thoms., Skand. Col. II. 241.; Seidl., Faun. Balt. 466 — Cat. Col. Eur. III. Gymnusa brevicollis Payk.

Meget sjelden, stedege og enkelt paa fugtige Steder under Løv og i Opskyl. Den er funden paa Sjælland ved Frederiksdals Aa af Prof. Schiødte (?), i Bøllemosen af Konsv. Løvendal, ved Lyngby af samme; paa Halvøen er den taget ved Haderslev af Lærer Andersen og ved Randers af Sparekassedrkt. O. Jakobsen. De anførte Findetider ere i Maj, Juni og Aug.

10. Gruppe. **Tachyporini.**

Hypocyptus Er.

563. Discoideus Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 385; Thoms. Skand. Col. III. 110; Seidl., Faun. Balt. 401 — Cat. Col. Eur. III. Hypocyptus discoideus Er.

Stedege og sjelden; hidindtil kun funden paa Øerne, saaledes paa Sjælland ved Strandmøllens Dam af Prof. Schiødte, i Lyngby Mose, Frederiksdal, og paa Christianshavns Vold af Arkitekt Køch, flere Steder i Nordsjælland af Cand. Schlick; paa Fyen har Skolebestyrer Jørgensen samlet en længere Række ved Odense (?). Findetiderne ere i Marts—April, Juli og Aug.

564. Pulicarius Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II.

385; Seidl. Faun. Balt. 401 — Cat. Col. Eur. III. *Hypocypus pulicarius* Er = *seminulum* Er.

Meget sjelden og som foregaaende kun kendt af Fund fra Øerne; Konsv. Løvendal har taget den ved Lethrabort, Svenstrup og Søborg Sø, sidstnævnte Sted i Hø; af Kamhr. Fabr.-Tengnagel er den funden ved Nykjøbing, Falster. De anførte Findetider strække sig fra April til Juli.

565. *Longicornis* Payk. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 384; Thoms. Skand. Col. III. 110; Seidl. Faun. Balt. 401 — Cat. Col. Eur. III. *Hypocypus longicornis* Payk.

Mere udbredt og mindre sjelden end de tvende foregaaende Arter, dog i det hele ikke hyppig. Den er samlet af Prof. Schiødt flere Steder i Nordsjælland, af Koch paa Lolland ved Maribo og paa Falster ved Riserup, af Konsv. Løvendal paa Sjælland, Fyn og ved Kolding; Lærer Andersen har taget den ved Haderslev, men fra den nordlige Del af Jylland foreligge ingen Fund.

Dr. Kraatz oplyser om den, at den findes under Bark og paa Buske; hos os er den næsten al Tid taget i Opskyl eller ved Sigtning af Løv paa fugtig Skovbund. Findetiderne strække sig gennem alle Maaneder fra Marts til Oktbr.

566. *Læviusculus* Mannh. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 387; Thoms. Skand. Col. III. 111; Seidl., Faun. Balt. 401 — Cat. Col. Eur. III. *Hypocypus læviusculus* Mannh.

Den mest udbredte og hyppigste af vore Arter; den forekommer i Opskyl fra Enge og Moser og under Løv i fugtige Skove og er samlet i alle Dele af Landet, nu og da i betydeligt Antal. Den er taget i alle Maaneder fra Marts til Novbr.

567. *Seminulum* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 387; Seidl., Faun. Balt. 401. — Cat. Col. Eur. III. *Hypocypus seminulum* Er.

Meget sjelden; nogle faa Stykker findes i Museets

Samling, bestemte af Prof. Schiødte, et enkelt i Cand. Schlicks, Aug. 89, uden Oplysninger om Findestedet; andre Fund ere mig ikke bekendte, men jeg har set smaa Eksemplarer af læviusculus i Samlinger bestemte som seminulum.

Trichophya Mannh.

568. Pilicornis Gyll. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 390; Thoms., Skand. Col. III. 112 — Cat. Col. Eur. III. Trichophya pilicornis Gyll.

Yderst sjelden. I Museets Samling findes 2 ældre Stykker, det ene meget defekt, fra Silkeborg, fundne af Prof. Schiødte, 22. Juli; andre Fund ere ikke bekendte. Den lever under Bark paa Stubbe og døde Trær (Kraatz) og træffes ogsaa ved udflydende Saft og paa nyfældte Stammer (Thoms.)

Habrocerus Er.

569. Capillaricornis Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 393; Thoms., Skand. Col. III. 146; Seidl., Faun. Balt. 401 — Cat. Col. Eur. III. Habrocerus capillaricornis Grav.

Udbredt og ikke meget sjelden. Den lever under Løv i muldrig Skovbund, i Gnavsmuldet under Bark paa ældre Stubbe, samt i Bladdynger i Haver og Anlæg og er samlet forskellige Steder i Nordsjælland og Lolland af Prof. Schiødte, Dr. Meinert, Arkitekt Koch, Konsv. Løvendal o. fl. samt omkring Aalborg af Forfatteren. Findetiderne strække sig gennem alle Månedes fra April til Oktbr.

Leucoparyphus Kr.

570. Silphoides L. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 395; Cilea silphoides Thoms., Skand. Col. III. 153;

Seidl., Faun. Balt. 401 — Cat. Col. Eur. III. *Leucoparyphus silphoides* L.

Udbredt og i det Hele ikke sjelden, dog mod Syd mere hyppig end i den nordlige Del af Landet. Den tages navnlig i Hestegødning, men ogsaa i muggent, fugtigt Hø og under Løv, i Plantemuld og Opskyl. De opgivne Findetider ere fra Marts til Oktbr.

Tachinus Grav.

571. *Rufipes* De Geer. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 402; Thoms., Skand. Col. III. 156; Seidl., Faun. Balt. 403 — Cat. Col. Eur. III. *Tachinus rufipes* L.

Hyppig overalt saavel ved Gødning som i Plantesmuld og Opskyl. Foraar og Efteraar.

572. *Flavipes* F. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 403; Thoms., Skand. Col. III. 158; Seidl., Faun. Balt. 402 — Cat. Col. Eur. III. *Tachinus flavipes* F.

Som foregaaende, ofte i stort Antal i frisk Hestegødning. Den er taget i alle Maaneder fra Marts til Oktbr.

573. *Rufipennis* Gyll. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 405; Thoms., Skand. Col. III. 155; Seidl., Faun. Balt. 403 — Cat. Col. Eur. III. *Tachinus rufipennis* Gyll.

Meget sjelden under Løv paa halvfugtig Skovbund. Den er funden i Dyrehaven af Arkitekt Koch, 29. April 77, og Konsv. Løvendal, 7. Juni 85, ved Fakse af Ing. Engelhart d. 26. Septbr. 90, samt i Vang Skov Vendsyssel af Adj. Asmussen; hver Gang kun et enkelt Stykke.

574. *Subterraneus* L. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 409; Thoms., Skand. Col. III. 154; Seidl., Faun. Balt. 404 — Cat. Col. Eur. III. *Tachinus subterraneus* L.

Særdeles sjelden. Den kendes kun fra Lindum Skov, hvor jeg har taget den to Gange i Svampe om Efteraaret, 5. Oktbr. 90 og 29. Oktbr. 93, hver Gang kun et enkelt Stykke.

575. *Proximus* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 401; Thoms., Skand. Ins. I. 58; Seidl., Faun. Balt. 402 — Cat. Col. Eur. III. *Tachinus proximus* Kr.

Paa Øerne og i den sydlige Del af Jylland ikke sjelden, men meget sparsomt i den nordlige Del; den lever i Svampe, Aadsel og Gødning og er funden saavel Foraar og Efteraar som midt om Sommeren.

Den nærstaaende Art *humeralis* Grav. har jeg ikke set i nogen Samling, men der er vel ingen Tvivl om, at den vil findes her i Landet, da den forekommer i Nordtyskland saa vel som i Sverrig. I enkelte Samlinger har jeg set foregaaende Art bestemt som *humeralis*.

576. *Marginellus* F. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 412; Thoms., Skand. Col. III. 157; Seidl., Faun. Balt. 404 — Cat. Col. Eur. III. *Tachinus marginellus* F.

Almindelig overalt under Løv, raadnende Plantedele og ved Gødning, samlet i de fleste af Aarets Maaneder.

577. *Laticollis* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 413; Thoms., Skand. Ins. I. 58; Seidl., Faun. Balt. 404 — Cat. Col. Eur. III. *Tachinus laticollis* Grav.

Sjeldnere end foregaaende især mod Nord; den indfinder sig ved Aadsel, men er hyppigst taget under Løv og i Opskyl. Foraar og Efteraar.

578. *Collaris* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 414; Thoms., Skand. Col. III. 159; Seidl. Faun. Balt. 404 — Cat. Col. Eur. III. *Tachinus collaris* Grav.

Hyppig overalt i Plantemuld, under raadne Planterester o. s. v. saavel i Skove som paa fri Mark. Den er funden i de fleste af Aarets Maaneder.

579. *Fimetarius* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 411; Thoms., Skand. Col. III. 158; Seidl., Faun. Balt. 404 — Cat. Col. Eur. III. *Tachinus fimetarius* Grav.

Udbredt overalt og hyppig; af blomstrende Hvidtjøn kan den stundom nedbankes i hundredevis, ofte

træffes den i og omkring Tuerne hos *Form. fuliginosa*; forøvrigt er den taget ved Træsæft, i Træsmuld i hule Trær og under Løv; Findetiderne strække sig fra April til Septbr.

580. *Elongatus* Gyll. — Kraatz, *Ins. Deutschl.* II. 416; *Drymoporus elongatus* Thoms., *Skand. Col.* III. 159; Seidl., *Faun. Balt.* 404 — *Cat. Col. Eur.* *Drymoporus elongatus*. Gyll.

Sjelden og sparsomt under fugtigt Løv og i Opskyl. I Museets Samling har jeg set nogle Stykker fra Palsgaards Plantage ved Horsens og fra Knudshoved (Boye), Juni 73, fra Frederikshavn (Prof. Schiødte), Charlottenlund og Klare Sø ved Antvorskov (Dr. Meinert) 12, Juli 53; forøvrigt er den funden i Klampenborg Dyrehave (Kmhr. Fabr.-Tengnagel), Charlottenlund Maj 73 (Konsv. Løvendal), ved Skamlingsbanken (Assist. Holstebro), i Pindstrup Skov ved Randers, Maj 82 og Juni 83 (O. Jakobsen), samt i Lundbykrat og Skørping Skov, Aalborg, Aug. 89 (Forf.)

Tachyporus Grav.

581. *Obtusius* L. — Kraatz, *Ins. Deutschl.* II. 419; Thoms., *Skand. Col.* III. 149; Seidl., *Faun. Balt.* 405 — *Cat. Col. Eur.* III. *Tachyporus obtusus* L.

Meget almindelig overalt saavel i som udenfor Skove til enhver Tid af Aaret.

582. *Abdominalis* Gyll. — Kraatz, *Ins. Deutschl.* II. 420; Thoms., *Skand. Col.* III. 149; Seidl., *Faun. Balt.* 405 — *Cat. Col. Eur.* III. *Tachyporus ruficeps* Kr. = ? *abdominalis* Er.

Sjelden eller meget sjelden. Den er funden af Konsv. Løvendal paa Ørholms Fælle, Juli 75, af Skolebestyrer Jørgensen ved Søholm Sø, Aug. 84, af Dr. Meinert ved Kjerteminde, og af Forfatteren i Sæbygaards Skov, Septbr. 87.

583. *Solutus* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 421; Thoms., Skand. Col. III. 150; Seidl., Faun. Balt. 405 — Cat. Col. Eur. III. *Tachyporus solutus* Er.

Som det synes meget sjelden og kun taget af Konsv. Løvendal i Dyrehaven og ved Raadvad, af Ing. Engelhart i Jægersborg Dyrehave samt af Forfatteren i Trelde Skov; hver Gang i Maj. Det tør formodes, at den er mindre sjelden end det maa antages efter disse enkelte Fund, og at den kan være overset paa Grund af dens Lighed med nærstaaende Arter.

584. *Chrysomelinus* L. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 421; Thoms., Skand. Col. III. 150; Seidl., Faun. Balt. 405 — Cat. Col. Eur. III. *Tachyporus chrysomelinus* L.

Meget almindelig overalt paa enhver Slags Bund hele Aaret igennem.

585. *Humerosus* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 424; Thoms., Skand. Ins. I. 58; Seidl., Faun. Balt. 405 — Cat. Col. Eur. III. *Tachyporus atriceps* Steph.

Temmelig hyppig overalt paa fugtig Skov- og Kærbund i de fleste af Aarets Maaneder. Varieteten med sorte Dækvinger (*pulchellus* Mannh.) er sjelden.

586. *Ruficollis* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II, 424; Seidl., Faun. Balt. 405 ? — Cat. Col. Eur. III. *Tachyporus ruficollis* Grav.

De Stykker, som jeg i flere Samlinger har set opstillede og bestemte som denne Art, stemme godt overens med Kraatz's Beskrivelse, men ikke med de Kendetegn, der fremhæves af Dr. Seidlitz, og som navnlig bestaa deri, at *ruficollis* har første Led af Bagtarserne kortere end andet og Dækvingerne ved Siden af Kantstripen uden Børstepunkter; alle Eksemplarer have nemlig første Led i Bagtarserne længere end andet og flere Børstepunkter i Dækvingernes Siderand. Her maa altsaa enten være en Unøjagtighed hos Dr. Seidlitz eller de

opstillede Stykker er ikke ruficollis Grav., med hvis Størrelse, Farve, Behaaring de som sagt forøvrigt samstemme godt. De ere fundne af Prof. Schiødte, Arktkt. Koch, 6. Juli 75, Sparekassedrkt. Jakobsen i Frijsenborg Skove, Septbr. 84, Skolebestyrer Jørgensen ved Vejle, Maj, og af Forfatteren ved Juul Sø i Opskyl, Maj 93; hver Gang kun enkeltvis.

587. *Hypnorum* F. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 423; Thoms., Skand. Col. III. 150; Seidl., Faun. Balt. 406 — Cat. Col. Eur. III. *Tachyporus hypnorum* F.

Hyppig overalt paa halvfugtig Bund under Løv og Mos hele Aaret igennem.

588. *Pusillus* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 427; Thoms Skand. Col. III. 151; Seidl., Faun. Balt. 406 — Cat. Col. Eur. III. *Tachyporus pusillus* Grav.

Som foregaaende, maaske mindre hyppig. Den er taget fra Marts til Oktbr.

589. *Scitulus* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 426; Thoms, Skand. Col. III. 151; Seidl., Faun. Balt. 406 — Cat. Col. Eur. III. *Tachyporus scitulus* Er.

Meget sjelden. Den er funden af Sparekassedrkt. O. Jakobsen i Viby Krat ved Aarhus, i Floes Skov, Randers, og i Lindum. April, Maj og Aug., hver Gang kun et enkelt Stykke.

590. *Transversalis* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 426; Thoms., Skand. Col. III. 151; Seidl., Faun. Balt. 406 — Cat. Col. Eur. III. *Tachyporus transversalis* Grav.

Stedegen og i det hele sjelden. Den foreligger hyppigst fra Sjælland, især fra Søbredder og Moser omkring Kjøbenhavn, hvor den er samlet af de fleste kjøbenhavnske Entomologer; udenfor Sjælland er den funden i Jylland ved Kongslund Inddæmning, Randers, af Sparekassedrkt. O. Jakobsen og i Gravlev Enge af For-

fatteren. Alle Findetider ere om Foraaret fra Febr. til Maj.

591. *Brunneus* F. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 427; Thoms., Skand. Col. III. 152; Seidl., Faun. Balt. 406 — Cat. Col. Eur. III. *Tachyporus nitidulus* F.

Almindelig overalt, især paa Eng- og Mosebund den største Del af Aaret.

Lamprinus Heer.

592. *Saginat* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 429; Thoms., Skand. Col. III. 152; Seidl., Faun. Balt. 406 — Cat. Col. Eur. III. *Lamprinus saginatus* Heer.

Den er kun funden faa Steder her i Landet og al Tid enkeltvis; i Museets Samling har jeg set to Stykker, det ene fra Raavad Mose, Maj, det andet fra Bøllemosen, April, fundne af Prof. Schiødte; forøvrigt er den taget ved Hulemose Sø af Konsv. Løvendal, Maj 88, samt i Lindum, Vang Skov og Agdrup Krat i Vendsyssel, Maj og Septbr. 87, af Forfatteren.

Conosoma Kraatz.

593. *Littoreum* L. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 433; Thoms. Skand. Col. II. 148; *Conurus littoreus* L. Seidl., Faun. Balt. 407 — Cat. Col. Eur. III. *Conurus littoreus* L.

Udbredt, men i det hele sjelden. Den lever i dybt, muldnende Løv, i gamle, hule og trøskede Træer, i Bladdynger, under Kvas og i Plantemøddinger og er funden i Charlottenlund og i Strandmøllens Have af Prof. Schiødte, i Fuglevad af Dr. Meinert, i Dyrehaven af Koch og Løvendal, ved Næstved af Koch, i Aalborg, Restrup, Skørping og Vang Skov af Forfatteren, sidstnævnte Sted i meget stort Antal i en Bunke Kvas ved en Vandgrøft. De anførte Findetider strække sig fra Maj til Nvbr.

594. *Bipustulatum* Grav. — Kraatz, Ins.

Deutschl. II. 437; Thoms., Skand. Col. III. 148; *Conurus bipustulatus* Grav. Seidl., Faun. Balt. 407 — Cat. Col. Eur. III. *Conurus bipustulatus* Grav.

I Fyrsvamp, meget sjelden og stedege, men oftere i Antal. I Museets Samling findes gamle Stykker fra Sorø ved afdøde Pastor Jakobsen; af Arktkt. Koch er den taget ved Jyderup og Skarritsø, 16. Maj 75, og af Konsv. Løvendal i Næsbyholm Skov, 6. Juni 81; andre Findesteder for denne smukke Art kender jeg ikke.

595. *Bipunctatum* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 438; Thoms., Skand. Col. III. 148; *Conurus bipunctatus* Grav. Seidl., Faun. Balt. 407 — Cat. Col. Eur. III. *Conurus bipunctatus* Grav.

Meget sjelden. Den er taget af Arktkt. Koch uden Oplysning om Findested, af Konsv. Løvendal i Bognæs Skov i Eg, 26. Juni 76, og af Forfatteren i Antal i Vang Skov, Vendsyssel, Septbr. 87, ligeledes i Eg, samt i Agdrup Krat i Elletrunter, Maj 86.

596. *Pubescens* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 435; Thoms., Skand. Col. III. 147; *Conurus pubescens* Grav. Seidl., Faun. Balt. 407 — Cat. Col. Eur. III. *Conurus pubescens* Grav.

Meget almindelig i vore Skove og Stubbe og hule Træer ved Svampe og i Træsmuld hele Aaret igennem. Den lyse Varietet er ikke sjelden.

597. *Fusculum* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 436; Thoms., Skand. Ins. I. 59; *Conurus fusculus* Er. Seidl., Faun. Balt. 407 — Cat. Col. Eur. III. *Conurus immaculatus* Steph.

Udbredelse og Forekomst som foregaaende, men ikke saa hyppig.

598. *Pedicularium* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 436; Thoms., Skand. Col. III. 148; *Conurus pedicularius* Grav. Seidl., Faun. Balt. 406 — Cat. Col. Eur. III. *Conurus pedicularius* Grav.

Temmelig sjelden, men funden i alle Landsdele; som de foregaaende i trøskede Træstød, hule Træer o. s. v. Foraar og Efteraar.

Bolitobius Leach.

599. *Analisis* Payk. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 442; *Bryocharis analisis* Thoms., Skand. Col. III. 167; *Bryocharis analisis* Payk. Seidl., Faun. Balt. 409 — Cat. Col. Eur. III. *Megacronus (Bryocharis) analisis* F.

Udbredt, men sparsomt og sjelden, paa halvfugtig Skovbund under Løv og Mos. I Museets Samling findes en smuk Række fra Øbjerggaard, Sælland (Boye), flere fra Geelskov (Dr. Meinert og Dr. Bergsøe), fra Brede og Riserup (Koch); forøvrigt er den taget paa Amager, ved Frederiksdal og Sælsølund af Konsv. Løvendal, flere Steder uden nærmere Oplysning af Cand. Schlick, ved Strandmøllen, i Gjerup Skov og Rø paa Bornholm af Kmrhr. Fabr.-Tengnagel, ved Søborg i Nordsjælland og forskellige Steder omkring Odense af Skolebestyrer Jørgensen, i Viby Krat ved Aarhus af Sparekassedrkt. O. Jakobsen, samt af Forfatteren i Skovlund, Skørping og Lundby Krat ved Aalborg. Findetiderne ere i April, Maj og igen i Aug., Septbr.

600. *Cingulatus* Mannh. — Kraatz, Ins. Deutschl. II., 443; *Bryocharis cingulata* Thoms., Skand. Col. 168; *Bryocharis cingulata* Mannh. Seidl., Faun. Balt. 409 — Cat. Col. Eur. III. *Megacronus (Bryocharis) cingulatus* Mannh.

Udbredelse og Forekomst omtrent som foregaaende Art. Den er funden mange Steder omkring i Nordsjælland af forskellige ældre og yngre Entomologer, paa Lolland ved Aalholm i Fyrsvampe af Ingeniør Engelhart, i Fruens Bøge ved Odense af Skolebestyrer Jørgensen, ved Haderslev af Lærer Andersen, ved Taps af Toldassistent Holstebro, forskellige Steder omkring

Randers af Sparekassedrkt. O. Jakobsen og endelig i Agdrup Krat, Vendsyssel. og i Almindingen paa Bornholm af Forfatteren. Findetiderne ere som hos analis Foraaret, sidste Sommermaaneder og Efteraaret.

601. *Inclinans* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 444; *Bryocharis inclinans* Thoms., Skand. Col. III. 168; Seidl., Faun. Balt. 409 — Cat. Col. Eur. III. *Megacronus* (*Bryocharis*) *inclinans* Grav.

Under Løv og Mos i halvfugtige Skove ligesom de foregaaende Arter, udbredt som disse, men vistnok noget sjeldnere. Fra Lolland foreligger i Museets Samling en Række ved Dr. Bergsøe, der ligeledes har fundet den paa Sjælland ved Frederiksdal og i Geel Skov; Prof. Schiødte har taget den i Dyrehaven, Konsv. Løvendal ved Frederiksdal, Sparekassedrkt. Jakobsen ved Lethraborgh, Kmrhr. Fabr.-Tengnagel ved Skjoldnæsholm; paa Fyen er den funden i Marienlund og i Aalykke Skov ved Odense af Skolebestyrer Jørgensen, i Jylland ved Aarhus af Baron Rosenkrantz og omkring Randers af Asst. Holstebro samt i Restrup Krat ved Aalborg et enkelt Stykke af Forfatteren. Findetiderne ere i Marts, Maj og igen i Oktbr.

602. *Atricapillus* F. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 446; *Bolitobius lunulatus* Thoms., Skand. Col. III. 170; Seidl., Faun. Balt. 408 — Cat. Col. Eur. III. *Bolitobius lunulatus* L.

Udbredt overalt i Skovegne og almindelig i Svampe, navnlig om Efteraaret.

Den nærstaaende Art *pulchellus* Th. = *lunulatus* Er., hos hvilken Skulderpletterne forenes til et Baand tvers over Roden af Dækvingerne, er ikke (endnu) funden hos os; den er paavist i Holsten og har ogsaa hjemme i Mellemverrig.

603. *Striatus* Oliv. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 448; *Megacronus striatus* Thoms., Skand. Col. III. 166;

Seidl., Faun. Balt. 408 — Cat. Col. Eur. III. *Megacronus striatus* Oliv.

Særdeles sjelden. Den er kun funden et Sted her i Landet, nemlig i Lindum Skov, hvor Konsv. Løvendal har taget den i *Polyporus* Svampe omtrent paa samme Sted to Gange, d. 26. Juni 85 og 17. Juni 87.

604. *Trinotatus* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 449; *Lordithon trinotatus* Thoms., Skand. Col. III. 174; Seidl., Faun. Balt. 408 — Cat. Col. Eur. III. *Bolitobius* (*Lordithon*) *trinotatus* Er.

Meget almindelig ved Svampe i alle vore Skovegne især om Efteraaret.

605. *Exoletus* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 450; *Lordithon exoletus* Thoms., Skand. Col. III. 174; Seidl., Faun. Balt. 408 — Cat. Col. Eur. III. *Bolitobius* (*Lordithon*) *exoletus* Er.

Udbredt, men ikke almindelig, navnlig ikke i den nordlige Del af Jylland, hvor jeg kun har taget et Par Stkr. i Sæbygaards Skov, Septbr. 87.

606. *Pygmæus* F. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 451; *Lordithon pygmæus* Thoms., Skand. Col. III. 174; Seidl., Faun. Balt. 408 — Cat. Col. Eur. III. *Bolitobius* (*Lordithon*) *pygmæus* F.

Overalt almindelig i Svampe, navnlig om Efteraaret; den varierer betydeligt i Størrelse saa vel som i Farve.

Bryoporus Kraatz.

607. *Cernuus* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 453; Thoms., Skand. Col. III. 169; Seidl., Faun. Balt. 409 — Cat. Col. Eur. III. *Megacronus* (*Bryoporus*) *cernuus* Grav.

Meget sjelden, under Løv og Mos paa fugtig Skovbund; den er kun taget i Nordsjælland, saaledes af Konsv. Løvendal i Ermelund, af Arkitekt Koch i Dyrehaven, ved Donse og Frederiksdal, April og Maj.

Mycetoporus Mannh.

608. *Lucidus* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 459; Thoms., Skand. Col. III. 162; Seidl., Faun. Balt. 411 — Cat. Col. Eur. III. *Mycetoporus rufescens* Steph.

Overalt sjelden; under Løv og Mos især i Skove, ogsaa i og udenfor Skove ved Svampe. Den er taget af Dr. Meinert ved Gunderslevholm og i Geel Skov, af Prof. Schiødte ved Frederikshavn, af Cand. Schlick og Sparekassedrkt. Jakobsen i Nordsjælland, af sidstnævnte tillige i Randers samt af Forfatteren flere Steder nord og syd for Aalborg: Skovlund, Hvorup, Lundby Krat, Restrup, Skørping og Lindum. Findetiderne strække sig fra April gennem alle Sommermaanederne til Oktbr.

609. *Nanus* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 463; Seidl., Faun. Balt. 412 — Cat. Col. Eur. III. *Mycetoporus nanus* Grav.

Meget sjelden og enkeltvis; i Cand. Schlicks Samling har jeg set et enkelt Stykke dateret 14. Septbr., men uden Oplysning om Findested; forøvrigt er den taget paa Falster af Kmrhr. Fabr.-Tengnagel, ved Odense af Skolebestyrer Jørgensen og Forfatteren, i Opskyl ved Limfjorden og under Mos i Hvorup ved Aalborg af Forf. Septbr. og Oktbr. afgive Findetiderne.

610. *Tenuis* Muls. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 464; Thoms., Skand. Col. III. 163; Seidl., Faun. Balt. 411 — Cat. Col. Eur. III. *Mycetoporus nanus* Er. var? *tenuis* Rey.

Af denne Art, der meget ligner *nanus* og muligt kun er en Varietet af denne, har Sparekassedrkt. O. Jakobsen fundet et enkelt Stykke ved Mariager under Lyng, 4. Aug. 84.

611. *Pronus* Er. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 465; Thoms., Skand. Col. III. 162; Seidl., Faun. Balt. 411 — Cat. Col. Eur. III. *Mycetoporus clavicornis* Steph.

Sjelden og overalt sparsomt. Den er taget forskellige Steder i Nordsjælland af Prof. Schiødte, Dr. Meinert, Cand. Schlick, Ing. Engelhart o. fl., i Jylland ved Randers under Lyng af Sparekassedrkt. O. Jacobsen samt ved Madum Sø og i en Lergrav syd for Aalborg af Forfatteren; ved Haderslev er den funden af Lærer Andersen. Findetiderne ere spredte over Foraars- og Efteraarsmaanederne.

Blandt de af Prof. Schiødte indsamlede Eksemplarer findes flere med helt sort Hoved; de tilhøre Formen *crassicornis* Fauv., der ellers kun skal forekomme Syd-Europa (Seidlitz).

612. *Splendidus* Grav. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 466; *Ischnosoma splendida* Thoms., Skand. Col. III. 165; Seidl., Faun. Balt. 410 — Cat. Col. Eur. III. *Mycetoporus (Ischnosoma) splendidus* Grav.

Udbredt overalt og ikke sjelden paa halvfugtig Bund under Løv og Mos baade i og udenfor Skove. Foraar og Efteraar.

613. *Longicornis* Mäkl. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 467; *Ischnosoma longicornis* Thoms., Skand. Col. III. 166; Seidl., Faun. Balt. 410 — Cat. Col. Eur. III. *Mycetoporus (Ischnosoma) splendidus* Grav. var *longicornis* Mäkl.

Meget sjelden paa lignende Steder som foregaaende; den er funden af Cand. Schlick i Maj 1872, paa Falster af Kmrhr. Fabr. Tengnagel 27. Marts og paa Fyen ved Odense af Skolebestyrer Jørgensen i Septbr. 84 og 85.

614. *Punctus* Gyll. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 459; Thoms., Skand. Col. III. 161; Seidl., Faun. Balt. 410 — Cat. Col. Eur. III. *Mycetoporus punctus* Gyll.

Sjelden eller meget sjelden under Løv, i Opskyl og ved Svampe. Den er funden af Dr. Meinert ved Fuur Sø, og af Konsv. Løvendal og Asstst. Holstebro ved Tidsvilde, af Skolebestyrer Jørgensen ved Odense i Hø; i

Jylland er den kun taget i Vendsyssel, nemlig ved Kølske Dam i Opskyl og ved Hvorup i Svampe. Finde-tiderne strække sig gennem alle Sommermaaneder fra Juni til Slutningen af Oktbr.

615. *Longulus Mannh.* — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 461; Thoms. Skand. Col. III. 163; *M. lepidus* Grav. = *longulus Mannh.* Seidl., Faun. Balt. 410 — Cat. Col. Eur. III. *Mycetoporus brunneus* Marsh = *longulus Mannh.* = *lepidus* Gr.

Sjelden eller meget sjelden. Den er taget ved Tids-vilde sammen med *lepidus* af Konsv. Løvendal, paa Falster ved Riserup og Gjedserodde af Arktkt. Koch, Ing. Engelhart og Kmrhr. Fabr.-Tengnagel, i Viby Krat ved Aarhus, ved Laurberg og i Dronningborg Skov af Sparekassedrkt. O. Jakobsen; fra Marts til Juni.

616. *Ruficornis* Kr. — Kraatz, Ins. Deutschl. II. 461; *M. lepidus* Grav = *ruficornis* Kr. Seidl., Faun. Balt. 410 — Cat. Col. Eur. III. *Mycetoporus brunneus* Marsh.

Af denne Art (?) har jeg en lille Række dels fra Madum Sø ved Skørping, dels fra Hvorup i Vendsyssel, Aug. 91; i andres Samlinger har jeg ikke set den.

617. *Lepidus* Grav. — Kraatz, Ins. Deutsch. II. 462; Thoms. Skand. Col. III. 163; Seidl., Faun. Balt. 410 — Cat. Col. Eur. III. *Mycetoporus brunneus* Marsh.

Almindelig overalt under Løv og Mos, i Opskyl og i Plantemøddinger; den er flere Gange taget i Myretuer saavel hos *Form. rufa* som hos *F. fuliginosa*. Den varierer meget baade i Størrelse og Farve, og det er ikke usandsynligt, at *longulus* og *ruficornis* ere kun Varie-teter af den (smllgn. Seidl., Faun. Balt. 410 og Cat. Col. Eur. III.).
