

TILLÆG TIL
FORTEGNELSERNE OVER DE I DANMARK
LEVENDE COLEOPTERA
VED
CHR. ENGELHART.

Siden Dr. Fr. Meinert i Ent. Medd. 1ste Bind bragte et større Tillæg til de indtil da udkomne Fortegnelser over danske Biller, er der i samme Tidsskrifts 2det Bind fremkommet et mindre Tillæg af Hr. W. Schlick, der imidlertid kun omhandlede ny tilkomne Arter. Endvidere har Dr. Meinert i samme Tidsskrifts 1ste Bind givet en Fortegnelse over Mycetophager, Dermester, Byrrher, Georysser, Heterocerer og Ciser, Dr. Meinert og Hr. Joh. P. Johansen en Fortegnelse over Staphyliner i 1ste, 2det, 3die og 5te Bind og Hr. E. A. Løvendal en Bearbejdelse af Tomicini i 2det Bind. Udenfor Tidsskriftet har Hr. Løvendal endelig udgivet en større Monografi: »De danske Barkbiller og deres Betydning for Skovog Havebruget«, Kjøbenhavn 1898.

Det er altsaa godt og vel 10 Aar siden der for de ældre Fortegnelser Vedkommende er fremkommet noget Tillæg, og saavel for disses som ogsaa for de senere Fortegnelser Vedkommende er der dels ved ny Indsamlinger, dels ved Bearbejdelse af ældre Materiale fundet mange ny Arter og gjort mange Iagttagelser om tidligere anførte sjeldne Arters Forekomst og Udbredelse her i Landet. Det synes derfor nu at være passende i »Entomologiske Meddelelser« at give en saavidt muligt udførlig Fremstilling af de mange forløbne Aars Udbytte, for at de Iagttagelser, som hver enkelt Samler sidder inde med, kan blive fælles Ejendom. Det er denne Opgave jeg har paataget mig at løse: at

samle det spredte Materiale og ved velvillige Bidrag fra de mange aktive Samlere at give et saa fyldigt og dog kortfattet Overblik over de ny og interessante Fund, som det er muligt. Bedst vilde det være, om en hel ny Fortegnelse kunde blive udarbejdet, men da dette vilde medføre et stort kritisk og indgaaende videnskabeligt Arbejde, hvortil jeg hverken er i Besiddelse af Evner eller Tid, har jeg maattet nøjes med at arbejde paa det gamle Grundlag, idet jeg har bibeholdt den gamle Rækkefølge og de gamle Numre og passet ny tilkommende Arter ind saa godt det har været mig muligt. Kun i enkelte Tilfælde har jeg, hvor jeg følte mig ganske sikker i min Sag, foretaget Rettelser af Navne. Heller ikke har jeg altid kunnet kontrolere de ny Arters rigtige Bestemmelse, eller om de angivne Fund af sjældne eller meget sjældne Arter ogsaa virkelig gjælder de anførte Arter.

Forøvrigt er min Opfordring til Samlerne om at yde Bidrag blevet medt med den største Velvilje, og jeg benytter herved Lejligheden til paa egne og andre Entomologers Vegne at takke D'Hrr. Stiftamtmand, Kmhr. Fabritius de Tengnagel, Oberst, Baron H. F. Rosenkrantz, Skolebestyrer N. P. Jørgensen, Overlærer L. Andersen, Cand. Schlick, fhv. Brygger Joh. P. Johansen, der har vist mig den store Imødekommnenhed at stille sine Notitser om Aleochariner og Tachyporiner, en paabegyndt Udarbejdelse af et Tillæg til Fortegnelsen over disse Grupper, til min Raadighed, fremdeles D'Hrr. Konservator Løvendal, Pastor J. Møller, Hr. A. C. Jensen-Haarup, Hr. E. Rosenberg, Lærer Esben Petersen, Assistent A. West, Stud. mag. J. C. Nielsen, Dr. C. Jørgensen og Toldassistent H. O. Holstebroe samt endnu flere, der have bidraget til at gjøre dette Tillæg saa fuldstændigt som muligt.

Med Hensyn til Familiernes Rækkefølge har jeg fulgt den Vej, som Dr. Meinert har antydet i sit »3die Tillæg«, idet jeg har tilføjet de senere tilkomne Familier i Overensstemmelse med denne Ordning. Indenfor Familierne har jeg paa to Undtagelser nær bibeholdt den samme Række-

følge, som findes i de tidligere Fortegnelser. Den første af disse Undtagelser danne Staphylinerne. Jeg har anset det for rigtigst at bruge den sædvanlige Orden, at begynde med Autalierne og gjennem de øvrige Aleochariner og Tachyporinerne gjøre Overgangen til de egentlige Staphyliner og ende med Homaliner, Protininer og Phloeocariner, efter hvilke jeg har bibeholdt Micropeplinerne, fordi de i den tidligere Fortegnelse ere nummererede i Fortsættelse dermed, skjønt der, vistnok rettelig, af nyere Forfattere anvises dem Plads mellem Histeridae og Nitidulidae.

Ved denne Ordning er Nummerrækken ganske vist blevet brudt, idet Staphylinerne begynde med Nummer 323, medens de lavere Numre findes fra midt inde i Rækken til Slutningen, men jeg har dog antaget denne Ordning for at være den systematisk rigtigste.

Den anden Undtagelse danner Barkbillerne. Disse findes i tidligere Fortegnelser nummererede i Rækkefølge med de egentlige Snudebiller, og Numrene fortsættes saa med Attelabini, Rhynchitini, Platyrhinini og Bruchini. Imidlertid foreligger nu Hr. Konservator Løvendals ovenfor nævnte Monografi over denne Gruppe, i hvilken ikke alene en stor Mængde ny Arter findes opført og enkelte Bestemmelsesfejl er rettede, men navnlig Ordningen og for en stor Del Slægtsnavnene er forandrede. Jeg finder det kun rigtigt og naturligt at følge denne Forfatter, og da det vilde være alt for vidtløftigt og uoverskueligt, ved Rettelser at indordne under de ældre Fortegnelser en Gruppe, af hvis oprindelige 42 Arter kun Halvdelen vilde optræde med uforandret Navn, medens Antallet af Arter er voxet til 52 og Rækkefølgen fuldstændigt forandret, saa har jeg skrevet en hel ny Fortegnelse paa Grundlag af Hr. Løvendals Arbejde og anvist den Plads under Overskriften »Scolytidae og Platypodidae« efter Curculionidae. Som ny Arter har jeg kun betegnet dem, der ikke findes i Hr. Løvendals Afhandling »Tomicini Danici« i Ent. Medd. III, hvilken før forudsættes bekjendt, og hvori Synonymrækken for alle øvrige Arter findes. Disse 2 nævnte Tilfælde vise, i hvor

høj Grad der traenges til en hel ny omarbejdet Fortegnelse. Som den nu er, bestaar vor Fortegnelse over danske Biller af Brudstykker, som kun med Besvær og med Tabet af Overskuelighed kan søges sammen. Til en saadan ny Fortegnelse, som man maa haabe inden alt for længe maa blive udarbejdet, hører saa en kritisk Gjennemarbejdning af hele det indsamlede Materiale, endelig Løsning af mange svævende Spørgsmaal om en Arts rigtige Bestemmelse og Udskillelse af sammenblandede Arter; og hertil maa de enkelte Samlere med Flid forberede et Materiale ved hver for sig og ved gjensidig Meddelelse at søge at komme til Klarhed over vore nuværende Arters Bestemmelse og ikke tage det for en given Ting, at den hidtil fulgte overalt er rigtig.

Ny Arter, der ikke have været anførte i nogen af de tidligere Fortegnelser eller Tillæg ere betegnede med en lille Stjerne foran Nummeret.

Carabidae.

1. **Cicindela silvatica** L. — Foruden tidligere nævnte Findesteder anføres følgende: Kaas Hede i Salling, Mai, talrig, Pastor J. Møller. Tidsvilde Hegn, Mai, Juni, flere Samlere. Bornholm, paa Lyngen mellem Arnager og Stampen, Kons. Løvendal, Dr. Jørgensen, Mr. Rye og Forf.
9. **Dromius meridionalis** Dej. — Dr. meridionalis Dejean, Sp. gén. des Coléopt. I Pag. 242. Drom. fenestratus, Schiø. Tillæg t. Danm. Karaber og Dytisker, Nat. Tidsskr. 3 R. 6 B. Pag. 402. — Denne Art blev indført af Prof. Schiødte under Navnet *Dr. fenestratus* Dej. i Fortegnelsen af 1870. Da jeg i England fandt Exemplarer, der var fuldkomment identiske med vore, og blev gjort opmærksom paa, at disse var *Dr. meridionalis* Dej., har jeg underkastet Spørgsmaalet en mere indgaaende Prøvelse; ved Velvilje fra Hr. Dr.

Eug. Reitter i Paskau, hvem jeg herved bringer min bedste Tak, fik jeg paalideligt bestemte Exemplarer af *Dr. fenestratus* Dej. og *meridionalis* Dej. tilsendt og blev derved istand til bestemt at konstatere, at vore Individer tilhøre den sidstnævnte Art. Dr. Schaum mener, at den, uagtet den er af bredere Form, er identisk med *angustus* Er., men selv om dette var Tilfældet, bør Dejeans Navn bibeholdes, da det er det ældste, og hans Beskrivelse er fuldkommen klar og afgjørende. At der kunde ske en Fejltagelse ved Bestemmelsen af en Dromius, er iøvrigt meget let at forstaa, da Forskjellighederne mellem de nærstaende Arter ere af en Natur, der vanskeligt kan beskrives, omend de ere lette at se, naar man har en Række Exemplarer af Arterne ved Siden af hinanden.

- *17a **Blechrus glabratus** Dft. — *Lebia glabrata* Duftschmid, Fn. Austr. II. Pag. 248. *Blechrus glabratus* Schaum, Nat. d. Ins. Deutschl. I. Pag. 275. (*femoralis* Marsh.). — Under Bark paa en Fyrrestamme ved Spangsbjerg Mølle ved Esbjerg, $10/4$ 1898, 1 Stk., Asbo ved Vejen St., i Antal, i Sommeren 1898, Jensen-Haarup. Enkelt ved Løsning pr. Horsens, Konservator Løvendal. Disse Fund ere allerede omtalte i Ent. Medd. 2. R. p. 98—102.
- 17a. **Blechrus maurus** St. — Denne Art synes at være meget udbredt og ingenlunde sjælden. Foruden tidligere nævnte Findesteder anføres følgende: Als, Juli, L. Andersen. Salling, August, Pastor J. Møller. Diger ved Bremersvold, Lolland, Juni, Forf.
- 20. **Lebia crux minor** L. — Rudehegn, Juni, August og September samt Gels Skov, Juni, oftest kætset, Wielandt. Bornholms Sydkyst, nær Arnager, Juni, 1 Stk., siddende paa en Sten, og Brede, Nordsjælland, April, under en Sten paa et Jorddige, Dr. Jørgensen. Bognæs, Aug., enkelt samt Freerslev Hegn, Nordsjælland, 3 Stkr., Mai, Baron Rosenkrantz, Grib Skov, April,

- Frederiksborg, April, Mai og Oktober, samt Tidsvilde Hegen, Juli, J. C. Nielsen.
24. **Cymindis basalis** Gyll. — Enkelt, under en Sten paa en lille Lynghede ved Lillerød Station, April, E. Rosenberg. Asserbo Overdrev, i en Sandgrøft, enkelt, Mai, Stud. mag. A. Ditlevsen.
- 25a **Masoreus Wetterhallii** Gyll. — En lille Række paa Refsnæs, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelte Stkr. ved Esbjerg, Fanø og Asbo ved Vejen Station, Jensen-Haarup. Enkelte Stykker paa Stranden udfør Kongelunden, Amager, September samt i Tidsvilde Hegen i Juli, Rosenberg.
28. **Dyschirius obscurus** Gyll. — Esbjerg, i stort Antal, under Tang ved Stranden, Mai, Juni, flere Samlere. Tidsvilde, Juli, J. C. Nielsen.
- 31a. **Dyschirius angustatus** Ahr. — Dette sjældne Dyr, hvoraf tidligere kun et enkelt Exemplar var fundet, uden Angivelse af bestemt Lokalitet, er nu fundet af Kmhr. Fabritius de Tengnagel ved Møens Klint i Juli Maaned (9 Stkr.) samt paa Fane i August, enkelt.
32. **Dyschirius inermis** Curt. — Enkeltvis under Tang paa Stranden ved Esbjerg, Mai, Juni flere Samlere. Vester Fælled, Juni og September, flere Samlere.
34. **Dyschirius impunctipennis** Dws. — I stort Antal under Tang paa Stranden ved Esbjerg, Mai, Juni, flere Samlere.
36. **Anisodactylus nemorivagus** Dft. — Lillerød, April, 1 Stykke, Stud. mag. Ditlevsen.
38. **Anisodactylus pseudoaeneus** Dej. — Ved Frederiksholm Teglværk og Kongens Enghave ved Kjøbenhavn, Mai, Juni og Juli, i Antal, Baron Rosenkrantz.
40. **Ophonus punctatulus** Dft. — En lille Række samlet omkring Lyngby af Prof. Gædeken. I stort Antal paa en Mark ved Hillerødsholm, J. C. Nielsen. Under Tang ved Alssund, Mai, enk., L. Andersen.
43. **Ophonus puncticollis** Payk. — Herr A. C. Jensen-Haarup meddeler, at han har truffet denne Art i An-

tal i Skjermene paa den vilde Gulerod, *Daucus carota*. I lukkede Skjærme fandtes ofte et større Sel-skab af Billen, og i saa Tilfælde var Frøene for en stor Del fortærede.

- *43a. **Harpalus hospes** St. — H. hospes Sturm. Deutschl. Ins. IV. Pag. 88. Schaum. Nat. d. Ins. Deutschl. I. Pag. 582. — Et enkelt Stykke ved Kalkbrænderiet N. f. Kjøbenhavn, Kapt. Wielandt.
- 47. **Harpalus distinguendus** Dft. — Gjedser, August, enk. Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- 51. **Harpalus luteicornis** Dft. — En halv Snæ Stykker, i en lille Skov Nord for Odense, nær Stavisaa, Mai, Skolebestyrer Jørgensen.
- 52. **Harpalus seriepunctatus** Gyll. — Allinggaards Skov ved Silkeborg, i Antal, Esben Petersen. Stenderup Skov ved Kolding, E. Jürgensen.
- 53. **Harpalus fuliginosus** Dft. — Sødringholm, 5 Stkr., Juli, August, Baron Rosenkrantz. Enkelte Stykker ved Harboør, Langaa, samt i Tidsvilde Hegn, Juni og Juli, Forf.
- 56. **Harpalus servus** Dft. — Enkeltvis paa Stranden ved Esbjerg, Jensen-Haarup. Et Stk. ved Silkeborg, Esben Petersen.
- 59. **Harpalus picipennis** Dft. — Et enkelt Stk. ved V. Gjester nær Vejen Station, Jensen-Haarup. Stranden ved Tissø, Juni, Rosenberg. Et Stk. ved Arnager paa Bornholms Sydkyst, Forf.
- 65. **Harpalus hirtipes** Panz. — Var i Aaret 1895 al-mindelig paa en Sandmark ved Hillerød, J. C. Nielsen. Et Stykke i Haarup ved Horsens, Jensen-Haarup. Tidsvilde, i Antal, Juli, Stud. mag. Ditlevsen.
- 68. **Bradyceillus cognatus** Gyll. — Enkelte Aar almin-delig, i April—Juli og igjen i Oktbr., ved Stranden udfor Frederiksholm Tegl værk ved Kjøbenhavn. Strand ved Udbyhøj, Randers Fjord, i Antal, September, H. O. Holstebroe.
- 71a. **Bradyceillus verbasci** Dft. — Vejle, Kolding og Om-

- egen, August og Septbr., E. Jürgensen. V. Ulslev Præstegaardshave, Lolland, Septbr., Pastor J. Møller. Gram, Nordslesvig, en lille Række, April, Kapt. Wielandt. Enkeltvis i Randers Egnen og Taps Nørreskov, Septbr. og Oktbr., H. O. Holstebroe. Ræbild Bakker ved Skjørping, August, Møen, August, enkeltvis, Forf. Arten, der formodentlig ofte er overset, synes altsaa at være udbredt omend sjælden.
73. **Balius consputus** Dft. — Ved et Kjær i Kjeld-Skov, Bremersvold, Lolland, sparsomt i Juni og Juli, i Sel-skab med *Stenolophus vespertinus*, H. O. Holstebroe. Gaabense, April, 1 Stk., Dr. C. Jørgensen. Enkelt ved Gram, Nordslesvig i September, Wielandt. 2 Stkr. ved Damhusse, Mai, Rosenkrantz.
76. **Stenolophus vespertinus** Panz. — Enkelt i Sattrup Skov, Mai, Joh. Andersen. Jægerspris, Mai, Rosenberg. Bremersvold, Juni, Juli, flere Samlere.
78. **Acupalpus flavidollis** St. — Bøllemosen, Mai, i Antal, Wielandt. Tidsvilde, enkeltvis, Juni, Holstebroe. Hattemose, Nordsj., April, 1 Stk., Rosenberg.
81. **Acupalpus exiguum** Dej. — En lille Række ved et Vandhul i Knudskov paa Vejen til Knudshoved, April, Forf.
82. **Zabrus gibbus** F. — I Aarene 1891—94 meget hyppig i Juni og Juli Maaned, i Amtmandshaven, Nykjøbing F., senere kun enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Paa Kornmarker paa Als i Mai, ikke sjælden, L. Andersen.
91. **Amara melancholica** Schiø. — Enkelte Stykker paa Tebbestrup Bakker ved Randers, April, Holstebroe.
92. **Amara infima** Dft. — I Antal paa Lyngbakker ved Ræbild nær Skjørping Station i August, Johansen, Forf. Enkelt mellem Esbjerg og Hjerting, August, Jensen-Haarup. Enkelt ved Silkeborg, Esben Petersen.
94. **Amara rufocincta** Sahlb. — 2 Stkr., Salling, i August, Pastor J. Møller. Enkeltvis men ret hyppig omkring

- Silkeborg, Esben Petersen. Enkelte paa Stranden ved Esbjerg, Jensen-Haarup.
98. **Amara familiaris** Duft. — Hr. A. C. Jensen-Haarup meddeler, at han den 18 Mai 90, en klar, varm Foraarsdag, ved Vejle har iagttaget denne Art i Færd med at fortære Kronbladene, Støvdragerne (og vistnok ogsaa Støvvejene) samt uudsprungne Knopper af en Fladstjerneart. Som allerede kjendt tidligere, er *Zabrus gibbus* plantædende, og *Ophonus punctatulus* og *puncticollis* fortære utvivlsomt Frøene af forskjellige Skjærmblomster. Videre Iagttagelser til Belysning af hvorvidt andre Medlemmer af Carabernes hovedsagelig kjødædende Familie skulde tage til Takke med, eller maaske endog foretrække Plantefæde vilde være af meget stor Interesse.
 100. **Amara formosa** Schiø. — Et enkelt Stykke paa Stranden ved Blokhus, Johansen.
 101. **Amara lunicollis** Schiø. — Almindelig under Tang paa Stranden ved Esbjerg, flere Samlere. Enkeltvist men ikke sjælden omkring Silkeborg, Esben Petersen.
 107. **Amara trivialis** Dft. — Enkeltvist ved Lindum samt i Sønderjylland, Johansen.
 - *109a. **Amara strenua** Zimm. — Am. strenua Zimmermann, Gistel's Faunus I. Pag. 32, Schaum, Nat. d. Ins. Deutschl. I. Pag. 520 (vectensis Daws). — Et enkelt Stykke af denne Art er fundet af Hr. A. C. Jensen-Haarup ved Esbjerg, vistnok ved Stranden umiddelbart Nord for den nævnte By.
 110. **Amara plebeja** Gyll. — Den 13. 6. 97 fandt Hr. Kontorbestyrer G. Bonfils denne Art i hundredevis siddende paa Straaene af *Alopecurus geniculatus* ved den udtrørrede Ebberød Dam i Rude Hegn.
 117. **Pterostichus picimanus** Panz. — Hr. Pastor J. Møller har fundet et enkelt Stykke af denne særdeles sjældne Art under en Sten paa Lerbund ved Handermelle, Lolland, den 12. August.
 128. **Pterostichus aterrimus** Payk. — Bornholm, Nord for

- Rønne, en lille Række, Juni, Johansen. Ved Fure Sø og Skovrød Dam, April, Mai, flere Stykker, Rosenberg.
136. **Dolichus flavidornis** F. — Fund anføres fra Helsingørsegnen, Vallø, Møen samt Egnen om Lyngby, hvor Arten er udbredt og oftere er tagen i Antal.
137. **Calathus rotundicollis** Dej. — I Antal i Grønbæk Præstegaards Have, Esben Petersen. Enkelt i Bremerstvold Skov, September, Pastor J. Møller.
146. **Anchomenus quadripunctatus** de G. — Enkelt paa Bornholm, Juli, Baron Rosenkrantz og Kmhr. Fabritius de Tengnagel, der angiver at have taget den under Tang ved Stranden. 2 Stkr. paa Møens Klint, Juni, under Bark paa en Bøge Vindfælde, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
148. **Anchomenus ericeti** Panz. — Enkelt paa Lundby Bakker ved Aalborg, Septbr., Johansen. Et Stykke, Resdal, samt 6 Stkr. i Allingskovgaards Mose, Silkeborg Egnen, Esben Petersen. Et Stykke samme Sted, i November, Forf.
151. **Anchomenus elongatus** Fisch. — Bornholm, Juli, paa Stranden, mange, Baron Rosenkrantz.
157. **Anchomenus micans** Nicol. — Flere Stykker paa Allingskovgaards Mark ved Silkeborg, Esben Petersen.
- *164a. **Anchomenus Krynickii** Sperk. — Anchom. Krynickii Sperk, Bull. d. Mosc. 1835. 151. 1. Schaum, Nat. d. Ins. Deutschl. I. Pag. 405. (uliginosus Er., nigerimicus Chaud.) — Hr. Kmhr. Fabritius de Tengnagel meddeler følgende: »I Kohave Skov ved Nykjøbing F. fandt jeg i Novbr.-Decbr. 1893 under Bark paa gamle Stæd, i Selskab med *Anch. angusticollis*, en Del Exemplarer af en Anchomenus med væsentlig forskjelligt og navnlig bredere Halsskjold, sorte Palper Antenner og Ben, mattre Farve, Dækvinger med mere parallele Sider og i det Hele temmelig nøje svarende til Beskrivelsen i Schaum, Nat. d. Ins. Deutschl. af *Anch. Krynickii*. Jeg er dog ikke absolut sikker paa

at Arten er holdbar». Hr. Kons. Løvendal har taget et Stykke i Kjeld-Skov, Bremersvold, som jeg har set og mener at være berettiget til at anse for nærværende Art.

170. **Chlaenius holosericeus** F. — Ulfshale Overdrev, Møen, et enkelt Stykke, Septbr., Rosenberg. Damhusssø i en Confervebunke, August, enkelt, Stud. med. Rasch. Bornholm, paa Stranden Syd for Rønne, Juli, en lille Række, Johansen. Gjedser, Juni, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
173. **Licinus depressus** Payk. — Under Kalk og Murbrokker ved Hammershus Ruin, Bornholm, Juni, et enkelt Stykke, B. G. Rye.
174. **Badister unipustulatus** Bon. — Oftere tagen i Antal ved et lille Mosehul i Kjeld-Skov, Bremersvold, Juni og August, Pastor J. Møller, Holstebroe og Forf.
176. **Badister humeralis** Bon. — Almindelig i Skovene omkring Odense, N. P. Jørgensen. Knudskov ved Vordingborg, April, Forf.
180. **Panagaeus quadripustulatus** St. — 1 Stk., Næsgaard, Nordfalster, Esben Petersen.
183. **Carabus glabratus** F. — Enkeltvis ved Donse i Mai, Kapt. Wielandt, Gels Skov og Helsingør i Juni, Baron Rosenkrantz, ved Flensborg L. Andersen.
185. **Carabus convexus** F. — Enkelte Aar almindelig ved Eisbøl, Haderslev, L. Andersen.
189. **Carabus intricatus** L. — Oftere gjenfunden i Skovene omkring Silkeborg: Vesterskoven, enkelt, Jacobsen, Gjessø i Antal, Lærerne S. Pedersen og Esben Petersen og Forf., oftest sent om Efteraaret, Oktober og November, under Mos og Lav paa Stubbe og Stammer. Nexø, Bornholm, nogle Stykker, under Stene, Juli, Stud. polyt. C. Jørgensen.
- *189a. **Carabus auratus** L. — Carab. auratus Linné Faun. Su. n. 786, Schaum, Nat. d. Ins. Deutschl. Pag. 127 (sulcatus De Geer). — 2 Stykker af denne for vor Fauna ny Art er fundne af Hr. Lærer L. Andersen

- i September 1897 paa en aaben Plads i Kobbermølle Skoven v. Flensborg.
196. **Calosoma sycophanta** L. — Hillerød, paa Vejen fra Frederiksborg til Fredensborg, 1 Stk., J. C. Nielsen. Vester Ulslev Præstegaards Have, Lolland, Juli, 1 Stk., Pastor J. Møller.
 197. **Calosoma reticulatum** F. — 1 Stk., Juli, paa Vejen fra Julianeara til Ellebæk, Sønderjylland, Joh. Andersen.
 202. **Nebria livida** L. — Vesterfælled, i Lergravene ved Frederiksholms Teglværk især i Juni, i Antal, flere Samlere, Varieteten *lateralis* ligeledes. Enkelt ved Gravenshoved, Slesvig, Juni, L. Andersen. Paa leret Marskbund ved Esbjerg, Jensen-Haarup og Forf.
 207. **Pogonus luridipennis** Ahr. — Enkelt, paa Stranden ved Esbjerg, Jensen-Haarup.
 208. **Pogonus halophilus** Nicol. — I Antal paa Stranden ved Esbjerg, flere Samlere. Ved Husum i Mængde, Juli, Joh. Andersen.
 209. **Trechus micros** Hrbst. — Et enkelt Stykke, Ebberød Dam i Rude Hegn, August, Rosenberg. Vigersted Vejen ved Kjøbenhavn, Mai, Vester Fælled, Juni, Vestre Kirkegaards Mur, Mai, samt i en Kjælder i Kjøbenhavn, September, hver Gang et enkelt Stykke, Baron Rosenkrantz. Fure Sø ved Søbredden, Juli, og Amager, under Græs paa en Grøftevold, September, begge Gange enkelte Stykker, Kapt. Wielandt. Havne-mole ved Kolding Fjord, Mai—Juli 1892, i Antal, senere forsvunden, E. Jürgensen. Enkelt i Silkeborg-egnen, Esben Petersen.
 210. **Trechus discus** F. — Græsted, August, samt Tarup, September, begge Gange et enkelt Exemplar, N. P. Jørgensen. Enkelt ved Frederiksborg, September, J. C. Nielsen. Enkelt i Kjeld-Skov, Bremersvold, August, Pastor J. Møller. Enkelt ved Kristiansminde ved Kolding Fjord, August, E. Jürgensen. Fuglesangs Have ved Lyngby, flere Stykker i Fanghuller, Juli—

- August, Stud. mag. Ditlevsen. Enkelt i Silkeborg-
egnen, Esben Petersen.
212. **Trechus obtusus** Er. — Ved Husum, Juli, 6 Stkr.,
Joh. Andersen.
213. **Trechus rivularis** Gyll. — Et enkelt Stykke, Lyngby
Mose, Sept., Baron Rosenkrantz.
214. **Trechus rubens** F. — Paa en Havnemole ved Kolding
optraadte denne Art i Oktober—November 1891 i
stor Mængde; gjenfunden i Mai 1892, men senere
forsvunden fra dette Sted, E. Jürgensen. Enkelt i
Silkeborgegngen, Esben Petersen.
216. **Bembidium quinquestriatum** Gyll. — Fortet Trekroner,
paa Mure, April og August, flere Aar, ialt 5 Stkr.,
Kapt. Wielandt. Enkeltvis paa Mure ved Stald-
gaarden, Kolding, i April og Oktober, E. Jürgensen.
Vester Ulslev Præstegaard paa Mure, Juni og August,
2 Stkr., Pastor J. Møller. Enkelt i Aalborg, Johansen.
- *220a. **Bembidium lunulatum** Fourer. — Carab. lunulatus
Fourcroy Ent. paris. 51. (riparium Oliv., biguttatum
Gyll. nec Fabr., guttula Redtb. nec Fabr.). — Ribe,
Juni, Kons. Løvendal. Esbjerg Omegn, paa Marsken,
Jensen-Haarup. Ikke truffen i Selskab med dens
nærmeste Slægtning *Bemb. biguttatum*.
229. **Bembidium cruciatum** Schio. — Kaas Strand, Salling,
paa Lerbrinker, April, Pastor J. Møller. Lønstrup,
April, Cand. mag. W. Lundbeck. Møens Sydkyst, paa
Lerbrinker med Kildevæld, August, Forf.
230. **Bembidium saxatile** Gyll. — En lille Række ved
Liselund, Møen, Juli, Baron Rosenkrantz.
234. **Bembidium bipunctatum** L. — Kristiansminde ved
Kolding Fjord, Mai, Juli, E. Jürgensen. Enkeltvis
ved Als Sund og i Sundeved, L. Andersen. Tis Sø,
Juni, paa Søbredden, flere Stykker, samt enkelt paa
Stranden ved Boserup, Mai, Rosenberg. Enkeltvis,
Esbjerg, Mai, og mange paa Stranden nær Lemvig,
Juli, Forf.
- 236a. **Bembidium paludosum** Panz. — Foruden ved Vejle,

- hvor den oftere er gjenfunnen, angives den fra Horsens Aa, Jensen-Haarup, og Kolding Aa, Mai og Juni, i stort Antal, E. Jürgensen.
237. **Bembidium nigricorne** Gyll. — Denne, som det synes, yderst sjældne Art er taget i Antal paa Strandmarken ved Udbyhøj nær Randers Fjord i September af Hr. Toldassistent H. O. Holstebroe.
241. **Bembidium normannum** Dej. — Esbjerg, paa Stranden, under Tang, i ringe Antal, flere Samlere. Enkelt paa Bornholm, Juli, Joh. Andersen.
- 243a. **Bembidium gilvipes** St. — I Antal paa Aalborg Eng, paa Tørvebund, Johansen; sammesteds, September, enkeltvis, Forf.
246. **Bembidium fumigatum** Dft. — Foruden i Kjøbenhavns Omegn, hvor denne Art undertiden kan tages i stort Antal, anføres, at den er taget enkeltvis ved Esbjerg paa Stranden, Jensen-Haarup, samt ved Sanderum, Fyn, N. P. Jørgensen.
251. **Bembidium humerale** St. — Flere Stykker i Borup og Lemming Moser i Silkeborgegennet, Lærer Esben Petersen. Allingskovgaard Mose ved Silkeborg, enkelt, November, Forf. 3 Stykker i en Mose ved Lillerød Station, Nordsjælland, i Mai og September, E. Rosenberg.
253. **Bembidium pallipes** Dft. — Paa en fugtig Lerskrænt i Skoven ved Hobro, Juni, i stort Antal, Johansen og flere Samlere. Als, Juni, men sjælden, L. Andersen. Himmelbjerget, August, N. P. Jørgensen.
- *253a. **Cillenus lateralis** Sam. — Cillenus lateralis Samouelle, The Entomologists useful Compendium, London 1819. p. 496. Bembidium laterale Brullé, Hist. nat. V. Col. 2. 168. Cillenum laterale Curtis, Brit. Ent. V. pl. 200, Schaum, Nat. d. Ins. Deutschl. I. pag. 753. (Leachii Dej.). — Som allerede anført af Hr. Jensen-Haarup i Ent. Medd. nærværende Bind p. 100, er denne Art funden paa Skallingen og paa Stranden ved Esbjerg baade Foraar og Efteraar udenfor Høj-

vandslinjen, af ham og flere Samlere. Ogsaa enkelte ved Ydre Bjerrum ved Ribe, i Mai.

259. **Elaphrus uliginosus** F. — Fra Lyngby Mose, nedenfor Skovene ved Hummeltofte, er der af Hr. Ditlevsen, Prof. Gædeken, Baron Rosenkrantz og andre Samlere efterhaanden bragt en større Række af den tilveje. Den er hovedsagelig taget i Mai. En Række er taget ved Budruplund, i Mai, af Hr. Johansen. Enkelte Stykker af Hr. Jensen-Haarup ved Horsens og Esbjerg, af Hr. E. Jürgensen ved Kristiansminde Strand ved Kolding, Juni, og af Hr. L. Andersen, ved Bøgehoved og Sverdrup ved Haderslev.
 261. **Omophron limbatum** F. — At denne Art, der iøvrigt er gjenfunden flokkevis ved Søbredder over hele Landet, ogsaa kan forekomme paa Stranden, har jeg ikke fundet omtalt og nævner derfor, at jeg fandt den i Antal, gravende imellem Sand og Stene, paa Bornholms Sydkyst, nær Arnager Fiskerleje, umiddelbart ved Bølgeslaget paa Strandbredden.
-

Dytiscidae.

1. **Haliplus elevatus** Panz. — Enkelt i Greis Aa, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Aaen ved Lundby Krat Syd for Aalborg, sidst i Mai, en lille Række, Johansen.
2. **Haliplus lineatus** Aub. — Salling, August, Pastor J. Møller. Lekkende, i Antal, Juli, Baron Rosenkrantz. I et Vandhul paa Aalholms Marker, i Antal, September, Forf.
- 7a. **Haliplus cinereus** Aub. — Et Stykke af denne sjældne Art har jeg haft staaende ubestemt i min Samling siden 1885. Den er taget ved Bremersvold paa Lolland d. $\frac{27}{5}$ nævnte Aar, men under hvilke nærmere Forhold er mig ubekjendt.

16. **Hydroporus rivalis** Gyll. — En lille Række i Vandløbet i Romdrup Eng, S. for Aalborg, August, Johansen.
20. **Hydroporus notatus** St. — I stort Antal i Vandsteder mellem Klitterne paa Fanø, Juni, Jensen-Haarup, Kons. Løvendal og Forf.
21. **Hydroporus Gyllenhali** Schiø. — Flere Gange ved Esbjerg, Jensen-Haarup.
22. **Hydroporus scalesianus** Stph. — I et Mosehul i Bøndernes Hegn, Aldershvile, Nordsjælland, i Antal, April—Mai, Holstebro, Løvendal, Forf.
25. **Hydroporus melanarius** St. — Enkeltvis ved Eisbøl, Slesvig, Mai, L. Andersen. Ved Aalborg, Johansen.
40. **Hydroporus duodecimpustulatus** F. — Rosenholm i Aug.—Sept., en lille Række, Rosenkrantz. Varde Åa, Mai, Juni og August, enkeltvis Løvendal og Jensen-Haarup.
43. **Hydroporus oblongus** Stph. — Enkelte ved Hillerød, April, Forf.
47. **Hydroporus novemlineatus** Stph. — Enkelte Stykker ved Spangsbjerg Mølle nær Esbjerg samt ved Tjæreborg, Jensen-Haarup. Enkelt ved Harboøre, i April, Forf.
51. **Hydroporus decoratus** Gyll. — Nogle faa Stykker i en Mose ved Hillerød, April, Forf.
- *67a. **Agabus affinis** Payk. — Synonymrækken uforandret.
— De i tidligere Fortegnelser angivne Findesteder gjældte efterfølgende Art. — Funden i Mængde i en med Sphagnum fyldt Grøft i Bollesager tæt ved Esbjerg. Dyret var tilstede i store Mængder selv paa Steder, hvor Vandet næsten var forsvundet, og opholdt sig da i den svampede Sphagnum-Vegetation.
68. **Agabus unguicularis** Thoms. — Eriglenus unguicularis Thomson, Skand. Col. IX. p. 101. Ag. affinis Schiøtte Damm. Eleuth. p. 474. (affinis Schaum, Kiesw. nec Payk.). — De i tidligere Fortegnelser for *Ag. affinis* givne Oplysninger gjældte nærværende Art.

73. **Agabus subtilis** Er. — En Række i Borup Mose ved Silkeborg, Lærer Esben Petersen. Enkelt i Bølle-mosen, Mai, Baron Rosenkrantz.
 74. **Agabus nigroaeneus** Er. — Et enkelt Stykke fra Nordfalster. Lærer Esben Petersen.
 95. **Dytiscus latissimus** L. — En større Række i Lyngby-egnen, især i Skovdamme i Bøndernes Hegn, Alders-hvile, April, flere Samlere. Enkelt i Kjettinge Sø, Lolland, August, Forf., i Lemming Mose, Silkeborg, Esben Petersen, i en Mose ved Julianeaa ved Flensborg, Mai, L. Andersen, samt i en Tørvegrav ved Vonsild, Juli, E. Jürgensen. Hr. Jensen-Haarup angiver, at den findes ikke sjældent i Horsensegnen.
 96. **Dytiscus lapponicus** Gyll. — Flere Steder i Midtjylland, saaledes i Antal i Mergelgrave ved Silkeborg, Esben Petersen, Salling, Sept. og Nov., Pastor J. Møller, Slotssøen ved Kolding, Sept., E. Jürgensen. Paa Sjælland enkeltvis ved Donse og Damhusssøen i April og Mai.
 99. **Dytiscus circumflexus** F. — Enkeltvis i Kjøbenhavns Omegn, Lergrav ved Kjøge Landevej, April, Baron Rosenkrantz, Amager, April, Forf. Et Aar optraadte den i større Tal i Stadsgraven i Tivoli, Marius Jensen.
 110. **Cybister Roeselii** F. — En Snæ Stykker i Hulemose Sø ved Nyraad, Oktober, Vald. Nielsen.
-

Hydrophilidae.

Af Hensyn til en under Arbejde værende Monografi over denne Familie af Hr. Konservator Løvendal skal jeg ganske afholde mig fra at medtage den i nærværende Tillæg, saameget mere, som det meste af, hvad der er fremkommet paa dette Omraade siden sidste Tillæg, skyldes Hr. Løvendals egne Iagttagelser og Indsamlinger.

Staphylinidae

- 323. ***Autalia rivularis*** Grav. — Vester Fælled, Juni, en Række, Baron Rosenkrantz.
- 326. ***Falagria thoracica*** Curt. — Hulerød, Nordsjælland, August, 2 Stkr., N. P. Jørgensen. Refsnæs, Juni, enkeltvis samt paa en Skrænt ved Guldborgsund, Juni, i stort Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- 328. ***Falagria nigra*** Grav. — Blandt Materiale, indsendt af Lærer Esben Petersen i Silkeborg til Hr. Johansen til Gjennemsyn, fandtes et noget defekt Stykke af denne Art, taget i en Grusgrav ved Gjødvad pr. Silkeborg.
- 331. ***Phytosus balticus*** Kr. — Udbredt ved vore Strandbredder, vistnok ofte overset paa Grund af sin ringe Størrelse, lyse Farve og temmelig skjulte Færden. Funden i Antal ved Esbjerg under opskyllet Tang, Juni, flere Samlere, og ved Bøtø Strand, Sydfalster, i September og enkeltvis ved Hornbæk, ved Sosa Odde og Dueodden, Bornholm, Juni og Juli af Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Fremdeles ved Ulfshale, Møen, enkelt, i Mai, af Hr. E. Rosenberg.
- 332. ***Phytosus spinifer*** Curt. — Som foregaaende og i Selskab med den. Hidtil er den dog kun funden i Antal ved Søndervig Strand i April og Bøtø i September af Kmhr. Fabritius de Tengnagel, og dens kjendte Forekomst her i Landet derfor langt mere begrænset.
- 333. ***Silusa rubiginosa*** Er. — Foruden tidligere bekjendte Fund anføres følgende: Greisdal, i Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Leire, Juni, samt Boserup Skov, Juni, begge Gange i Antal ved udflydende Elmesaft, E. Rosenberg.
- 338. ***Ischnoglossa rufo-picea*** Kr. — Enkelt, Hvedholm Dyrehave, Fyn, Aug., N. P. Jørgensen.
- 346. ***Haploglossa pulla*** Gyll. — Denne og følgende Art, der staar den meget nær, men dog ved sin langt finere Punktering, finere og kortere Behaaring, slankere

Antenner og i det hele slankere Bygning, muligvis ogsaa ved sin Forekomst, utvivlsomt bør anses for en distinkt Art, ere ofte sammenblandede, saaledes ogsaa i vor Fortegnelse i Ent. Med. V. Pag. 19. Om nærværende Arts Forekomst her i Landet er det af den anførte Grund vanskeligt at sige noget, saalænge indtil Samlerne have faaet Arterne adskilte. At *nidicola* forekommer i Sandsvalens Gange og er udbredt og almindelig, er temmelig sikkert, men hvorvidt *pulla* ogsaa findes under lignende Forhold, eventuelt i Selskab med den, er ikke bevist. I Can. Fowlers »The Coleoptera of the British Isles« angives *pulla* at leve i Sandsvalens Huller samt af og til at findes ved Kætsning og ogsaa paa Aadsel og hos Myrer. Kraatz derimod siger, at den findes ved Foden af Fyrretræer. Muligvis er de hos Hr. Johansen loc. cit. Pag. 20. angivne Fund uden for Svalereder at henføre til nærværende Art alene. Jeg har et enkelt Stykke fra Bremersvold, kætset i Skoven, og da der sikkert i hele denne Egn af Lolland ikke findes nogen Lokalitet, hvor Sandsvalen kan bygge, staar mit Exemplar sikkert ikke i noget Forhold hertil.

*346a. *Haploglossa nidicola* Fairm. — Aleoch. *nidicola* Fairmaire, Faun. ent. Franc. I. p. 451., *Hapl. pulla* (pars) Kr. Nat. Ins. Deutschl. II. p. 80. — Se iøvrigt under foregaende Art.

*349a. *Aleochara ruficornis* Grav. — Al. *ruficornis* Gravenhorst, Micr. p. 91., Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II. p. 84. (grandis Heer). — Et enkelt Stykke af denne smukke og ejendommelige Art fandtes blandt en Del Staphyliner, indsendte af Hr. Overlærer Wüstnei til Hr. Johansen til Bestemmelse. Det er taget i Madskov ved Sønderborg, paa hvilket Sted Arten, efter Hr. Wüstnei's Erfaring, forekommer sjældent og enkeltvis. Den skal forekomme i Selskab med Form. *rufa* og *fusca*, eller i Nærheden af deres Bo.

- *352a. **Aleochara nigripes** Mill. — Al. nigripes Miller Verh. d. Zool.—Bot. Ver. in Wien II. 27. Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II. 90. — Et Par Stykker under gammelt Hø og Halm paa en Mark ved Hunderup, Fyn, April—Mai, N. P. Jørgensen.
- *353a. **Aleochara inconspicua** Aub. Al. inconspicua Aubé, Annal. de la Soc. Ent. de France. 1850 p. 312. Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II. p. 107. (sponsa Fairm.). — I Dynger af visne Plantedele i Haver i Hunderup, Fyn, April og igjen September—November, en lille Række, N. P. Jørgensen. Et Stykke i en Plantedyngel paa Engen ved Fruens Bøge, November, samme.
359. **Aleochara lygaea** Kr. — Hunderup Eng, enkelt, Juli, N. P. Jørgensen.
360. **Aleochara rufitarsis** Heer. — Flere Exemplarer fundne, ved at sigte Affald af Straa i Stalde i Aalborg, November, Johansen.
361. **Aleochara brunneipennis** Kr. — Amtmandshaven, Nykøbing F., Nov., enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel; Hvedholm Dyrehave, Fyn, enkelt, Juli, N. P. Jørgensen. Lyngby, Juni, Juli, enkelte, Baron Roskrantz.
366. **Aleochara bilineata** Gyll. — Gjedser, September, en lille Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkeltvis i Oktober—November ved Odense og Hunderup, N. P. Jørgensen. Eisbøl, en lille Række, August, L. Andersen.
367. **Aleochara procera** Kr. — Enkelt i Amtmandshaven, Nykøbing F., November, Kmhr. Fabritius de Tengnagel, enkelt i Damhusmosen, April, Forf.
373. **Lomechusa strumosa** F. — Tidsvilde, Juni, enkelt, kætset, Ass. West.
374. **Atemeles paradoxus** Grav. — 2 Stkr. hos »den røde Myre« i Eisbøl, April, L. Andersen.
378. **Myrmecodia cognata** Märk. — Foruden tidligere anførte Findesteder anføres Nottet, Sønderjylland,

- hvor Hr. L. Andersen har taget et Par i April hos Myrer.
386. **Ilyobates forticornis** Lac. — En lille Række er taget af Hr. N. P. Jørgensen i Sigtegods fra Munke Mose, Fyn, i April og Mai. Enkelt i Hopstrup, kætset, Mai, Joh. Andersen.
387. **Callicerus obscurus** Grav. — Ligesom foregaaende og noget hyppigere, i Sigtegods fra Munke Mose, samt enkelt ved Dalum, April, N. P. Jørgensen; Hannerne langt hyppigere end Hunnerne. Enkelte ved Nykøbing F., April, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt, Als, kætset i Mai, L. Andersen.
388. **Calodera nigrita** Mannh. — Dalum Eng, enkelt, Aug., N. P. Jørgensen.
390. **Calodera uliginosa** Er. — Enkelte i Omegnen af Odense i April og Mai, N. P. Jørgensen, enkelt i Damhusmosen, April, Kmhr. Fabritius de Tengnagel og Forf., ved Stranden S. for Kjøge og ved Bremersvold, Lolland, Forf.
391. **Calodera riparia** Er. — Enkelte ved Nykøbing F. i April, Kmhr. Fabritius de Tengnagel, og ved Stranden S. for Kjøge, Forf.
- *392a. **Calodera umbrosa** Er. — Cal. umbrosa, Erichson, Käf. d. Mark B. p. 304. Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II. p. 145. — Blandt en Del Staphyliner, indsendte af Hr. Baron Rosenkrantz til Hr. Johansen til Bestemmelse, fandtes et enkelt Stykke af denne Art, taget paa Stranden ved Helsingør, eller muligvis fra Teglstrup Hegn, i Forsommeren 1896. Kmhr. Fabritius de Tengnagel har i April—Mai ved Nykøbing F. fundet 4 Stykker af en Calodera, som han henfører til denne Art, uden at han dog vil være ganske sikker paa Bestemmelsens Rigtighed.
393. **Chilopora rubicunda** Er. — I en Sandbrink ved Lønstrup Aa, Juni, 3 Stkr., i Selskab med »den lille graa Myre«, der oproder Sandet mellem Græsrødderne,

- Johansen. Amtmandshaven, Nykøbing F., September, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
394. **Tachyusa constricta** Er. — Ved Aaen i Greisdalen er denne Art gjenfunden i et Par Exemplarer i Juli af Kmhr. Fabritius de Tengnagel, der ligeledes har fundet den enkeltvis ved Fure Sø, i Juni. Ved Bredden af Aaen i Munke Mose, September, 3 Stkr., N. P. Jørgensen.
395. **Tachyusa coarctata** Er. — Flere Steder ved Odense Aa, Juni og September, en lille Række, N. P. Jørgensen. Nykøbing F., i Bundens af et halvt udtrætt Vandhul, August, i stort Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
397. **Tachyusa flavitarsis** Sahlb. — I stort Antal ved Breden af et lille Vandløb ved Stampen, Syd for Rønne, i Juni, ogsaa paa andre Aabredder paa samme Egn af Bornholm, flere Samlere.
398. **Tachyusa umbratica** Er. — I stort Antal ved Aaen i Lethraborgs Have og Park, Mai, Kons. Løvendal og Forf. Odense Aa ved Hunderup, Juni, en lille Række, N. P. Jørgensen. Sorø, Mai, og Nykøbing F., August, en halv Snes Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- *399a. **Tachyusa concolor** Er. — Tach. concolor Erichson, Gen. Spec. Staph. 126. 100., Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II. p. 155. (lata Kiesw.). — Nykøbing F., August, 2 Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
400. **Ocyusa maura** Er. — En længere Række i Opskyl, fra en Tørvemose ved Hillerød, April, Forf. Enkeltvis, Vosemose ved Odense, i Opskyl, Marts og Mai, N. P. Jørgensen, og Sorø Sø, Marts, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
402. **Oxypoda ruficornis** Gyll. — Enkelt i en Gedehamse rede ved Vejle Sø, Nordsjælland, Oktober, Hr. E. Rosenberg. Enkeltvis ved Marienlund, September, og Hunderup, April, N. P. Jørgensen.
404. **Oxypoda metatarsalis** Thoms. — Enkeltvis i Sigte-

gods fra Odense Omegn, Mai, Juni, September og November, N. P. Jørgensen.

- *409a. **Oxypoda funebris** Kr. — Ox. funebris Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II. p. 185. — Blandt nogle af Forf. til Hr. Johansen til Bestemmelse indsendte Staphyliner fandtes et enkelt Stykke af denne Art fra Vindstrup, Sydsjælland, taget i Juni.
- *410a. **Oxypoda rupicola** Rye. — Ox. rupicola Rye, Ent. Monthl. Mag. III, p. 66. — Hr. Johansen har to Exemplarer af denne Art, fundne henh. ved Lundby Bakker, Aalborg, i Mai, og Skjørping Skov, i April. Det er lykkedes ham at bestemme disse Stykker, som henstod ubestemte i hans Samling, ved Hjælp af Can. Fowlers Col. of Brit. Isles.
- 416. **Oxypoda flava** Kr. — Et enkelt Exemplar taget hos Form. fuliginosa i en hul Eg i Tokkekjøb Hegn, Nordsjælland, Mai, Forf.
- *417a. **Oxypoda incrassata** Muls. — Homalota incrassata, Mulsant, Opusc. Entom. I. p. 32., Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II. p. 181. (brevicornis Muls. & Rey.). — Blandt nogle Staphyliner, indsendte af Forf. til Hr. Johansen til Bestemmelse, fandtes et enkelt Stykke af denne Art, taget i Jægersborg Dyrehave i Mai.
- *419a **Oxypoda amoena** Fairm. — Ox. amoena, Fairmaire, Faune ent. Franc. p. 436. — Oxypoda flavicornis Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II p. 185. — Enkelt i Lundby Krat, ved at sigte Svampe, voksende paa Stubbe, Oktober, samt i Sigtегods sendt fra Hr. Lærer Esben Petersen, fra Silkeborg, ligeledes i Oktober, Johansen.
- 422. **Homalota insecta** Thoms. — Enkelt, Dueodden, Bornholm, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- 423. **Homalota velox** Kr. — 3 Stkr. ved Nykjøbing F., Februar og Marts, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- 424. **Homalota pavens** Er. — 3 Stkr. ved Lethraborg, April—Mai, Forf. Enkelt ved Fruens Bøge, Odense, Okt., N. F. Jørgensen.
- 426. **Homalota languida** Gr. — Udenfor Sjælland er denne

- Art fundet af Hr. N. P. Jørgensen i Munke Mose ved Odense i Februar 1898, dog kun enkelt.
427. ***Homalota silvicola*** Fuss. — Bøllemosen, en lille Række, i April, Baron Rosenkrantz.
432. ***Homalota umbonata*** Er. — Enkelt i Echodalen, Bornholm, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkeltvis, Eisbel, sightet, April, L. Andersen.
436. ***Homalota Gyllenhali*** Thoms. — Et Par Stykker i Sundby Storskov, Lolland, Marts, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
439. ***Homalota terminalis*** Gr. — Nykjøbing F., enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Djornis Strand, Sønderjylland, Oktober, enkelt, L. Andersen.
442. ***Homalota luteipes*** Er. — Møens Klint, Juli, og Ringkjøbing Fjord, August, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Aaabredder i Munke Mose, Mai—Juni, September og November, en lille Række, N.P. Jørgensen.
445. ***Homalota ripicola*** Kiesw. — Et enkelt Exemplar er fundet i Opskyl, i Mai, Fure Sø, et andet ved Odense Aa, Juli, af Hr. N. P. Jørgensen.
446. ***Homalota fallax*** Kr. — Enkeltvis ved Gjedser, Mai, og ved Ringkjøbing Fjord, August, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- *446a. ***Homalota fragilis*** Kr. — *Homalota fragilis*, Kraatz i Stett. ent. Zeitg. 1854. p. 125. Nat. d. Ins. Deutschl. II. p. 223. — Blandt Staphyliner, indsendte af Hr. Overlærer Wüstnei til Hr. Johansen til Bestemelse, fandtes 2 Stkr. af denne Art, tagne i April 95, formodentlig ved Alssund i Nærheden af Sønderborg.
- *446b. ***Homalota longula*** Heer. — *Hom. longula* Heer, Fauna Col. helv. I. p. 334. — *thinobioides* Kraatz, Stett. Ent. Zeitg. 1844 p. 125, Nat. d. Ins. Deutschl. II. p. 228. — Gjedser, paa Stranden, September, i Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
447. ***Homalota halobrecta*** Sharp. — (Navnet bør stavses som her anført og ikke som i Hovedfortegnelsen i

- Ent. Medd. V. Pag. 53). — Møens Kyst, under Fyret, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt ved Asnæs, August, N. P. Jørgensen.
448. **Homalota puncticeps** Thoms. — Kjerteminde, April; almindelig ved Dyreborg og paa Lyø, August, N. P. Jørgensen.
449. **Homalota occulta** Er. — Nykøbing F., Marts og November, i Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt i Opskyl ved Fjorden ved Aalborg, September, Johansen. Hunderup, i Plantedynger, Marts, Oktober, November, en lille Række, N. P. Jørgensen. Løvrigt gjælde vistnok de fleste Angivelser fra tidligere Tid den følgende Art, der har været forvexlet eller sammenblandet med nærværende.
- *449a. **Homalota fungivora** Thoms. — Bessobia fungivora Thomson, Skand. Col. IX p. 250. (gibbera Muls. & Rey.). — Saavel i Skovene ved Sorø som i Kohaveskov ved Nykøbing F., i Oktober, i Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. I en Plantemødding i en Have i Aalborg, September; flere Expl. var da endnu bløde, Johansen.
- *449b. **Homalota picipes** Thoms. — Atheta picipes Thomson i Öfvers. Vet. Ac. Förh. 1856. p. 99. (excavata Muls. & Rey.). — 3 Stkr. fra Sjælland (?) findes i Hr. Johansens Samling. De er fundne i Svampe.
450. **Homalota monticola** Thoms. — Et Par i gammel Halm ved Næsbyhoved, Aug., N. P. Jørgensen.
451. **Homalota incana** Er. — Ullerslev, Mai, Dalum, April, en Række, N. P. Jørgensen.
452. **Homalota nigella** Er. — Haderslev Dam, Mai, fire Stkr., L. Andersen.
458. **Homalota marina** Muls. — Metaxya marina, Mulsant & Rey, Opusc. Ent. II. 1853. p. 39. (thinobia Thoms., imbecilla Waterh., Sharp.). — Ved nærmere Bestemmelse har den i Hovedfortegnelsen under Navnet *H. magniceps* opførte Art vist sig at være fejlagtig bestemt, og Navnet bør forandres til det nærværende. Foruden det i Hovedfortegnelsen anførte Fund er

denne Art taget af Hr. Skolebestyrer N. P. Jørgensen i opskyllet Tang ved Mineslund paa Asnæs og ligeledes ved Dyreborg og Lyø, alle i August, ialt 8 Stykker.

- *459a. **Homalota rufo-testacea** Kr. — Hom. rufo-testacea Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II. p. 245. (atricapilla Muls. & Rey.). — Et Par Stykker angives at være kætsede af Hr. Overlærer Wüstnei ved Alssund, i Randen af Sattrup Skov. (Se Wüstneis Fortegnelse over Biller fra Sønderborg og Omegn).
- 469. **Homalota palleola** Er. — Et Par Stykker i Bølle-mosen, Mai, Baron Rosenkrantz.
- 472. **Homalota parallelia** Mannh. — I en Myretue i Nottet, Marts, enkelte Stykker, L. Andersen.
- 480. **Homalota validicornis** Mrkl. — Greisdal, i Juli, en mindre Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- 490. **Homalota divisa** Mrkl. — Grib Skov og Asnæs, August, 4 Stkr., N. P. Jørgensen.
- 499. **Homalota cinnamomea** Grav. — Greisdal, i Smuldet fra Cossusgange i en Poppel, en lille Række, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- *499a. **Homalota hospita** Mrkl. — Hom. hospita Märkel i Germ. Ztschr. V. p. 216., Kraatz Nat. d. Ins. Deutschl. II. p. 290. (castanea Aubé). — Sammen med foregaaende 2 Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- 501. **Homalota dilaticornis** Kr. — Møens Klint, Juli, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- 506. **Homalota inquinula** Er. — Omkring Odense, flere Steder i Plantedynger, især i Efteraarsmaanederne. Ogsaa ved Vallø, Juli, og Langesø, Fyn, August, en længere Række, N. P. Jørgensen. Et enkelt Exemplar fra Brede Krat, April, fandtes iblandt Staphyliner indsendte af Forf. til Hr. Johansen til Be-stemmelse.
- 507. **Homalota marcida** Er. — Flere Steder paa Falster, men enkeltvis, i September og November, Kmhr. Fa-britius de Tengnagel.

508. **Homalota intermedia** Thoms. — Damhussø, April, Sorø, Oktober, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt, Lyksborg, Juni, L. Andersen.
512. **Homalota laevana** Muls. — Enkeltvis ved Vallø, Juli, N. P. Jørgensen.
- *512a. **Homalota cinnamoptera** Thoms. — Atheta cinnamoptera Thomson i Öfv. Vet. Ac. Förh. 1806. p. 105. — Enkelt, Rugballegaard, ved Vejle, Sept., Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
516. **Homalota angusticollis** Thoms. — Enkelt i Vosemose, September, N. P. Jørgensen.
518. **Homalota palustris** Kiesw. — Amtmandshaven i Nykjøbing F., Mai, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Hobro, Juni, enkelt, Forf.
524. **Homalota stercoraria** Kr. — Enkelt i Eisbøl, April, L. Andersen.
526. **Homalota subsinuata** Er. — Et Par Stykker i Gnavsmuld ved Tørning, Mai, L. Andersen.
530. **Homalota orbata** Er. — Et Par Stykker i Eisbøl, April, L. Andersen. Enkeltvis ved Kjøge, Mai, Forf.
531. **Homalota clientula** Er. — Møens Klint, enkelt, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Flere Gange i Jægersborg Dyrehave i Kompostdynger, April, Forf.
534. **Homalota caesula** Er. — En lille Række paa Hornbæk Strand, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkeltvis paa Stranden ved Esbjerg, Juni, og Ræbild Bakker, Juni, Forf.
540. **Schistoglossa viduata** Er. — Et Par i Opskyl, Sanderum Mose, Mai, N. P. Jørgensen.
- *540a. **Diglossa mersa** Hal. — Diglossa mersa Haliday i Ent. Mag. IV. p. 252. (submarina Fairm.). — Denne interessante Art er hidtil kun fundet ved Esbjerg, dels under smaa Sten paa et Sted ved Kysten, der ved Flodtid overskyllles af Havvandet, dels, efter en Storm, under Tang, skyllet hejt op paa Land. Fundet er iøvrigt omtalt af Hr. Jensen-Haarup i nærværende Bind af Ent. Medd. Pag. 102.

545. **Encephalus complicans.** Westw. — Enkeltvis ved Odense, Februar og April, N. P. Jørgensen, i Rude Hegn, Juli, E. Rosenberg, kætset i Fortunens Indelukke, Oktober, Kapt. Wielandt, og i Kompostdynger i Jægersborg Dyrehave, Mai, Forf.
548. **Gyrophaena laevipennis** Thoms. — Enkelt ved Gjerrup, Fyn, Juni, N. P. Jørgensen.
552. **Gyrophaena pulchella** Heer. — I Antal ved Sørø, Oktober, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
555. **Gyrophaena minima** Er. — En lille Række, Tommerup, Fyn, Juni, N. P. Jørgensen.
556. **Gyrophaena manca** Er. — Enkelt ved Vallø, Juli, N. P. Jørgensen.
562. **Gymnusa brevicollis** Payk. — Enkelt ved Furesø, nær Frederikslund, Juli, Rosenberg. Jeg skal nævne, at jeg ved Bøllemosen, hvor Dyret iøvrigt er taget enkeltvis af mange Samlere, en Gang i Selskab med Hr. Toldassistent Holstebroe har taget en større Række, ved at lægge det vaade og dyndede Opskyl ud i Vandet, hvorved alle de Dyr, der opholdt sig deri og som vanskeligt kunde drives ud ved Sigtning eller paa anden Maade, kom op paa Overfladen af Vandet og saaledes let kunde tages.
568. **Trichophya pilicornis** Gyll. — Enkelt ved Maribo, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
574. **Tachinus subterraneus** L. — Enkelt i Greisdalen, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
580. **Tachinus elongatus** Gyll. — Enkelt ved Rævkjær, Sønderjylland, Mai, L. Andersen. I Bramdrup Skov ved Kolding har jeg kætset 2 Stykker henimod Solnedgang i Juni Maaned, og paa Stranden ved Harboøre har jeg en Dag i Juni fundet Dyret i Antal krybende op ad Strandbredden, med Vingerne klæbende paa Bagkroppen.
582. **Tachyporus abdominalis** Gyll. — Sørø, September, et Par Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelte ved Eisbøl, August, L. Andersen.

583. **Tachyporus solutus** Er. — Enkelt ved Eisbøl, August, L. Andersen. Sorø, April, nogle Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Lethraborg, April, Søborg, Nordsjælland, August, ikke sjeldent ved Odense i Foraarsmaanederne, N. P. Jørgensen.
586. **Tachyporus ruficollis** Grav. — 2 Stykker ved Eisbøl, September, L. Andersen. Ogsaa disse Stykker have første Led i Bagfædderne længere end andet, jfr. Hr. Johansens Bemærkning i Ent. Medd. V. p. 92.
590. **Tachyporus transversalis** Grav. — Ullerslev, April, Munke Mose, Mai, i Antal, i Opskyl, N. P. Jørgensen.
592. **Lamprinus saginatus** Grav. — 12 Stykker i Opskyl fra en Eng ved Dalum, Fyn, April, N. P. Jørgensen.
593. **Conosoma litoreum** L. — 3 Stykker ved Eisbøl, August, L. Andersen.
594. **Conosoma bipustulatum** Grav. — Sundby Storskov, Lolland, Juni, et Par Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
611. **Mycetoporus pronus** E. — Lyngby Mose, April og Greisdalen, Juli, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
615. **Mycetoporus longulus** Mannh. — Styding, Sønderjylland, enkelt, Mai, L. Andersen.
616. **Mycetoporus ruficornis** Kr. — Thisted, Mai, et Par Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
3. **Leistotrophus nebulosus** F. — Rosenholm, August, skarevis, Baron Rosenkrantz. Vallø, Juli, en lille Række paa udlagt Aadsel, N. P. Jørgensen. Ikke sjeldent i Skovene ved Kolding, E. Jürgensen; iøvrigt enkeltvis fra Lokaliteter over hele Landet og Sønderjylland.
5. **Staphylinus sterecorarius** Oliv. — Dyrehaveskov ved Kolding, Juli, E. Jürgensen. Lyngby Mose, klækket 16 Juni, Rosenberg. Enkeltvis, Hornbæk, Tidsvilde og Hulerød i Nordsjælland i August, samt ved Odense, Juni, og ved Jul Sø, Juli, N. P. Jørgensen.
6. **Staphylinus latebricola** Grav. — Enkeltvis, Salling,

- Juli, Hedebund, Pastor J. Møller, Roskilde og Bursø paa Lolland, Juli, O. Holstebroe, Rugballegaard ved Vejle, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel, Bølle-mosen, April, Baron Rosenkrantz og Lyngmosen ved Lillerød Station, Nordsjælland, Juni, Forf.
7. *Staphylinus fulvipes* Scop. — Lyngby, Mai, et Par, samt Bølle-mosen, April og Mai, en Række, Baron Rosenkrantz. Lersøen, enkelt, Mai, Assistent West. Hornbæk Plantage, Juni, enkelt, E. Rosenberg.
 12. *Ocypus cyaneus* Payk. — Enkelt, i Hornbæk, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 13. *Ocypus similis* Payk. — I Amtmandshaven, Nykøbing F., temmelig hyppig i Maanederne fra Marts til Mai og igjen i September, hyppigst i April, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. I Eisbøl og Moltrup, i Sønderjylland, April og Mai, temmelig almindelig, L. Andersen. Enkelt ved Tarup, Fyn, i April, under Mos, N. P. Jørgensen.
 15. *Ocypus fuscatus* Grav. — Enkelt i Sundby Storskov, Lolland, i Marts, Kmhr. Fabritius de Tengnagel, i Eisbøl, Mai, L. Andersen samt i Tarup, Fyn, Juni, og Søborg, Nordsjælland, Juli, N. P. Jørgensen.
 18. *Tasgius ater* Grav. — Møens Sydkyst under Tang, ikke sjeldent, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Eisbøl, Mai, et Par Stykker, L. Andersen. Odense, Dyreborg og Bjørnø, Juli, August og September, en lille Række, N. P. Jørgensen. Trekroner, Mai og September, en Række, Kapt. Wielandt. Ved Korsør Nor under Tång, Juli, almindelig, Forf.
 20. *Anodus compressus* Marsh. — Enkeltvis ved Sorø, Juli og Kohaveskov ved Nykøbing F., Oktbr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Frederiksdal, under Sten ved Søbredden, Juli, samt Vejle Sø i Nordsjælland, Aug., enkeltvis, Kapt. Wielandt. Enkelt ved Spurveskjul, Oktober, Ass. West.
 22. *Philonthus intermedius* Lab. — Enkeltvis i Frederikshaab Plantage, Vejle, Juli, og Kohaveskov, Ny-

kjøbing F., Marts og Oktober, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Ved Bredden af Jul Sø, paa en død Fisk, August, enkelt, og ved Odense, Marts og April, enkeltvis, N. P. Jørgensen. 2 Stkr. i Eisbøl, August, L. Andersen.

25. **Philonthus carbonarius** Gyll. — Hyppig omkring Odense; Amager, i September, og Søborg, Nordsjælland, i Juli. N. P. Jørgensen. En lille Række i Eisbøl, Juni, L. Andersen.
26. **Philonthus succicola** Thoms. — Almindelig omkring Odense; ogsaa ved Vallø, Hvedholm og Vejle, N. P. Jørgensen.
- *26a. **Philonthus addendus** Sharp. — *Philonthus addendus* Sharp, Proc. Ent. Soc. Lond. V. 440. Kraatz, Berl. Zt. 1868. p. 351. — 8 Stykker, tagne i Omegnen af Odense i Maanederne fra Juni til September af Hr. Skolebestyrer N. P. Jørgensen, menes sikkert at tilhøre denne Art.
28. **Philonthus atratus** Grav. — Odense, Mai og September, Fænsø og Vejle, Juni, N. P. Jørgensen.
29. **Philonthus umbratilis** Grav. — Ikke sjeldent ved Sorø, Marts og September, nogle Stykker ved Nykjøbing F., Mai, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Laven, Juli, Sanderum og Dyreborg, Juli, N. P. Jørgensen. Enkelt i Tørning, Sønderjylland, Mai, L. Andersen.
30. **Philonthus cephalotes** Grav. — En lille Række i Eisbøl, Juni, L. Andersen. Amager Fælled, i Juli, enkelt, Harboøre, i Juni, en lille Række og Taps ved Kolding, i September, enkelt, Forf.
33. **Philonthus fuscus** Grav. — Aalborg, 15. Marts, i træskede Popler, en lille Række, Johansen.
36. **Philonthus corvinus** Er. — Enkelt ved Tørning, Mai, L. Andersen. I Mos paa Kildebund, Ravnkilde ved Skjørping Station, August, enkeltvis, Joh. P. Johansen og Forf. Enkelt, Lyngby Mose, Mai, Forf.
38. **Philonthus ventralis** Grav. — Amtmandshaven, Nykjøbing F., April, i Antal, og Møens Klint, September,

- en lille Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Haderslev og Eisbøl, Mai til Juli, enkeltvis, L. Andersen.
39. **Philonthus discoideus** Grav. — I Amtmandshaven, Nykjøbing F., i meget stort Antal, April og navnlig September, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. I Stalden og Laden ved Frederiksholms Teglværk ved Kjøbenhavn, Mai, i Antal, Baron Rosenkrantz. I Haven i Haderslev, August, en mindre Række, L. Andersen.
41. **Philonthus fumigatus** Er. — Kohaven, Nykjøbing F., April, og Gjedser, August, nogle Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
43. **Philonthus punctus** Grav. — Oftere paa Stranden ved Esbjerg, flere Samlere. Enkeltvis ved Nykjøbing F., April, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Varieteten *binotatus* Grav. er taget af Hr. Toldass. Holstebroe ved Randers Fjord, Juni, enkelt.
44. **Philonthus puella** Nordm. — Jægersborg Dyrehave, Juni, enkeltvis, Baron Rosenkrantz. Taps Nørreskov, Oktober, enkelt, O. Holstebroe. Kjeldskov, Bremersvold, Lolland, enkeltvis, i August, Pastor J. Møller.
45. **Philonthus lucens** Mannh. — Enkelt i Taps Nørreskov, Mai, O. Holstebroe. Enkeltvis i Tørning, Sønderjylland, April, L. Andersen.
49. **Philonthus albipes** Grav. — Sorø, September-Oktober, Amtmandshaven, Nykjøbing F., April og September, en lille Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Søborg, Nordsjælland, Juli, Marienlund, November, Hunderup, April og Fruens Bøge, Juli, N. P. Jørgensen. Enkeltvis ved Trelde, ved Fredericia, Mai, L. Andersen.
50. **Philonthus lepidus** Grav. — Refsnæs, Juni, 3 Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Flere Stykker Asmildgaarde ved Silkeborg, Esben Petersen.
55. **Philonthus agilis** Grav. — Flere Stykker, Asmildgaard ved Silkeborg, Esben Petersen.
56. **Philonthus nigrita** Grav. — Enkeltvis ved Sorø, April, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. I Munke Mose

- ved Odense, af og til i Foraarsmaanederne, N. P. Jørgensen. Enkelte ved Randers, April, Holstebroe.
57. **Philonthus fumarius** Grav. — Udbredt og vistnok ret almindelig. I Mængde mange Steder i Nord-sjælland, ved Sorø og ved Odense, mère enkeltvis fra Lolland og Bornholm.
58. **Philonthus virgo** Grav. — Enkelt ved Eisbøl, April, L. Andersen.
64. **Philonthus elongatulus** Er. — Enkelt ved Nykjøbing F., Mai, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
65. **Philonthus procerulus** Grav. — Amtmandshaven, Nykjøbing F., Marts, en større Række, Kmhr. Fa-britius de Tengnagel. Enkeltvis ved Odense, i April-Juli, N. P. Jørgensen.
66. **Philonthus vernalis** Grav. — Sundby Storskov, Lolland, Gjedser, Næstved, Marts og Mai, en halv Snæ Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel. En lille Række ved Stokkerhoved, Haderslev, April, i en Myretue, L. Andersen. Munke Mose ved Odense, almindelig om Foraaret, N. P. Jørgensen. I Opskyl ved Limfjorden, Oktober, i Antal, Johansen. Jægersborg Dyrehave, i Kompostdynger, Mai, en lille Række, enkeltvis ved Kjøge og Nyraad, Forf.
71. **Philonthus trossulus** Nordm. — Denne Art er vist ingenlunde sjeldent, men ofte overset paa Grund af sin Lighed med den yderst almindelige *nigritulus*. Jeg har taget den ofte paa mange forskjellige Steder i Nordsjælland og Kjøbenhavns Omegn, ogsaa ved Roskilde og ved Esbjerg. Enkelt i Styding, Sønderjylland, L. Andersen.
73. **Cafius sericeus** Holme. — Paa Deget ved Frederiks-havn i stor Mængde, under Tang ved Kysten, Juli, Johansen.
74. **Vellejus dilatatus** Fabr. — Hr. Skolebestyrer Jør-gensen, Odense, meddeler, at han i Hvedholm Dyrehave har taget en større Række i Dagene 3.—19. Au-gust, i en hul Eg, hvor Vespa crabro havde sit Bo.

- De fleste kom ud fra smaa Huller, der førte ind til Boet, aldrig ad Hovedindgangen til dette; enkelte kom flyvende hjem fra Udflugter. Enkelt ved Sorø i September, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
76. **Quedius tristis** Grav. — Enkeltvis ved Tidsvilde, August, O. Holstebroe, Esbjerg, Jensen-Haarup, Grib Skov, August, N. P. Jørgensen og Hammeren, Bornholm, Juni, Forf.
 80. **Quedius fulgidus** Fabr. — Enkelt ved Odense i September, N. P. Jørgensen og i en Kjælder i Kjøbenhavn i Juni, Kapt. Wielandt. Rødekro, August, 2 Stkr., L. Andersen.
 83. **Quedius brevicornis** Thoms. — 2 Stkr. klækkede i Juli af Svamp fra Lyksborg, L. Andersen.
 85. **Quedius longicornis** Kr. — Enkelt, Odense, Mai, løbende paa en Vej, N. P. Jørgensen.
 88. **Quedius scitus** Grav. — Enkelt i Birkesvamp ved Lindum Skov, Juli, L. Andersen.
 93. **Quedius maurorufus** Grav. — Udbredt, men mest enkeltvis eller i smaa Selskaber; angives fra Lyngby og flere Steder i Nordsjælland, fra Salling, Silkeborg, Eisbøl i Sønderjylland, Odense, Sorø, Bornholm o. fl. St. Findetiden angives til Marts, April, Juli og Oktober, oftest April.
 94. **Quedius nigriceps** Kr. — Hornbæk, enkeltvis, under Mos paa Træstubbe, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 95. **Quedius suturalis** Redt. — Rugballegaard ved Vejle, nogle Stykker i Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkeltvis i Tørning, Sønderjylland, sigtet i Oktober, L. Andersen. Enkelt ved Vindstrup Overdrev, Sydsjælland, Juni, Forf.
 97. **Quedius scintillans** Grav. — Ikke sjeldent om Foraaret, Munke Mose, Fruens Bøge, Aalykkeskov; Skiltinge og Hvedholm paa Fyn, samt Lethraborg, N. P. Jørgensen.
 - *97a. **Quedius infuscatus** Er. — Q. infuscatus Erichson

Gen. & Spec. Staph. p. 543. — Aalborg, i træskede Popler, i Selskab med *Philonthus fuscus*, Marts, Johansen. Enkelt i Fruens Bøge, paa en Mur, Marts, N. P. Jørgensen.

- *97b. **Quedius auricomus** Kiesw. — *Q. auricomus* Kiesenwetter i Stett. Ent. Ztg. 1850. p. 220. (tomentosomaculatus, Corn.). — I fugtigt Mos paa Kildebund i Ravnkilde ved Skjørping, en længere Række, August, Johansen, S. Jensen, Ditlevsen, Forf. Denne Art, der synes at være meget sjeldent, angives at holde sig til Vandfald, Kildevæld og lignende Steder.

Det er utvivlsomt Larver og Pupper til denne Art, der er omtalt af Hr. Schlick i Ent. Medd. V. Bind p. 121, idet nærværende Art stadigt blev antaget for at være *Q. scintillans*, indtil jeg fandt den og ved Sammenligning med mine *scintillans* fra Dyrehaven saa, at det maatte være en ny Art. Fejltagelsen er saa meget mere forklarlig, som nærværende Art ikke findes i Tyskland og paa Grund af sin store Sjeldenhed ikke findes optagen i de Bøger, man i Almindelighed har til Hjælp ved Bestemmelsen.

98. **Quedius attenuatus** Gyll. — Flere Steder ved Odense i April, Juni og August, N. P. Jørgensen. Enkeltvis ved Klitmøller i April og Bøtø Strand, September, Kmhr. Fabritius de Tengnagel, samt i Sønderjylland, ved Haderslev, i Haver, Oktober, L. Andersen.
100. **Eurychorus picipes** Payk. — Lyngby Mose, enkeltvis i September, Baron Rosenkrantz. Enkelt i Alling-Skovgaards Mose ved Silkeborg, Lærer Esben Petersen.
101. **Heterothops prævius** Er. — Amtmandshaven, Nykjøbing F., og Gjedser, April, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Vester Ulslev Præstegaardshave, September, Pastor J. Møller. Stald i Aalborg, Oktober, en lille Række, Johansen.
- *101a. **Heterothops binotatus** Er. — Het. *binotatus* Erichson Gen. & Spec. Staph. p. 516. Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. p. 485. (*holmensis* Stph. *kirbyella* Stph.).

- Er vistnok udbredt ved vore Kyster, under op-skyllet Tang. Tidsvilde, Marts, Korshavn ved Odense Fjord, Juli, Asnæs, August, i stort Antal, samt Lyø, August, i Antal, N. P. Jørgensen. Vildsund Strand, Thisted, Juni, og Refsnæs, Juni, en lille Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Under Tang ved Frederiks-havn, en Række, Johansen.
102. *Heterothops dissimilis* Grav. — Gjedser, Mai og Au-gust, en Snes Stykker, samt Amtmandshaven, Nykø-bing F., Marts og August, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Munke Mose, en lille Række, April og Mai, N. P. Jørgensen. Poustrup, en lille Række i Stalden, Januar, Johansen. Jægersborg Dyrehave, i Hø, Oktober, Forf.
103. *Heterothops quadripunctulus* Grav. — Enkelt ved Dalum, Fyn, i April, i Opskyl, N. P. Jørgensen, ved Djærnes Strand, Sønderjylland, i Oktober, L. Andersen; under Tang ved Limfjorden ved Aalborg, meget tal-rig, Johansen; enkelt i en Hvepserede ved Vejle Sø, Oktober, E. Rosenberg. Ved Kjøge, paa Stranden, i Mai, og paa Slagslunde Overdrev, ligeledes i Mai, Forf.
110. *Xantholinus fulgidus* Fabr. — Amtmandshaven, Ny-købing F., September og Oktober, i meget stort Antal, ogsaa enkeltvis i Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
111. *Xantholinus latus* Grav. — Tidsvilde, enkeltvis under Fyrrebark, Juni, Rudehegn, ligeledes, Forf.
114. *Xantholinus atratus* Heer. — Stokkerhoved, hos Myrer, Marts, L. Andersen.
115. *Xantholinus glabratu*s Grav. — Flere Steder ved Ha-derslev, almindelig fra April til August, L. Andersen.
120. *Leptacinus parumpunctatus* Gyll. — Enkelt i Hund-erup Skov, Fyn, Juli, N. P. Jørgensen.
121. *Leptacinus batychrus* Gyll. — Flere Gange omkring Odense, baade Foraar og Efteraar, ialt en halv Snes Stykker, N. P. Jørgensen. Enkeltvis i Eisbøl, Søn-derjylland, August, L. Andersen.

126. **Lathrobium boreale** Hochh. — Eisbøl, Sønderjylland, enkeltvis, i Mai, L. Andersen.
129. **Lathrobium punctatum** Zett. — Munke Mose, Fyn, Marts, en lille Række, N. P. Jørgensen. Kohaveskov, Nykjøbing F., November, hyppig, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
130. **Lathrobium pallidum** Nordm. — Vejle Bugt, enkelt, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Hunderup Skov, Fyn, Mai, enkelt, N. P. Jørgensen.
132. **Lathrobium multipunctatum** Grav. — En lille Række fra Pomlenakke Strand, Falster, Juni, og Bornholm, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Flere Steder i Nærheden af Arnager paa Bornholm, enkeltvis, Juni, Forf.
135. **Lathrobium filiforme** Grav. — Et Par Stykker i en Myretue i Eisbøl, Mai. L. Andersen.
137. **Achenium humile** Nic. — Paa Stranden ved Esbjerg, under Tang, skyllet højt op paa Havstokken, i Forsomren 1897, A. C. Jensen-Haarup og Kons. Løvendal. Trods gjentagen Søgen ikke oftere funden. Dyret er antagelig skyllet bort fra sit Hjemsted i Marsken af Storm og Højvande og tilfældigt opskyllet paa ovennævnte Lokalitet.
140. **Stilicus similis** Er. — Eisbøl i Sønderjylland, April, en mindre Række, L. Andersen.
144. **Medon castaneus** Grav. — Hornbæk, Juni under Sten, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt ved Billum nær Vojens, September, i en Myretue paa et Stengærde, L. Andersen.
145. **Medon brunneus** Er. — 3 Stykker, sigtede i Skovbunden i Tommerup, Fyn, Mai, N. P. Jørgensen.
146. **Medon ripicola** Kr. — Falsters Østkyst, Juni, August og September, en større Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Trelde, Mai, Jensen-Haarup.
147. **Medon latus** Thoms. — Enkeltvis i Amtmandshaven, Nykjøbing F., Oktober, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. En lille Række under Tang paa Stranden

- ved Asnæs, August, og enkeltvis Bjørneø og Lyø, ligeledes i August, N. P. Jørgensen.
148. **Medon melanocephalus** Fabr. — Amtmandshaven i Nykøbing F., i Marts, Mai og August, hyppig, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt i Fredsted, April, L. Andersen.
149. **Medon obsoletus** Nordm. — Amtmandshaven, Nykøbing F., i Marts, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkeltvis i Aalykkeskov, Fyn, Mai og September, N. P. Jørgensen. Skarevis i Kompostdynger i Jægersborg Dyrehave, April, O. Holstebroe og Forf.
150. **Scopaeus laevigatus** Gyll. — Sundby Storskov, Marts, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
151. **Scopaeus minutus** Er. — Ejby ved Odense Aa, enkelt, Juni, N. P. Jørgensen.
157. **Sunius neglectus** Märk. — I gammelt Hø paa en Mark ved Hunderup, 12 Stykker, i Mai og Novbr., N. P. Jørgensen.
- *166a. **Stenus longitarsis** Thoms. — St. longitarsis, Thomson, Öfv. Vet. Ac. Förh. 1851 p. 133. — En halv Snæ Stykker i Omegnen af Odense, i April, Juni og September til November, N. P. Jørgensen.
168. **Stenus providus** Er. — Foruden tidligere kjendte Findesteder angives den fra Hornbæk, Juli, og Bøø, September, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel; enkeltvis fra Haderslev, Juli, L. Andersen, og Lyngby, September, Baron Rosenkrantz.
169. **Stenus lustrator** Er. — Oftere gjenfunnen i Bølle-mosen, ogsaa Lyngby Mose, Kmhr. Fabritius de Tengnagel og Kapt. Wielandt, og Ordrup Mose, April, Forf.
170. **Stenus silvester** Er. — I Mængde paa Engen ved Fruens Bøge, Odense, i Bunker af gammelt Græs, November, N. P. Jørgensen.
173. **Stenus circularis** Grav. — Nogle Stykker ved Sorø og Nykøbing F., i Marts, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt i Eisbøl, Sønderjylland, i April, L.

- Andersen. Almindelig i Munke Mose, Odense, om
Foraaret, N. P. Jørgensen.
177. *Stenus incrassatus* Er. — Asnæs, i Juni, nogle
Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Mejlsø, Mai,
Laven, Juli, Vosemose, Fyn, Mai, enkeltvis, N. P.
Jørgensen. 2 Stkr. i Opskyl, Eisbøl, April, L. An-
dersen. Donse i Opskyl og Kjøge i raadden Tang paa
Kysten, begge Steder i Mai, Forf.
178. *Stenus cinerascens* Er. — Gjerup, Fyn, Mai, enkelt-
vis, N. P. Jørgensen. Sørø, i Marts, Damhusmosen,
i April, nogle Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
179. *Stenus atratulus* Er. — Klitmøller, September, en-
keltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
181. *Stenus æmulus* Er. — Vosemose, Ullerslev, Dalum
og Hunderup paa Fyn, i April-Mai, N. P. Jørgensen.
182. *Stenus nitidus* Boisd. & Lac. — Omegnen om Ny-
kjøbing F., Marts og September, enkelte Aar hyppig,
Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Vallø, enkelt, Juli,
N. P. Jørgensen. Esbjerg, ved et leret Vandsted nær
Stranden, Juli, i Mængde, Forf.
183. *Stenus argus* Grav. — Almindelig om Odense, N.
P. Jørgensen. Enkeltvis i Opskyl, Eisbøl, Sønder-
jylland, April, L. Andersen.
189. *Stenus crassiventris* Thoms. — Sørø, Marts, nogle
Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Nørre Sø
ved Brahetrolleborg, Juni, Aalykke Skov, April og
Hvedholm, Juli, N. P. Jørgensen. Enkelt ved Ny-
raad, Sydsjælland, Juni, Forf.
191. *Stenus bipunctatus* Er. — En lille Række i Eisbøl,
Mai, L. Andersen. Enkeltvis ved Sanderum og Hun-
derup, Juni—Juli, N. P. Jørgensen. Hobro, Juni, i
Antal, Johansen, Holstebroe, Forf.
192. *Stenus guttula* Müll. — Ved Hunderup, Fyn, April
og Mai, en lille Række, N. P. Jørgensen.
194. *Stenus fossulatus* Er. — Greisdalen, Juli, en lille
Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt ved
Middelfart, Juli, N. P. Jørgensen. Hobro, Juni, paa

- en leret Skrænt i Skoven, i stort Antal, Johansen, Holstebroe, Forf.
197. *Stenus pumilio* Er. — Et enkelt Stykke paa Kjøgevejen ved Kjøbenhavn i August, Baron Rosenkrantz.
203. *Stenus contractus* Er. — Enkeltvis ved Tommerup, Fyn, September, og Vosemose, Mai, N. P. Jørgensen.
209. *Stenus tempestivus* Er. — Syner at være temmelig jævnt udbredt og ikke sjeldent. Foruden tidligere angivne Findesteder anføres Sorø, Sundby Storskov og Bremersvold, Lolland, Middelfart og Dalum paa Fyn, Lemvig og Ræbild Bakker i Jylland samt Eisbøl i Sønderjylland. April, Juni, Juli samt December angives som Findetider.
210. *Stenus bifoveolatus* Gyll. — Temmelig jevnlig i Odense Omegn, mest dog enkeltvis, N. P. Jørgensen. Sorø, Marts og April, nogle Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
211. *Stenus brevicollis* Thoms. — Et enkelt Stykke ved Jul Sø, Juli, N. P. Jørgensen.
212. *Stenus filum* Er. — Amtmandshaven, Nykjøbing F., Juli, og Bøllemosen, April, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Grib Skov og Laven, Juli, N. P. Jørgensen. Bøllemosen, April, og Lyngby Mose, Juni, enkeltvis, Baron Rosenkrantz. Kjeldskov ved Bremersvold, Mai og September, samt Ordrup Mose, en lille Række, April, Forf.
215. *Stenus flavipes* Er. — Ikke sjeldent i Skovene om Odense, især om Foraaret, ved Sigting af Løv, N. P. Jørgensen. Skrænt ved Guldborgsund, i Nærheden af Nykjøbing F., Mai og Juni, nogle Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
217. *Stenus pallipes* Grav. — Maribo Sø, Juli, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Damhusmosen, April og Mai, enkeltvis Baron Rosenkrantz og Forf.
219. *Euaesthetus lœviusculus* Mannh. — Sundby Storskov og Omegnen af Nykjøbing F., Marts, ikke sjeldent, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Flere Steder

omkring Odense, Marts, Mai og November, N. P. Jørgensen.

- 222. **Oxyporus maxillosus** Fabr. — En længere Række i Jels Skove, Sønderjylland, Juli, L. Andersen.
- *222a. **Bledius taurus** Germ. — Oxytelus taurus Germar Faun. Ins. Eur. XII p. 2. Bl. taurus Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II. p. 818. (furcatus Ol.). — Kun funden ved Esbjerg, under Tang ved Stranden. Første Gang funden i Juni 1897, Jensen-Haarup og Kons. Løvendal. Gjenfunden i 1898, Mai og Juni, i Antal, af de nævnte Herrer og Forf. Fundet er allerede omtalt af Hr. Jensen-Haarup i nærværende Bind af Ent. Medd. pag. 101; senere er den kun gjenfunden yderst sparsomt.
- *223a. **Bledius spectabilis** Kr. — Bled. spectabilis Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II p. 824. = Bl. tricornis part. Erichson, Gen. & Sp. Staph. p. 764. = tricornis var. Fauvel i Bull. Soc. Norm. IX p. 764. — To Hunner af denne Art er fundne i Juni 1898, under Tang paa Stranden ved Esbjerg, af Hr. Kons. Løvendal.
- 225. **Bledius diota** Schiø. — I Antal sammen med *taurus* og andre Bledier under Tang paa Strandbredden ved Esbjerg, Mai—Juni, flere Samlere.
- 227. **Bledius femoralis** Gyll. — Kjettrupgaard, nær Blokhus, Juli, en lille Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- 228. **Bledius crassicollis** Boisd. & Lac. — I stort Antal paa Nærum Overdrev, April, E. Rosenberg.
- *228a. **Bledius dissimilis** Er. — Bl. dissimilis Erichson, Gen. & Spec. Staph. p. 769; Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II. p. 835. — Gjedser, Oktober, en større Række, Kmbr. Fabritius de Tengnagel.
- 229. **Bledius atricapillus** Germ. — Refsnæs, Juni, en større Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- *229a. **Bledius nanus** Er. — Bl. nanus Erichson, Gen. & Spec. Staph. p. 773. Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl.

- p. 833. — Søndervig, i August, enkelt, Nykjøbing F., i August, 3 Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- *229b. **Bledius pusillus** Er. — Bl. pusillus Erichson, Käf. d. Mark Br. p. 583. Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. p. 833. — Fanø, i August, 3 Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
232. **Bledius longulus** Er. — Gjenfunden i stort Antal paa Hvorup Bakker, Mai, Juni, gravende i Sandet paa Skrænter med sparsom Vegetation, Johansen og flere Samlere. Amtmandshaven, Nykjøbing F., April og Mai, en lille Række og Fanø, August, i Mængde, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- *232a. **Bledius pygmaeus** Er. — Bl. pygmaeus Erichson, Käf. d. Mark Br. p. 583. Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II p. 838. — I stort Antal paa Hvorup Bakker nord for Aalborg, i Mai, Juni, i Selskab med foregaaende Art, Johansen og flere Samlere.
233. **Bledius pallipes** Grav. — Et Par Stykker ved Bredden af Odense Aa ved Hunderup, Juni, N. P. Jørgensen.
234. **Bledius terebrans** Schiö. — Greisdalen og Dyndalebæk paa Bornholm, Juli, og Lellinge Aa, August, en halv Snes Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
235. **Bledius rastellus** Schiö. — Bøtø paa Falster, September, en lille Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
236. **Bledius subterraneus** Er. — Greisdalen, Juli, Lellinge Aa, August, i stort Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. En lille Række ved Vejle, Juni og enkelt ved Odense Aa, Juni, N. P. Jørgensen. En lille Række ved Løghøj, Juli, L. Andersen, samt en halv Snes Stykker ved Varde Aa i Nørholm Skov, nord for Varde, Forf.
239. **Platystethus cornutus** Grav. — Paa Bunden af et halvt udtørret Vandhul ved Nykjøbing F., August, sammen med *Tachysa coarctata* og *umbraticea*, i stort Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Munke Mose ved Odense, enkeltvis i Februar, April, Mai og Ok-

- tober, N. P. Jørgensen. Enkelt i Rævkjær, Sønderjylland, September, L. Andersen.
240. **Platystethus nodifrons** Sahlb. — Sorø, Marts, Damhussøen, April, Kjetstrupgaard ved Blokhus, Juli, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Odense, September, Munke Mose, Marts og April, en halv Snes Stykker, N. P. Jørgensen.
244. **Oxytelus insecatus** Grav. — Amtmandshaven, Nykjøbing F., April—Juli, i stort Antal, hyppigst i Mai, Kmhr. Fabritius de Tengnagel, Stavisaas, i Opskyl, April, en lille Række, N. P. Jørgensen.
246. **Oxytelus fulvipes** Er. — Fruens Bøge ved Odense, April 1889, en halv Snes Stykker, sigtede af fugtigt Løv; ikke senere gjenfunden, N. P. Jørgensen.
250. **Anotylus maritimus** Thoms. — Bøtø Strand, September, i stort Antal, Dueodden, Bornholm, Juli, Søndervig, August, nogle Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
257. **Carpalimus scrobiculatus** Er. — I Opskyl ved Sør og Aar, udbredt men sjeldan og oftest kun enkeltvis. Foruden tidligere nævnte Findesteder anføres Furesø, Mai, 4 Stkr., Dalum Eng, Fyn, April, enkelt, N. P. Jørgensen. Eisbøl, Sønderjylland, Mai, enkelt, L. Andersen. Lejre ved Aaen og Esrom Sø, enkelte, Forf.
- *259a. **Trogophloeus inquilinus** Er. — Tr. inquilinus Erichson, Käf. d. Mark Br. p. 603. Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II p. 874. Tr. bilineatus var. Er. Gen. & Spec. Staph. p. 806 (incrassatus Kiesw.). — Paa Kysten ved Dyreborg, Sydfyn og Lyø, Juli og August, en længere Række, N. P. Jørgensen.
- *259b. **Trogophloeus fuliginosus** Grav. — Oxytelus fuliginosus Gravenhorst, Micr. p. 102. Tr. fuliginosus Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II p. 875. — I Kompostdýnger i Jægersborg Dyrehave, i April 98, nogle Stykker, Forf. Samme Aar paa samme Sted i Antal, O. Holstebroe; ikke

- senere gjenfunden. Et enkelt Stykke paa Stranden ved Dyreborg, Sydfyn, Juli 1900, N. P. Jørgensen.
260. **Trogophloeus foveolatus** Sahlb. — Nykøbing F., Marts og ved Ringkøbing Fjord, paa en Eng, i Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. I Opskyl paa Bredden af Stavisaa, flere Gange, i April og September, N. P. Jørgensen. Enkelt ved Haderslev Dam, April, L. Andersen. En lille Række under Tang paa Stranden ved Esbjerg, Juni, Forf.
262. **Trogophloeus halophilus** Kiesw. — Enkelt i en Plantedyne i en Have i Hunderup, Fyn, Oktober, N. P. Jørgensen. Ligeledes enkelt, under Tang paa Stranden ved Esbjerg, Juni, Forf.
265. **Trogophloeus tenellus** Er. — Ved Bredden af Stavisaa, April, og Munke Mose, Mai, i Opskyl, en lille Række, N. P. Jørgensen. Enkelt ved Haderslev Dam, April, L. Andersen.
- *265a. **Thinobius brevipennis** Kiesw. — Thinobius Kiesenwetter i Stett. Ent. Ztg. 1844 p. 355. Thinobius brevipennis Kiesenwetter i Stett. Ent. Ztg. 1850 p. 221. — Et enkelt Exemplar af denne meget lille Art er fundet af Kmhr. Fabritius de Tengnagel ved Sorø Sø i September 1896. Den repræsenterer tillige en for vor Fauna ny Slægt, af hvis 13 europæiske Arter de 5 findes i Tyskland og England.
266. **Syntomium aeneum** Müll. — Foruden tidligere nævnte Findesteder anføres: Ordrup Mose, paa Skränter i Tørvegravene, Marts—April, i Antal; Mosen ved Lillerød Station, Mai, ligeledes, samt Jægerspris, Mai, enkelt, E. Rosenberg og flere Samlere. Enkelt ved Fruens Bøge, Fyn, August, N. P. Jørgensen.
269. **Coprophilus striatulus** Fabr. — Oftere gjenfunden omkring Kjøbenhavn og ved Nykøbing Falster. Den er tagen flere Gange i Odense og Omegn af Hr. N. P. Jørgensen; i stort Antal ved Fredrikshej, Syd for Kolding, i en Havemødding, O. Holstebroe; i en Kastaniestub i Dyrehaven, i Antal, E. Rosenberg;

- Salling, Pastor J. Møller; April og Mai angives for alle disse Fund.
271. **Geodromicus plagiatus** Fabr. — Et enkelt Stykke i Juni 1900, tæt nord for Sandvig paa Bornholm, under Tang paa Stranden, Mr. Rye.
 273. **Lesteua punctata** Er. — Munkebjerg ved Vejle, et Par Stykker, i Mai, N. P. Jørgensen. Sørø, Mai, September og December en lille Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Haderslev Fjord, Marts, Lethraborg, April og Juni, en lille Række, Forf.
 274. **Orochares angustatus** Er. — Amtmandshaven, Nykjøbing F., November, nogle Stykker og Kohaveskov, 12te og 20de Januar 1900, krybende paa en med Sne fuldstændig dækket Gangsti, en Snes Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 276. **Olophrum fuscum** Grav. — Af denne Art, der er temmelig hyppig paa Øerne men ikke tidligere kjendtes fra Jylland, har Hr. L. Andersen taget 3 Stkr. ved Haderslev Dam i Mai 1889.
 282. **Acidota cruentata** Mannh. — Amtmandshaven, Nykjøbing F., November—December, en lille Række og Thisteds Omegn, Oktober, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Hunderup, Fyn, November og Munke Mose, Januar, enkelt, N. P. Jørgensen. Et Stykke klækket fra Larve 22de Mai 95, E. Rosenberg. Ved Furesø, sightet under Resterne af en død Hest, November, enkelt, Ass. West.
 283. **Arpedium quadrum** Grav. — Forskjellige Steder ved Kysten af Guldborgsund, Oktober, i stort Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Ved Esrom Sø, i Opskyl, April og Oktober, i Antal, Stud. mag. J. C. Nielsen, Kons. Løvendal og Forf.
 284. **Coryphium angusticolle** Steph. — Enkelt i et hult Piletræ ved Kjøge, August, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 286. **Homalium riparium** Thoms. — Vejlø Bugt, Juni, Bornholm, ved Kysten, Juli og Falsters Kyster, Au-

- gust og November, i Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
288. ***Homalium oxyacanthae*** Grav. — Flere Steder omkring Odense, i Foraars- og Efteraarsmaanederne, især i Munke Mose og Fruens Bøge, mange, N. P. Jørgensen. Enkelt ved Næstved, i Mai, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
289. ***Homalium exiguum*** Grav. — 2 Stykker ved Haderslev Dam, Mai, L. Andersen. Enkelt ved Vallø, Juli, N. P. Jørgensen. Enkelt ved Frederiksholm Tegl-værk, Oktober, Baron Rosenkrantz.
294. ***Etheothassa testacea*** Er. — Et enkelt Stykke nedbanket af Eg ved Haderslev, Juni, L. Andersen. Enkelt ved Killerup, Fyn, Juni, N. P. Jørgensen.
295. ***Phyllodrepa vilis*** Er. — Et enkelt Stykke klækket af Træ fra Lolland, September, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt ved Tommerup, Fyn, Juni, N. P. Jørgensen.
300. ***Phyllodrepa nigra*** Grav. — En lille Række fra Taps, Syd for Kolding, Mai, L. Andersen.
302. ***Acrolocha striata*** Grav. — Hunderup, Fyn, i November, flere Gange i Antal i Plantedynger, N. P. Jørgensen; enkeltvis paa Falster og Lolland, flere Samlere.
303. ***Phloeostiba plana*** Payk. — Enkelt ved Hunderup, Fyn, i April, N. P. Jørgensen. Enkelt ved Bremersvold, Lolland, Juni, Forf.
305. ***Hapalariaea pygmæa*** Payk. — Nogle Stykker klækket af Træ fra Lolland, August, og nogle Stykker paa Knudshoved, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt ved Lethraborg i Aug., Fruens Bøge, Juni, og Hvedholm, Aug., N. P. Jørgensen.
- *306a. ***Eusphalerum primulae*** Stph. — *Anthobium primulae* Stephens, Ill. Br. Ent. V p. 356. *Anth. triviale* Erichson, Käf. d. Mark Br. p. 637. *Eusphalerum triviale* Kraatz, Nat. d. Ins. Deutschl. II p. 1004 (flo-rale Lac. nigricolle Stph. cibrosum Heer.). — Fandtes

af Hr. E. Rosenberg og Hr. Ass. West enkeltvis i 1898 og i stort Antal i Slutningen af April og Begyndelsen af Mai 1899 i Blomsterne af *Primula elatior* i Boserup Skov ved Roskilde. Billen fandtes kun paa saadanne Steder, hvor Planterne var overskyggede af Hassel og andre Træer og Buske, medens den paa mere aabne Steder, hvor Solen havde tørret Duggen af Primlerne, ikke var til at finde. Senere er den kun gjenfundet paa samme Sted i et enkelt Exemplar. 2 Stykker ved Leire, 4de Juni 1899, nedbanket af blomstrende Hvidtjørn, E. Rosenberg.

308. *Anthobium ophthalmicum* Payk. — Møen, Juli, nogle Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Taps, Syd for Kolding, Mai, en lille Række, L. Andersen.
 317. *Phloeobium clipeatum* Müll. — Enkelt, nedbanket af Eg, Rævkjær i Sønderjylland, Mai, L. Andersen.
 318. *Phloeocharis subtilissima* Mannh. — Foruden paa Sjælland, hvor den oftest er funden, er et enkelt Stykke kommet frem af Træ fra Lolland, Februar, i Kmhr. Fabritius de Tengnagels Klækkehushus; jeg har fundet Dyret skarevis paa et gammelt Risgjærde i Skoven ved Bremersvold i Oktober.
 320. *Micropeplus caelatus* Er. — Et enkelt Stykke ved Søborg, Nordsjælland, Juli, N. P. Jørgensen.
-

Pselaphidae.

- 2a. *Batrisus venustus* Reichb. — Sundby Storskov, April, 3 Stkr.; senere sammestedes, enkelt, uden Tidsangivelse, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- 2b. *Batrisus adnexus* Hampe. — Enkeltvis i Skoven ved Trelde i en Ellestub, L. Andersen og Joh. P. Johansen.
- 11a. *Bythinus clavicornis* Panz. — Fruens Bøge ved Odense, Mai, 2 Stkr., N. P. Jørgensen.
14. *Tychus niger* Payk. — Ikke sjælden omkring Odense,

især Fruens Bøge, N. P. Jørgensen. En lille Række i Riis Skov, Mai, L. Andersen.

- 14a. *Amauronyx Märkelii* Aub. — Enkelt i Amtmandshaven, Nykøbing F., Marts, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 15. *Trichonyx sulcicollis* Chaud. — Husum, Sønderjylland, Juli, 6 Stkr., L. Andersen.
 - 17b. *Euplectus Duponti* Aub. — En lille Række klækket af Træ fra Lolland og Falster, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 - 17c. *Euplectus piceus* Motsch. — Klækket af Træ fra Sundby Storskov paa Lolland, i Antal, Mai, Juni, og Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkeltvis paa Æbelø og ved Brahetrolleborg, Mai og Juni, N. P. Jørgensen.
 - 18b. *Euplectus intermedius* Woll. — Enkeltvis med foregaaende Art, samme.
 24. *Euplectus bicolor* Denny. — I Antal sammen med de 2 foregaaende Arter, samme.
-

Scydmaenidae.

2. *Seydmaenus abbreviatellus* Er. — Hellerup, i en Have, i Antal, Schlick.
- *2a. *Seydmaenus seydmaenoides* Stph. — Euthia scydmaenoides Stephens, Ill. Br. Ins. III 116. Eutheia Thoms. Scand. Col. X p. 326. — Amtmandshaven, Nykøbing F. i en Kompostdynge, Mai og Oktober, ogsaa klækket af Træ fra Sundby Storskov, en lille Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
3. *Seydmaenus angulatus* Müll. — Fruens Bøge ved Odense, April, September og Oktober, enkeltvis, N. P. Jørgensen.
- *3a. *Seydmaenus rubicundus* Schaum. — Sc. rubicundus Schaum i Ann. Ent. 1841 13. Neuraphes Thoms., Skand. Col. X p. 327 (sellatus Fauv.). — Klækket af

- Træ fra Lolland og Falster, Mai, Juni og Juli, 4 Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Aalborg i Bladjord, en lille Række, September, Johansen.
- 7a. **Seydmaenus Godarti** Latr. — Enkelte, Midtlolland, i en gammel Egebul, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Gjerup, Fyn, Mai, 4 Stkr., hos Form. rufa, N. P. Jørgensen.
 9. **Seydmaenus exilis** Er. — Enkelt i Sundby Storskov, April, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Kølske Krat ved Aalborg, under Bark, Mai, 3 Stkr., Johansen.
 12. **Seydmaenus rutilipennis** Müll. — Vosemose og Ulferslev, Fyn, i Opskyl, Marts og April, N. P. Jørgensen. Enkelt i Freerslev Hegn, Nordsjælland, Mai, Baron Rosenkrantz.
-

Silphidae.

1. **Necrophorus germanicus** Fabr. — Efter Meddelelse af Hr. Jensen-Haarup skal denne Art ikke være sjeldent i Egnen mellem Slagelse og Kallundborg, hvor den er taget af D'Hrr. P. M. Pedersen og Joh. Hasle.
14. **Silpha opaca** L. — Hr. A. C. Jensen-Haarup meddeler, at han den 10de Juli 1892 om Eftermiddagen har truffet en Mængde Expl. af denne Art siddende paa Straaene af Havre og Byg i Greisdalen og fortærende Bladene, som de angreb i Kanten, idet de, som det syntes, kun gnavede i Kanten (c. $\frac{1}{2}$ Millimeter ind). Rimeligvis visner hele Bladet efter denne Behandling, ialfald var en stor Mængde Blade visnede. Paa mange Steder var der ædt af de unge Kjærner, men det lykkedes ikke Hr. Jensen-Haarup at konstatere hvorvidt dette Angreb ogsaa skyldtes Silphaen.
21. **Sphaerites glabratus** Fabr. — Rugballegaard ved Vejle, i en Kompostdynge, September, 2 Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Lindum, Oktober, Lundby Krat, Mai, Skjørping, Oktober, enkeltvis, Johansen.

- *21a. **Agyrtes castaneus** Frölich. — *Agyrtes castaneus* Frölich, Naturforscher 1799. p. 19. (spinipes Panz., vespertinus Frölich.). — Et enkelt Stykke af denne for vor Fauna ny Art haves fra Nordfalster, Jensen-Haarup.
- 21a. **Hydnobius punctatus** St. — Et enkelt Stykke, kætset i Vallø Dyrehave, Juli, N. P. Jørgensen. I Antal, Hvorup, Oktober, Johansen.
- 21b. **Hydnobius Perrisi** Fairm. H. Perrisi Fairmaire i Ann. Soc. Ent. Fr., 1853 Bull. p. 75 (ciliare Thoms.). — Hr. Skolebestyrer N. P. Jørgensen, der af afdøde Brygger Schiøtz havde faaet et Par Stykker af denne Art, stammende fra Aalborgegnen, og tagne af Adjunkt Asmussen, har henledet Opmærksomheden paa, at det vistnok er denne Art, der i Dr. Meinerts Tillæg i Ent. Medd. I p. 45 er opført under Navnet *punctatissimus* Stph. En Undersøgelse af det i nævnte Tillæg omtalte Exemplar og adskillige flere, fundne i Aalborgegnen, viser, at denne Antagelse er rigtig, og Navnet *punctatissimus* Steph. bør derfor udgaa. D'Hrr. Johansen og Asmussen have taget en Række i Hvorup, Oktober.
22. **Anisotoma oblongum** Er. — *A. oblonga* Erichson, Nat. d. Ins. Deutschl. III p. 53 Fodnote (grandis Fairm.). — Af Hr. Skolebestyrer N. P. Jørgensen er jeg bleven gjort opmærksom paa, at den i Schiedtes Fortegnelse i Nat. Tids. 3 R. 7 B. under Navnet *A. cinnamomeum* Panz. opførte Art vistnok er uriktig bestemt og bør henføres under nærværende Art. Dette synes ogsaa at være Tilfældet, idet alle de Exemplarer jeg har været i Stand til at undersøge, har vist sig at tilhøre *A. oblongum*. Jeg tager derfor ikke i Betænkning foreløbigt at stryge Navnet *cinnamomeum* og indsætte nærværende Art i det gamle Nummer. Skulde det vise sig, at den rigtige *cinnamomeum* ogsaa findes her i Landet, bør den iafald takes op som en ny Art, idet Museets Exemplarer, hvorpaa Arten oprindeligt er optagen i vore Fortegnelser, vise sig at høre til

nærværende Art. Af ny Findesteder anføres Langesø Skov, Fyn og Stenderup Skov, Jylland, hvor den er tagen enkelt i September, samt Als og Styding, en lille Række, Juli, L. Andersen.

Jeg skal endnu bemærke, at jeg har optaget Navnet *grandis* Fairm. som Synonym for denne Art. Som Autoritet herfor anfører jeg Can. Fowlers: Coleoptera of the British Islands, hvori det hævdes, at de under de 2 Navne beskrevne Biller nu anses for identiske. Hovedforskjellen synes at ligge i Kjønsmærkerne, nemlig Udviklingen af Baglaar og Skinneben hos Hanner saavel som Hunner, men disse variere til en vis Grad, og det maa antages, at de to beskrevne Arter kun ere Yderformer af samme gode Art.

23. **Anisotoma Triepkii** Schmidt. — Langaa, Aug—Sept., flere, O. Holstebroe. En Række ved Viuf, nær Kolding, Juli, L. Andersen. Hvorup, September, Johansen.
24. **Anisotoma piceum** Illig. — Enkelt ved Taps, Syd for Kolding, Sept., O. Holstebroe. Hvorup, Aug—Sept., flere, Johansen.
26. **Anisotoma silesiacum** Kr. — Langaa, enkeltvis, Aug., O. Holstebroe. Tokkekjøb Hegn, Nordsjælland, Aug., 3 Stkr. og Rude Hegn, Juli, enkelt, Forf.
- 27a. **Anisotoma furvum** Er. — Mikkelshøj ved Aalborg, Sept., Hvorup, Oktober, Johansen.
28. **Anisotoma ciliare** Schmidt. — En større Række i Klitterne ved Kjettrupgaard, nær Blokhus, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Hvorup, Oktober, i Antal, Johansen. Enkelt, Alling Bakker ved Laven, Aug., N. P. Jørgensen. Ikke sjeldent i Klitterne ved Harboøre, Juni, Forf.
30. **Anisotoma rubiginosum** Schmidt. — En lille Række, Styding, September, L. Andersen.
32. **Anisotoma badium** St. — 3 Stykker ved Tørring, Sønderjylland, Aug., L. Andersen. Enkelt i Gelsskov, Juli, O. Holstebroe, og i Sanderum Mose, i Opskyl, Mai, N. P. Jørgensen.

40. *Liodes glabra* Kug. — 3 Stykker, Tørnig, Sønderjylland, Juni, paa gamle Stubbe, L. Andersen. Enkeltvis paa en Tømmerplads i Kjøbenhavn, Asmussen.
41. *Liodes castanea* Hbst. — Lindum og Hals, Juni og August, enkeltvis, Johansen. En lille Række i en gammel Eg, Gram, Nordslesvig, Juli, Joh. Andersen.
45. *Agathidium nigripenne* Kug. — Frejlev Skov, Juni, enkelt, klækket af Træ af en gammel Bøg fra Sundby Storskov, April—Mai samt Juli—August, mange, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Hunderup, Fyn, 2 Stkr., Juli, i en Stub, N. P. Jørgensen.
47. *Agathidium marginatum* St. — Hjerting, Juli, og Klitmøller, Juni, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Hvorup Bakker, flere, Oktober, O. Holstebroe. Odense, Mai og September, i Sigtegods, enkeltvis, N. P. Jørgensen. Bremersvold, enkelt, September, Pastor J. Møller. Hvorup og Skjørping, September, enkeltvis, Johansen. Styding, September, 4 Stkr., L. Andersen.
48. *Agathidium mandibulare* St. — Hals, Juni, og Lundby, Sept., Johansen.
49. *Agathidium rotundatum* Gyll. — Gjerup, Fyn, enkeltvis i Mai, N. P. Jørgensen. Rugballegaard ved Vejle, Juni, mange, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt, Bremersvold, Juni, O. Holstebroe. Skjørping og Agdrup, Mai, Johansen. Enkeltvis i gamle Stubbe, Tørnig, Sept., L. Andersen.
51. *Agathidium varians* Beck. — Af og til i Sigtegods fra Skovene om Odense, April, Mai, September og Oktober, N. P. Jørgensen. Et Par Stykker i Lyngby Mose, Mai, paa Ellesvamp, Forf.
52. *Agathidium nigrinum* St. — Buderuplund og Lindum, Juli—Sept., Johansen. Marienlund ved Odense, 2 Stkr. i Oktober og November i Sigtegods, N. P. Jørgensen. Enkelt paa Nottet ved Haderslev, Mai, L. Andersen og i Aalholm Hestehave, Lolland, Juni, Forf.
54. *Agathidium badium* Er. — Enkelt i Taps Nørreskov,

Oktobre, O. Holstebroe, og Jels Skov, Juli, L. Andersen.
Trelde Skov i en Stub, Mai, Restrup, Juli, og Skjørping, Aug., Johansen.

55. **Agathidium laevigatum** Er. — Enkeltvis i Sundby Storskov, Rugballegaard ved Vejle og Møens Klint, April, Mai og Juli—August, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Oftere i Sigtegods fra Skovene om Odense i April og Mai og enkelt i Tidsvilde, August, N. P. Jørgensen. Tidsvilde, August, enkelt, O. Holstebroe. Lundby Krat og Lindum i September, Johansen. 2 Stkr., Eisbøl i Sønderjylland, April, sightet, L. Andersen.
56. **Colon viennensis** Hbst. — Enkelt, Tørring, Sønderjylland, Aug., sightet, L. Andersen.
58. **Colon serripes** Sahlb. — 2 Stykker tagne paa samme Sted og Tid som foregaaende af samme Samler.
60. **Myloechus dentipes** Sahlb. — Vester Ulslev Præstegaardshave, September, Pastor J. Møller. 2 Stkr. i Svamp, Nottet ved Haderslev, September, L. Andersen.
63. **Myloechus appendiculatus** Sahlb. — Enkelt ved Munkkebjerg, Vejle, Juli, N. P. Jørgensen.
64. **Myloechus denticulatus** Kr. — Enkelt ved Kolding, og i Vindstrup Overdrev, Midtsjælland, i Juni, Holstebroe.
67. **Myloechus rufescens** Kr. — Hr. E. Rosenberg har i Skoven ved Boserup d. 11-6-99 om Eftermiddagen kætset 2 Stykker, Han og Hun af en Myloechus, som ikke kan henføres til nogen anden end nærværende Art, og som ogsaa paa nær en lille Afvigelse i Formen af Baghjørnerne paa Thorax passer med det eneste hidtil her i Landet fundne Exemplar, der findes i Museets Samling. Det er ikke muligt at konstattere, om her skulde foreligge en hel ny Art, uden at sammenligne en længere Række, men Sandsynligheden taler for, at der kun foreligger en Variation i Dannelsen af Thorax's Baghjørner, og at alle de 3 omtalte Stykker tilhøre nærværende Art.
68. **Myloechus latus** Kr. — En Række fra Sundby Storskov, Lolland, Marts og April, Kmhr. Fabritius de

- Tengnagel. Enkeltvis i Skovene omkring Odense, Mai, sigtet, N. P. Jørgensen. Enkelt, sigtet ved Roden af en Gran, Styding, Sønderjylland, Juni, L. Andersen.
70. *Choleua angustata* F. — Enkelt i Aalbæk Præstegaardshave, Salling, Mai, og Kjeldskov, Bremersvold, Lolland, Juni, Pastor J. Møller. Fuglebjerg, Sjælland, Mai, enkelt, O. Holstebroe. Enkeltvis, Eisbøl i Sønderjylland, Mai, L. Andersen.
71. *Choleua intermedia* Kr. — Enkelt ved Bursø, Lolland, Juni, og ved Randers, Oktober, O. Holstebroe.
- 72a. *Choleua nivalis* Kr. — Randers, Aug., et enkelt Stk. O. Holstebroe.
73. *Choleua agilis* Illig. — Et Par Stykker sigtede i Munke Mose, Juni, N. P. Jørgensen. Enkelt paa Muren om Vestre Kirkegaard, Kjøbenhavn, Oktober, Baron Rosenkrantz. Enkeltvis i Eisbøl Fredsted, Sønderjylland, Mai, L. Andersen. En Gang i Antal under Græstør i Bunden af en udтарret Grøft ved Harboøre, Juni, Forf.
75. *Choleua Wilkinii* Spence. — Foruden omkring Odense, hvor den efter Hr. N. P. Jørgensens Meddeelse ikke er sjeldent i de fleste Skove, anføres Taps Nørreskov, syd for Kolding, og Floes ved Randers, hvor Hr. Holstebroe har fundet denne Art enkeltvis i Aug.—Okt.
- 82a. *Choleua alpina* Gyll. — Enkelt i Jægersborg Dyrehave, paa tørt Aadsel, Juni, Forf. Als, to Stykker, L. Andersen.
83. *Choleua grandicollis* Er. — En enkelt fremkom i Kmhr. Fabritius de Tengnagels Klækkehus, af Træ fra Sundby Storskov, Lolland, i Mai. Eisbøl, Sønderjylland, L. Andersen. Banedæmningen ved Kolding Fjord, September, sigtet, E. Jürgensen.
- *84a. *Choleua chrysomeloides* Panz. — Helops chrysomeloides Panzer, Faun. Ins. Ger. in. p. 57. — Ydre Bjerrum, vest for Ribe i en Markgrøft, Mai, enkelt, Kons. Løvendal.
- *89a. *Choleua varicornis* Rosenh. — Catops varicornis Ro-

senhauer, Beiträge d. Ins. Eur. I p. 23. — Hr. N. P. Jørgensen meddeler, at han har 9 Stkr. fra Odense og Munke Mose, tagne i April, August og September. Meddeleren mener, at den ogsaa findes i andre Samlinger og kun ved Forglemmelse ikke tidligere er indkommet i vore Fortegnelser. Ved Eftersyn af min egen Samling fandt jeg, at jeg havde 3 Stkr. af denne Art fra Roden Skov, Lolland, Mai.

90. **Choleua colonoides** Kraatz. — Fremkommet af Træ fra Sundby Storskov, Lolland, April og Mai, ialt 6 Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
-

Histeridae.

7. **Hister terricola** Germ. — Amtmandshaven, Nykjøbing F., i Mai, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
9. **Hister marginatus** Er. — Sellerød, Nordsjælland, i Mai, enkelt. Kapt. Wielandt.
18. **Atholus bimaculatus** L. — Flere Gange ved Aalborg, Johansen. 3 Stkr. i Haver i Haderslev, L. Andersen. Refsnæs, Aug., flere, Schlick.
29. **Saprinus virescens** Payk. — Enkeltvis, dels ved Sigtning og dels kætsede, Eisbøl og Tørning i Sønderjylland, Mai, L. Andersen.
30. **Saprinus conjungens** Payk. — Enkelt paa Halk Strand ved Haderslev, Mai, L. Andersen.
40. **Onthophilus striatus** Fabr. — Enkeltvis paa Als, i en Have, Juni, L. Andersen. Enkelte i Peders Ny-mark ved Nyraad, Juni, under Aadsel, Vald. Nielsen.
- *40a. **Abraeus globulus** Creutz. — Hister globulus Creutzer, Ent. Vers. p. 83. — Hr. N. P. Jørgensen, Odense, meddeler: »af denne let kjendelige Art sigtede jeg i en Skov ved Tommerup $\frac{27}{9}$ 96 1 Stk.; et andet fandtes kort efter i en Plantedyng paa en Mark ved Odense, $\frac{13}{10}$ 96.«
44. **Aeritus minutus** Fabr. — En Snæ Stykker, dels

under Bark paa en gammel Bøg, dels fremkomne i Klækkehus af Træ fra samme, April, Juni og Sept.— Nov., ikke gjenfunden i de senere Aar, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.

Phalacridae.

2. *Phalaerus substriatus* Gyll. — Enkeltvis i Vend-syssel, Johansen, og ved Aalholm, Forf.
 3. *Phalaerus caricis* St. — Denne Art synes langtfra at være sjeldent. Jeg har fundet den i uhyre Mængder flere Steder paa Lolland og Sjælland. Den holder sig til smaa, solaabne, fugtige Pletter i Skove, saadanne Steder, hvor kun visse Carex-Arter synes at trives, og hvor der om Sommeren næsten bliver tørt. Paa saadanne Steder, ialfald paa Sjælland og de sydlige Øer, gaar man vist næppe forgjæves efter denne Art.
-

Nitidulidae.

2. *Cercus rufilabris* Latr. — Killerup, Fyn, Juni, N. P. Jørgensen; 2 Stkr., nedbankede af blomstrende Hvidtjørn, Eisbøl, Mai, L. Andersen.
8. *Epuraea decemguttata* Fabr. — Klækket i Antal af udflydende Egesaft fra Bognæs, Aug., E. Rosenberg.
31. *Nitidula quadripustulata* Fabr. — Oftere i Antal i Nordsjælland. Hr. L. Andersen meddeler, at den enkelte Aar er almindelig i og ved Haderslev, paa tørre Aadsler.
32. *Soronia punctatissima* Illig. — Ved Steilbjerg ved Kolding, i Balsampople, angrebne af Cossus, Juli, E. Jürgensen.
34. *Amphotis marginata* Fabr. — Nedbanket af Slaaen i Gærder ved Kolding, Sept., E. Jürgensen.

47. **Meligethes corvinus** Er. — Enkelt paa Als, i Mai, L. Andersen.
54. **Meligethes ochropus** St. — Fire Stykker samme Sted og Tid som foregaaende, L. Andersen.
64. **Cychramus luteus** F. — Almindelig ved Haderslev, fra Mai til Oktober, L. Andersen.
67. **Cryptarcha strigata** F. — Foruden tidligere kjendte Lokaliteter anføres Tarup, Fyn, hvor Hr. N. P. Jørgensen har fundet den i April. Hr. E. Rosenberg har klækket Dyret i Antal af udflydende Egesaft fra Bognæs, August.
68. **Cryptarcha imperialis** F. — Ligesom foregaaende er den klækket i Antal af udflydende Egesaft fra Bognæs, August, E. Rosenberg.
71. **Ips quadripunctata** Hbst. — Flere Steder paa Fyn, saaledes Hunderup, Tommerup og Brahetrolleborg, samt ved Vejle, Mai og Juni, N. P. Jørgensen. Enkelt i Gejsing Skov ved Kolding, Jensen-Haarup. En længere Række ved udflydende Saft under Bark paa Bægetræer i Rævkjær, Sønderjylland, Mai, L. Andersen.
72. **Ips quadripustulata** L. — I Bøgestubbe ved Brahetrolleborg, Mai, N. P. Jørgensen.
73. **Ips ferruginea** L. — Som nyt Findested for denne Art anføres Fyn, hvor Hr. N. P. Jørgensen har fundet et enkelt Exemplar, siddende paa en Mur ved Fruens Bøge, Odense, Juli.
76. **Rhizophagus parallelocollis** Gyll. — Vestre Kirkegaards Mur, skarevis i Mai. Det er en bekjendt Sag, at denne Art undertiden optræder i stor Mængde paa Kirkegaarde, og engang er den i Frankrig funden i Antal i Træ af Ligkister flere Fod under Jorden. I Nykjøbing F. har Kmhr. Fabritius de Tengnagel fundet den i Mængde i Mai og Juni. Ligeført har Hr. L. Andersen engang fundet den i Mængde under Ellebark i Haderslev, i Mai, men ikke senere genfundet den. Pastor J. Møller har taget den paa en

Mur i Randers, og Hr. N. P. Jørgensen anfører den fra Grib Skov, Juli.

78. *Rhizophagus cribratus* Gyll. — Restrup ved Aalborg, enkeltvis i Eg, Juni og Juli, Johansen. To Stykker ved Valborup i et Stød, Mai, Dr. Jørgensen og Kons. Løvendal.
-

Trogositidae.

1. *Nemosoma elongata* L. — Jeg har oftere taget denne Art paa et gammelt Risgjærde i Frejlev Skov og har haft Lejlighed til at iagttagte, hvorledes den, ved at beje Hovedet i Vinkel mod Thorax og derefter dette i Vinkel mod Bagkroppen, formaar at trænge sig ind gjennem Borehullerne og ind i Gange af *Cryphalus tiliae* og formodentlig andre smaa Tomiciner, hvis Gange den fuldstændigt fylder med sit lange slanke Legeme, og af hvis Yngel den ernærer sig.
 6. *Thymalus limbatus* F. — En lille Række i Lindum Skov, Juli, L. Andersen. Bygholm Skov ved Horsens, Jensen-Haarup.
-

Colydiidae.

5. *Colydium elongatum* F. — Lindum Skov, paa Birk, Juni, i Antal, paa Jagt efter *Xyloterus*, Johansen.
- *5a. *Teredus nitidus* F. — *Lyctus nitidus* Fabricius, Ent. Syst. II. p. 505, *Teredus nitidus* Schuckard, Brit. Col. delin. t. 34. f. 6. (*cylindricus* Oliv., *volvulus* F.). — Kmhr. Fabritius de Tengnagel har fundet et enkelt Stykke af denne Art i Midtlolland paa Eg, i Juni, i Selskab med *Hypophloeus fasciatus*.
9. *Cerylon fagi* Bris. — Enkelt i en træsket Bøgegren, Rude Hegn, Mai, E. Rosenberg. Boserup, Mai, enkelt, Forf.
11. *Cerylon deplanatum* Gyll. — Enkelt i Lindum Skov, Juli, L. Andersen og i Ulfslyst, Sønderjylland, Aug., Joh. Andersen.

Cucujidae.

11. *Psammoechus bipunctatus* F. — Søborg i Nord-sjælland, i Dynger af huggede Rør, Juli, i Antal, N. P. Jørgensen. Almindelig ved Haderslev Dam, April—Juni, i Aarene 1888—93, senere kun enkeltvis, L. Andersen.
 17. *Silvanus similis* Wesm. — Enkelt i Christianssæde Skov, Lolland, April, Kmhr. Fabritius de Tengnagel og i Rude Hegn paa en Granstub, Juli, Forf.
 18. *Silvanus advena* Waltl. — I gjærende Mais i Kjøbenhavns Frihavn optraadte den i Somren 1898 i uhyre Tal, Wielandt.
-

Cryptophagidae.

1. *Telmatophilus caricis* Oliv. — Foruden tidligere anførte Lokaliteter anføres Haderslev Dam, hvor Hr. L. Andersen har taget en lille Række i April.
2. *Telmatophilus typhae* Fall. — En længere Række paa Dunhammer, Mai, Viuf ved Kolding, samt enkelt ved Haderslev Dam, Juni, L. Andersen.
3. *Telmatophilus Schönherrii* Gyll. — Enkelt i Juni ved Haderslev Dam, L. Andersen.
4. *Antherophagus nigricornis* F. — Enkeltvis ved Valby, Juli, og ved Sødringholm, Juli og Aug., Baron Rosenkrantz. Skjørping, Juli, flere, Johansen. Enkelt i Jonstrup Vang, Aug., Ass. West. Enkeltvis i Rude Hegn, Juli, O. Holstebroe og Forf.
5. *Antherophagus silaceus* Hbst. — Asnæs, Juli, enkelt, N. P. Jørgensen. Enkeltvis i Rævkjær og Eisbøl, Sønderjylland, Juli, L. Andersen. Enkelt i en Bikube, Ladelund, Sønderjylland, Juli, Johansen.
7. *Emphylus glaber* Gyll. — I Myretuer, fra Marts til Mai, i Fredsted og Eisbøl, Sønderjylland, dog i begrændset Antal, L. Andersen.

8. **Cryptophagus lycoperdi** Hbst. — Foruden tidligere kjendte Findesteder anføres Haderslev, hvor den ifølge Hr. L. Andersen er almindelig i Bovister fra Juni til September.
10. **Cryptophagus Schmidti** St. — Et Par Stykker i Eisbøl, Sønderjylland, Juli, L. Andersen.
16. **Cryptophagus fumatus** Marsh. — Stalden ved Brønderslev, Sept., mange, Johansen.
18. **Cryptophagus badius** St. — 5 Stkr. i Styding, Sønderjylland, Juni, L. Andersen.
21. **Cryptophagus labilis** Er. — Vallø, 6 Stkr., Juli, N. P. Jørgensen.
30. **Cryptophagus pubescens** St. — Ved Vejle Sø, Nord-sjælland, i en Gedehamserede, Okt., Rosenberg.
35. **Paramecosoma melanocephalum** Hbst. — Fænø, Aug., mange, Johansen og N. P. Jørgensen. Sidst-nævnte Samler har ogsaa taget den i Opskyl ved Fruens Bøge, ved Odense, i April, Mai og Juni.
36. **Caenoscelis ferruginea** Sahlb. — Hr. N. P. Jørgensen har sigtet nogle Stykker i Næsbyhoved Skov ved Odense, i Mai og Oktober.
37. **Agathengis fimetarii** Hbst. — Funden i Antal i en Svamp, *Coprinus comatus*, paa Vesterfælled ved Kjøbenhavn af Hr. Cand. pharm. Kløcker, og senere gjen-funden der af flere Samlere i Oktober.
68. **Ephistemus nigriclavis** Stph. — Enkelte Stykker i Sanderum Mose ved Odense, Mai, N. P. Jørgensen.

Lathridiidae.

1. **Myrmecoxenus subterraneus** Chevr. — Adserbo Over-drev, Nordsjælland, Mai, hos Myrer, en lille Række, Rosenberg. Fredensborg Omegn, September, i en Myretue, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- *6. **Anommatus duodecimstriatus** Wesm. — A. duodecimstriatus Wesmael, Bull. Acad. Brux. II (1836) p. 338. (obsoletus Stph., terricola Wesm.). — I

Gladiolusknolde i Amtmandshaven, Nykøbing F. Sommeren, især Juli 1899, ialt ca. 15 Škr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Angaaende Fundet bemærkes, at der ikke i mange Aar var indforskrevet Gladiolusknolde til Haven, og at Dydrene derfor sikkert var udviklede paa Stedet og sandsynligvis ikke engang indførte men virkelig hjemmehørende i Haven. Baron Rosenkrantz har i sin Kjælder i Colbjørnsensgade i Kjøbenhavn fundet et enkelt Exemplar, ved Sigtning, i September 1899. Dydret, der ganske mangler Øjne, angives at leve i forraadnende Knolde under Jorden, f. Ex. syge Kartofler, undertiden under Stene, i Møddinger, under Høstakke etc.

16. **Lathridius rugicollis** Oliv. — Funden i Antal paa Granris, Tommerup, Fyn, Septbr. og enkelt ved Langesø, Fyn, Aug., af N. P. Jørgensen. Enkelt i Estrup Skov ved Vejen Station, Jensen-Haarup. En lille Række ved Kætsning under Graner i Rude Hegn, Juli, Forf.
 17. **Lathridius Bergrothi** Reitt. — Foruden paa det tidligere anførte Findested, hvor den atter er gjenfunden i Antal i Juni og Juli af Baron Rosenkrantz, er et enkelt Stykke fremkommen af Træ fra Lolland i Kmhr. Fabritius de Tengnagels Klækkehushus, i Oktbr.; et enkelt Stykke er fundet i en Kasse med raaddent Hø i Aalbæk Præstegaard, Salling, i April, af Pastor J. Møller.
 25. **Enicmus testaceus** Steph. — Sorø Sønderskov, i sorte Svampe paa Granstammer, Juni, enkelt, Forf.
 27. **Cartodere elongata** Curt. — I en Kjælder i Kjøbenhavn, Juni og Juli, i Antal, Baron Rosenkrantz.
 28. **Cartodere filiformis** Gyll. — I Antal paa samme Tid og Sted som foregaaende, Baron Rosenkrantz.
 32. **Corticaria fulva** Com. — I Antal paa samme Sted og Tid som de to foregaaende, Baron Rosenkrantz.
-

Mycetophagidae.

6. *Mycetophagus populi* F. — 3 Stkr., Styding, Sønderjylland, i Juni, L. Andersen.
 7. *Mycetophagus quadriguttatus* Müll. — 4 Stkr. i en Vindueskarm i Haderslev, Marts, L. Andersen.
-

Dermestidae.

13. *Dermestes murinus* L. — Enkelt i Sønderborg By, Mai, L. Andersen.
 18. *Megatoma undata* L. — I Antal er den tagen under Birkebark i Bøllemosen i Oktober af E. Rosenberg; enkeltvis af flere Samlere, i Sommermaanederne, paa mange Steder, ogsaa i Sønderjylland af L. Andersen.
 25. *Trinodes hirtus* F. — En længere Række paa Mure i Juli i Nellemose paa Fyn, L. Andersen.
-

Byrrhidae.

32. *Byrrhus murinus* F. — En længere Række ved Vojens, Mai, L. Andersen.
 37. *Limnichus pygmaeus* St. — I Antal i en Lergrav ved Haderslev, August, L. Andersen.
-

Parnidae.

- *39a. *Parnus lutulentus* Er. — *P. lutulentus* Erichson, Ins. Deutschl. III. p. 514. — Hr. A. C. Jensen-Haarup meddeler, at han har fundet 2 typiske Stykker af denne Art i en Mose ved Jerne ved Esbjerg, men at han tillige har fundet Exemplarer, der, hvad Dækvingernes Punktur angaaer, danner Overgang til *prolifericornis* Fabr. Uden Tvivl trænges der til en Revision af denne Slægt, thi ogsaa ved flere af de andre

Arter synes der at være saa store Variationer, at Bestemmelsen ofte er højest tvivlsom.

41. **Parnus luridus** Er. — Salling, April, Pastor J. Møller.
 - *47a. **Limnius rivularis** Rosenh. — L. rivularis Rosenhauer i Die Thiere Andalusiens. p. 113. — I Nørholm Skov N. f. Varde fandt jeg i Aug. 1900 i en lille Bæk, lige ved dens Udløb i Varde Aa, en stor Mængde Limnier, der ved Undersøgelse viste sig at være forskjellige fra *L. tuberculatus* Müll., og som jeg bestemte som nærværende Art, efter Can. Fowlers: Coleoptera of the british Islands. Ved en senere Sammenligning med de i Natural History Museum i London opstillede Exemplarer fandt jeg denne Bestemmelse bekræftet, men da jeg af danske Expl. af *L. tuberculatus* kun har havt Lejlighed til at sammenligne den ny Art med mine egne, der stamme dels fra Fure Sø, dels fra Brabrand Sø ved Aarhus, de sidste meddelte af Baron Rosenkrantz, kan jeg ikke afgøre, om den ny Art allerede skulde findes opstillet i Samlingerne herhjemme blandet mellem *tuberculatus*, og jeg kan derfor heller ikke danne mig nogen Mening om dens Udbredelse og Forekomst.
 48. **Limnius troglodytes** Gyll. — Denne tidligere kun i Fure Sø fundne Art er af Hr. Johansen taget i stort Antal, i Aug., i Opskyl ved Madum Sø i Egnen Syd for Skjerpingle.
-

Cisidae.

67. **Cis nitidus** Hbst. — Klækket i Antal af en Svamp fra Silkeborg Vesterskov, Juli, N. P. Jørgensen.
- *71a. **Cis cornutus** Gyll. — Cis cornutus Gyllenhal, Ins. Suec. IV p. 626. Ennearthron cornutum Aut. — Klækket af Træ fra Sundby Storskov i Maj, Aug. og

Sept., ialt en Snæ Stykker, og enkelte af Træ fra Redsle Skov, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Hvedholm, Aug., N. P. Jørgensen.

Scarabaeidae.

- *4a. **Serica holosericea** Scop. — *Scarabaeus holosericeus* Scopoli, Ann. hist. nat. (1770) p. 77. (*variabilis*, F.). — Ved en Excursion, som Kons. Løvendal, Dr. C. Jørgensen og Forf. foretog til Bornholm i 1900, og hvori min engelske Samlerven Mr. B. G. Rye deltog, fandt sidstnævnte, en af de første Dage i Juni, paa sandede Skraaninger ved Foden af Lerskrænter ud mod Østersøen, nær ved Arnager Fiskerleje paa Bornholms Systrand, nogle Stykker af denne for vor Fauna ny Art. Ved nærmere Undersøgelse af denne Kyststrækning fandtes et større Antal. Dydrene, der formodentlig sværme oppe paa Højlandet paa Toppen af Skrænterne, faldt ned paa det løse Sand og kunde ikke der finde Fodfæste til atter at flyve bort. Et Par Stykker af denne Art skal iøvrigt være fundet af Skoleinspektør Carl Christensen, Frederiksværk, det første Stykke i Sandet ved et Skovdige ved Frederiksværk Skov, i Mai 1898, det andet paa Vejen mellem Sonnerup og Brederød ved Arresø.
- 5. **Serica brunnea** L. — Kmhr. Fabritius de Tengnagel meddeler, at han i Amtmandshaven i Thisted har iagttaget denne Art sværmende i uhyre Mængde om en Lampe paa en varm Augustaften, men udelukkende Hanner.
- 9. **Hoplia farinosa** L. — Med Hensyn til Synonymien bemærker jeg i Anledning af, at flere Samlere antage Arten for ureigtigt bestemt, at Erichson i Nat. Ins. Deutschl. III. p. 505 henfører denne Art til *H. philanthus* Sulz. Schiedte har, uden at motivere sin Handling, forandret Navnet og dermed ogsaa Syno-

nymirækken for denne Art under Henvisning til, at den af Erichson, loc. cit., er opført som *H. philanthus*. Grunden synes at ligge nær, idet Linné's *farinosa* er opført i Fauna Suecica, saa at Linné utvivlsomt ved dette Navn har ment den nordligere Art, der forekommer i Sverrig (Thomson, Skand. Col. V. 15), medens Erichsons *farinosa* er en sydligere Art. Naar man ser hen til de meget utilstrækkelige Diagnoser givne af Linné, er det ikke muligt bestemt at fastslaa, hvilken Art han har ment; men det synes da urigtigt at bruge Linnés Navn, givet til en svensk Art, til dermed at betegne en Art, der lever i Syden og ikkegaard højere op end til Mellemtykland.

Enkelte Stykker af denne sjeldne Art ere fundne ved Guldborgsund paa en Skrænt, i Juni, af Kmhr. Fabritius de Tengnagel og paa Stranden udfor Jægerspris Nordskov, Juli, flyvende ved Middagstid, af E. Rosenberg.

16. **Osmoderma eremita** L. — Foruden tidligere nævnte Findesteder anføres Lekkende ved Præstø, hvor Baron Rosenkrantz har fundet ialt 4 Stkr. i August. Vemmetofte Dyrehave 3 Stkr., Cand. Klæcker.
23. **Odonteus mobilicornis** F. — Enkelt i Knuthenborg Park, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel, ved Nyraad, Juni, om Natten, V. Nielsen og i en Have ved Egernsund, Sønderjylland, Juli, L. Andersen.
29. **Onthophagus Schreberi** L. — En lille Række fra Refsnæs, Aug., Schlick.
30. **Copris lunaris** L. — I Mængde ved Halk, Sønderjylland, i Maj, L. Andersen.
40. **Aphodius foetidus** F. — Jægersborg Dyrehave, i Hjortegjedning, Sept., Ass. West.
54. **Aphodius porcus** F. — Ved Burre Sø i Nordsjælland, i Kogjødning, i Antal, August, E. Rosenberg. Vejle og Esbjerg, Jensen-Haarup; Hvorup og Lundby Bakker, flere Gange, i Antal, Johansen. I Heste-

- gjødning paa Landevejen Syd for Rønne, Bornholm, Juni, i stor Mængde, Cand. Klæcker.
56. **Aphodius scrofa** F. — Enkelt paa Nordfalster, Jensen-Haarup.
 59. **Aphodius quadriguttatus** Hbst. — Enkelt paa en sandet Mark ved Tammestrup, mellem Skanderborg og Horsens, Juli, Cand. Klæcker.
 69. **Heptaulacus villosus** Gyll. — Enkelt ved Esbjerg, Juli, Jensen-Haarup. Hvorup, Juli, i Antal, Johansen.
 70. **Plagiogonus arenarius** Oliv. — En længere Række i Juli, ved Husum, L. Andersen.
 73. **Psammodius sulcicollis** Ill. — Gjedser, i Mai, Skagen, i Juli, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Nærum Overdrev, Nordsj., April, i Antal, E. Rosenberg. Esbjerg, Jensen-Haarup, Ræbild Bakker ved Skjørping, enkeltvis, i Juni, Forf.
 - 73a. **Psammodius vulneratus** St. — En lille Række paa Refsnæs, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 78. **Lucanus cervus** L. — Ved Kolding har Hr. E. Jürgensen samlet en længere Række ved Strandhusene i Juli og August. I meget stort Antal er den fundet ved Gjessø, Syd for Silkeborg af Lærer S. Pedersen. Der foreligger herfra meget store Exemplarer, den største Han maaler endog 85 mm.
-

Buprestidae.

1. **Chrysobothris affinis** F. — Fire Stykker blev fundne i Hillerød, August 1898, under Bark paa Træ fra Grib Skov, Baron Rosenkrantz.
5. **Anthaxia quadripunctata** L. — I Juli 1897 i Antal ved Husum, for en stor Del defekte, Joh. Andersen.
7. **Chalcophora Mariana** L. — Et enkelt Stykke i Haderslev, i et Snedkerværksted, Maj, L. Andersen.

9. **Ancylochira rustica** L. — Ligesom foregaaende, samme Samler.
 10. **Ancylochira punctata** F. — Paa Rugballegaard ved Vejle fremkom af en Vindueskarm, der i mindst 12—13 Aar havde ligget paa Plads, i Juni—Juli 1876, 4 Stykker af denne Art. I Juni 1889 er der af samme Vindueskarm fremkommet endnu 2 Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Nexø, Juli, enkelt, Stud. polyt. C. Jørgensen, meddelt af Hr. E. Rosenberg.
 11. **Ancylochira flavomaculata** F. — Enkelt i Gjedved ved Horsens, i et Drivhus, Seminarielærer Martin Christensen, meddelt af Hr. A. C. Jensen-Haarup.
 14. **Agrilus laticornis** Ill. — Foruden tidligere anførte Findesteder nævnes Sødringholm ved Mariager, Juli—Aug., enkeltvis, Baron Rosenkrantz, Bognæs, Aug., nedbanket af Eg, nogle Stkr, E. Rosenberg og Ass. West, samt Fruens Bøge ved Odense, Juli, enkelt, N. P. Jørgensen.
 - 14a. **Agrilus coeruleus** Rossi. — Udbredt og ikke sjeldent i Sønderjylland, L. Andersen. Herfra synes den at udbrede sig langs Østkysten af Jylland saa langt som til Vejle. Den er taget i Bramdrup Skov ved Kolding fra midt i Juni til først i Aug. 1890—1900, enkelte Aar hyppig, E. Jürgensen, ved Løverodde ved Kolding, Juni, enkelt, Kapt. Wielandt og Munkebjerg ved Vejle, Juni, enkelt, N. P. Jørgensen.
 15. **Trachys minuta** L. — Foruden tidligere nævnte Findesteder anføres kun et enkelt Stykke fundet ved Slesvig, Juli, Joh. Andersen.
 16. **Aphanisticus pusillus** Oliv. — Stranden ved Rønne, Bornholm, Juni, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Stranden ved Bognæs, Juni, kætset om Eftermiddagen, E. Rosenberg. Hjerpsted Strand, Sønderjylland, Aug., enkelt, L. Andersen.
-

Elateridae.

3. **Eucnemis capucinus** Ahr. — Et enkelt Stykke er kætset i Frederiksgave ved Assens, i Juli, af Joh. Andersen.
4. **Microrhagus pygmaeus** F. — Af denne Art er der i Aarenes Løb gjort saa mange Fund, at det vilde blive for vidtløftigt at nævne dem særskilt. Den er udbredt, men sjeldent og enkeltvis forekommende og anføres fra Hals Skov, Vendsyssel, Kaas Skov, Salling, Jægerspris, Nordsjælland, Nørholm Skov ved Varde, Bremersvold paa Lolland samt Bornholm. I større Tal er den klækket af Kmhr. Fabritius de Tengnagel, af Træ fra Lolland og Falster. Juni og Juli angives stedse som Findetider.
8. **Cardiophorus asellus** Er. — Hr. L. Andersen meddeler, at denne Art er temmelig almindelig i Hedenegnene i Sønderjylland.
- *8a. **Cardiophorus cinereus** Hbst. — Elater cinereus Herbst, Arch. V p. 114, (pilosus Payk. nec Herbst, equiseti Herbst, Gyllh.). — I Juli 1891 fandtes et enkelt Stykke af denne ny Art paa Hammeren, Bornholm, af Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Senere er den taget i ret betydeligt Antal af den nævnte Samler, Kons. Løvendal, Dr. C. Jørgensen, Mr. Rye og Forf., alle i Juni Maaned.
- *8b. **Cardiophorus equiseti** Hbst. — Elater equiseti Herbst, Füssl. Arch. V. Pag. 114 (pilosus Herbst, nec Payk., luridipes Lac.). — Bornholms Sydkyst, ved Arnager Fiskerleje, Juni, enkeltvis, Kons. Løvendal, Mr. Rye og Forf. Hr. Løvendal ejer endvidere et enkelt Stykke fra Dronninglund, Vendsyssel, der henstod ubestemt, men som viser sig at tilhøre denne Art.
10. **Cryptohypnus sabulicola** Boh. — Gjedser, Juni, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Tissø, Juni, i Sandet ved Søbredden, E. Rosenberg.

11. **Cryptohypnus pulchellus** L. — Denne Art forekommer jævnligt og undertiden talrig saavel i Grusgrave og sandede Pletter inde i Landet som ved Strand- og Søbredder. De ved Stranden forekommende Individer synes alle at henhøre til en fra de øvrige ret afvigende Form, som Regel kraftigere bygget og mørkere udfarvet med stærkt kjølformede Ribber paa Vingedækernes Stribemellemrum og med Kjølene paa Thorax's Baghjørner forlængede fremefter til langt over Midten, undertiden næsten lige til Forhjørnerne, bagtil stærkt indbugtede, hvorved der bliver et meget bredt Mellemrum mellem Kjølen selv og Thorax's Siderand, og endelig i selve Baghjørnet stærkt udadbøjede. Endelig har denne Form som oftest en ret kraftig Behaaring af korte, graa Børster. Skjøndt denne Strandform, der i Tegning meget varierer og hvis helt sorte Varietet er beskrevet af Boheman som særegen Art (se nedenfor), er ret forskjellig fra den inde i Landet sædvanlig forekommende Form, findes der dog hos denne Individer, der stærkt nærme sig Strandformen. Jeg har saaledes paa en sandet Plet i Nærheden af Thorsø ved Silkeborg fundet en stor Mængde Individer, der tydeligt viser Overgangen mellem de 2 Former.

Var. *arenicola* Boh. — Cr. *arenicola* Boheman, Act. Holm. 1852 p. 76. Thoms. Skand. Col. VI. 115. El. *pulchellus*, var. e., Gyll. Ins. Suec. III. 423 53. Cr. *pulchellus*, var. *niger unicolor*. Er. Nat. Ins. Deutschl. IV. 365. — Denne den mest udprægede, helt sorte Varietet af Strandformen af *Cr. pulchellus* er taget af Kmhr. Fabritius de Tengnagel paa Due-oddnen, Bornholm, i stort Antal, i Juli, ligeledes enkeltvis ved Kjettrupgaard, ved Blokhus, i Juli, samt af Hr. E. Rosenberg paa Fanø. Ved Esbjerg ere enkelte Exemplarer tagne sammen med mere eller mindre plettede Exemplarer i stort Antal af Hr. Kons. Lø-vendal, Hr. A. C. Jensen-Haarup og Forf. i Juni.

- *11a. *Cryptohypnus quadriguttatus* Lap. — Cr. quadriguttatus de Laporte, Comte de Castelnau, Hist. nat. Col. I. p. 245, Cr. tetragraphus Germar, Z. V. 143. (quadripustulatus Payk. nec Fabr.). — Funden af Hr. E. Rosenberg i Mai 1897 ved Boserup Strand, ved at sigte den opskyllede Tang. Den var da tilstede i stort Antal og varierende fra næsten helt sort med svagt antydede Pletter indtil sort med 4 skarpe gule Pletter. I de senere Aar gjenfundet enkeltvis af samme Samler og Kapt. Wielandt.
15. *Melanotus niger* Pz. — Bornholm, ved Hammeren, Juli 1891, en lille Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel og Baron Rosenkrantz. Det følgende Aar gjenfundet sammesteds i Antal paa Hvidtjørnsblomster, i Juni, Kons. Løvendal. Enkeltvis under Stene ved Arnager paa Bornholms Sydkyst, Juni, Mr. Rye.
- *17a. *Synaptus filiformis* Fabr. — El. filiformis Fabricius, Syst. El. II 235. *Synaptus* Eschscholtz, Thon. Arch. II. 1. 32. (incola Herbst, cinereus Ill.). — Husum, Sønderjylland, 2 Stykker i Juli 1900, Joh. Andersen.
20. *Agriotes pilosus* Pz. — Enkelt ved Kolding, Juni, nedbanket af Ask og ved Strandhuse ved Kolding, Mai, paa Hvidtjørnsblomster, E. Jürgensen. Hr. L. Andersen meddeler, at den er temmelig almindelig ved Haderslev.
21. *Agriotes pallidulus* Ill. — Et Par Stykker, Bognæs, Juni, nedbanket af Eg, Ass. West; enkeltvis i Sønderjylland, Juli, L. Andersen og Joh. Andersen.
30. *Ampedus dibaphus* Schiø. — Flere Gange fra Sundby Storskov, Lolland, tildels klækket, Apr., Mai og Juni Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
40. *Ludius ferrugineus* L. — Klækket af Kmhr. Fabricius de Tengnagel af Træ fra Sundby Storskov, Juli, enkelt, samt oftere af Løvendal og Holstebroe af Larver fra Bognæs og Bremersvold Skove. Et eneste

- Exemplar af Imago er fundet i det Fri, nemlig af Baron Rosenkrantz ved Lekkende, ved Præstø, Aug.
42. **Megapenthes tibialis** Boisd. & Lac. — Jaegersborg Dyrehave, 3 Stkr., Juni, Baron Rosenkrantz. Et enkelt Stykke klækket af El fra samme Lokalitet, Mai, Ass. West.
44. **Hypolithus riparius** F. — Ved Esrom Sø, Juli, i Mængde, J. C. Nielsen og enkelt, i April, E. Rosenberg. Strand ved Kolding Fjord, Juli, E. Jürgensen. Ikke sjeldent ved Haderslev og Halk i Sønderjylland, L. Andersen.
51. **Diacanthus quercus** Gyll. — Enkelt i Ry Nørreskov, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel og i Nørholm Skov v. Varde, Juli, Jensen-Haarup. En lille Række nedbanket af Eg ved Gram, Sønderjylland, Juni, Wielandt.
54. **Diacanthus impressus** F. — Teglstrup Hegn, Juni og Juli, en længere Række, Baron Rosenkrantz. Hornbæk, Juli, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt, nedbanket af Fyr ved Slesvig, Juli, Joh. Andersen.
55. **Diacanthus metallicus** Payk. — Horsens, enkelt, Jensen-Haarup.
58. **Diacanthus castaneus** L. — Enkeltevis i Gels Skov, Mai og Juni og i Teglstrup Hegn, Juni og Juli, Baron Rosenkrantz. Greisdalen ved Vejle, Juni, og Stenderup Skov, paa Gran, Mai, E. Jürgensen.
- *58a. **Diacanthus purpureus** Poda. — El. *purpureus* Poda. Ins. Mus. Graecensis (Gratz) 1761. p. 41. El. *chrysomelinus* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776. p. 60. El. *haematodes* Fabr. Gen. Ins. I. 271. 35. Syst. El. II. 237. 81. Kiesw. Nat. d. Ins. Deutschl. IV. 279. — Med Hensyn til Synonymien bemærkes, at denne Art oftest er kjendt under Navnet *haematodes* F. Dette Navn kan dog ikke bibeholdes, da saavel Müller som Poda har beskrevet Arten før Fabricius. Forfattere, der, som Poda, hører til Tiden før Linnés

Systema naturæ 12. Udgave bliver i Almindelighed ikke tagne i Betragtning, og det laa derfor nær at indføre Müllers Navn for denne Art, men da de fleste nyere Forfattere, saasom Harold & Gemminger, Heyden, Reitter & Weise, alligevel benyttte Podas Navn, har jeg foretrukket at følge disse.

Hr. Wielandt har i sin Samling et Stykke af denne Art, som han erindrer at have taget i en Bøge-stub i Grib Skov i Juli 1886, men som har hen-staaet ubestemt. Hr. L. Andersen har taget den i temmeligt stort Antal i Sattrup Skov, Sønderjylland, dels i Hvidtjørnsblomster og dels nedbanket af Eg og tilføjter, at efter Prof. Wüstneis Meddeelse skal den i de sidste Aar være næsten helt forsvunden fra denne Lokalitet.

59. **Athous mutilatus** Rosenh. — Et enkelt Stykke, klækket af Træ fra Sundby Storskov, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 61. **Athous rhombeus** Ol. — Klækket af Træ fra Sundby Storskov, Juli, i Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. 3 Stkr., i Eg, ved Bognæs, Aug., Ass. West.
 66. **Campylus denticollis** F. — Enkeltvis ved Haderslev, i Mangstrup, Tørning og Fredsted samt ved Vejle, mest paa Eg, en enkelt Gang paa Bøg, L. Andersen. Enkeltvis ved Gjessø, S. for Silkeborg, Juni, Esben Petersen, S. Pedersen og Mr. Rye.
-

Dascillidae.

3. **Helodes marginata** F. — Foruden tidligere nævnte Findesteder anføres, Lethraborg, Juni, 4 Stkr., E. Rosenberg. Tase Skov ved Bavelse Sø, Sydsjælland, Juni, i Antal, O. Holstebroe og Forf. Almindelig i Skove ved Kolding paa vilde Kirsebær, Juni, E. Jürgensen.
12. **Prionocypphon serricornis** Ph. Müll. — Enkeltvis,

- Lilleklint, Møen, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 Klækket, i Juli, af Dynd fra en hul Ahorn i Jægersborg Dyrehave, enkelt, Schlick. I stort Antal, i hule Træer, i Skovene ved Løvenholt, Salten, Juni, Kons. Løvendal og Mr. Rye. Frejlev Skov, kætset, Juni, et enkelt Stykke, O. Holstebroe.
14. **Scirtes orbicularis** Panz. — Munke Mose, Juni, enkelt, N. P. Jørgensen.
 15. **Eubria palustris** Germ. — Skoveng ved Kolding, fra sidst i Juni til først i Juli, vistnok paa Bukkeblad, E. Jürgensen og Holstebroe. Enkelt paa en Skoveng ved Vejle Fjord, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 16. **Dictyopterus minutus** F. — Enkelt, paa en Mur, Østlolland, Syd for Sundby Storskov, Aug., Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Esrom, enkelt, Kapt. Wielandt.
 - *16a. **Dictyopterus affinis** Payk. — *Lycus affinis* Paykull, Faun. Suec. 2. 176. *Pyropterus affinis* Muls. (*nigro-rubra* a. ♀ De Geer). — I Engen mellem Onsild Station og Lindum Skov fandt Hr. Holstebroe, i raad-dent Træ paa en Birk, 2 Pupper, der klækkedes i Juli, og viste sig at være denne for vor Fauna ny Art.
 17. **Dictyopterus Cosnardi** Guér. — Pomle Nakke, Øst-falster, Juni, 4 Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt i Skoven ved Gaabense, Jensen-Haarup.
 51. **Podabrus alpinus** Payk. — Foruden tidligere anførte Findesteder nævnes: Sønderjylland, enkeltvis, i Juni, i Rævkjær og Riis Skove, L. Andersen. Lethraborg, enkeltvis, Juni, Forf.
 22. **Thelephorus violaceus** Payk. — Af ny Findesteder for denne Art anføres: Sønderjylland, Rævkjær, Riis og Gravenshoved Skove, Juni, enkeltvis, L. Andersen. Tase, ved Bavelse Sø, Sydsjælland, Juni, en lille Række, Holstebroe og Forf. Enkelt ved Arnager Fiskerleje, Bornholms Systrand, Juni, Forf.
 30. **Thelephorus sudetica** Letzner. — Ved Esbjerg fundt

Kons. Løvdal, Hr. Jensen-Haarup og jeg, i Juni 1898, denne Art, i stort Antal, under Tang paa Strandbredden. Saa vidt jeg ved er Arten kun funden paa denne Lokalitet ved denne ene Lejlighed, og Dydrene er sikkert skyllede op af Havet fra en anden Lokalitet.

- 34a. *Thelephorus pilosus* Payk. — Enkelt i Rugballegaard Skov ved Vejle, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- 38. *Thelephorus lateralis* L. — Enkelt ved Husum, Sønderjylland, Juli, Joh. Andersen. Engang i stor Mængde paa Skærmblomster ved en Grøft paa det Inddæmmede ved Bremersvold, Lolland, i Juni, Forf.
- 44. *Rhagonycha elongata* Fall. — Hornbæk, Juni, ikke sjælden, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt, i Tidsvilde Hegn, Juli, E. Rosenberg.
- 46. *Silis bidentata* Latr. — Lyngby Mose, Juni-Juli, mange, Baron Rosenkrantz, E. Rosenberg, O. Holstebroe og flere Samlere. Søborg, Nordsjælland, i Hø paa den udterrede Søbund, Juli, i Antal paa Vandplanter ved Odense Aa, Munke Mose, i Juni og Juli, ikke sjælden, N. P. Jørgensen. Almindelig i Juni ved Haderslev Dam, ogsaa enkeltvis ved Fjorden, L. Andersen.
- *61a. *Apalochrus femoralis* Er. — Apalochrus femoralis Erichson, Entomogr. I. p. 53, Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV p. 577. — Et Par Stykker af denne for vor Fauna ny Art er fundet ved Spodsbjærg paa Langeland, i August, af Hr. Cand. W. Schlick.
- 65. *Malachius marginellus* Oliv. — Fænø i Kolding Fjord og Stenderup Skov ved Kolding, Juni-Juli, i Blomster, E. Jürgensen. Enkelt paa Fanø, Jensen-Haarup.
- 67. *Anthocomus sanguinolentus* F. — Maribo, Juli, i Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Tranekjær, Langeland, Aug., flere, Schlik. Enkelt paa Møens Sydkyst, nær Klintholm Havn, Aug., Forf.
- 68. *Anthocomus fasciatus* L. — En længere Række ved

Assens, Juli, ogsaa enkeltvis ved Haderslev, L. Andersen. I Haver ved Kolding, i blomstrende Roser, Juli, E. Jürgensen.

- *71a. *Dasytes fusculus* Ill. — *Melyris fuscula* Illiger, Mag. I p. 82. (*femoralis Krynicki*, *pallipes Fald.*). — Kmhr. Fabritius de Tengnagel har ved Thureby, i Juni, taget et Stykke, som han mener at høre til denne Art.
 - 73. *Dasytes obscurus* Gyll. — Jægersborg Dyrehave, Juni, 4 Stykker, Baron Rosenkrantz.
 - 74. *Dasytes niger* L. — Sundby Storskov, Lolland, Juni, 3 Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Thureby, Mai, 4 Stkr., og Svendstrup, Juli, enkeltvis, E. Rosenberg. Flere Stykker ved Hammeren, Bornholm, Juni, Kons. Løvendal, Dr. Jørgensen, Mr. Rye og Forf.
 - 75. *Dolichosoma lineare* Rossi. — Sætkjær, Jylland, paa Marehalm, Juli, en lille Række, stud. mag. Ditlevsen. En længere Række i Sønderjylland, ved Husum og Slesvig, Juli, Joh. Andersen. I Antal paa en Skoveng i Kærgaard Skov ved Esbjerg, Juni, A. C. Jensen-Haarup, Mr. Rye og Forf.
 - 76. *Haplocnemus nigricornis* F. — Af ny Findesteder anføres: Stenderup Skov, kætset mellem smaa Graner, Mai og Juni, E. Jürgensen. Sønderjylland, ved Tørning, September, L. Andersen. Klækket af Træ fra Redsle Skov, Falster, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Hareskov, Nordsj., Juni, Forf., altid kun enkeltvis.
 - 76a. *Julistus floralis* F. — Et Par, Han og Hun, nedbanket af Eg, Svenstrup d. 27. 6. 97. E. Rosenberg.
 - 77. *Phloeophilus Edwardsi* Stph. — Fortunens Indelukke i Jægersborg Dyrehave, kætset i Græsset, Okt., flere, Kapt. Wielandt. Sammesteds, i Sept., 3 Stkr., Schlick.
-

Cleridae.

82. *Necrobia ruficollis* F. — Af denne Art, der tidligere kun er funden i og omkring Byerne, har Kmhr. Fabritius de Tengnagel, ved Gjedser, i Sept. taget 5 Stykker paa en død Sælhund paa Strandbredden. Et Par Stykker i Esbjerg, Jensen-Haarup.
-

Ptinidae.

88. *Ptinus rufipes* F. — Foruden tidligere nævnte Findesteder anføres: Sønderjylland, Styding og Tørning, hvor Hr. L. Andersen har nedbanket flere Stkr., af gamle tørre Ege- og Hasselgrene, i Juli.
95. *Niptus hololeucus* Fald. — Almindelig paa Loftet i Hillerød, J. C. Nielsen. I et Posthus i Haderslev er denne Art optrædt i massevis i gamle Akter, som den har ødelagt, og hvor den tillige har fortæret et Par ny Støvler, L. Andersen.
-

Anobiidae.

110. *Xestobium plumbeum* Ill. — Klækket i stort Tal, deriblandt ikke faa Stykker af den gule Varietet, af Træ fra Sundby Storskov, April og Mai, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkelt i Bognæs, Juni, Ass. West.
117. *Xyletinus ater* Panz. — Enkeltvis, Fanø, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Sammesteds, og Asserbo Overdrev, enkeltvis, E. Rosenberg. Vosnæsgaard Skov, Jylland, Juni, enkelt, Pastor J. Møller. Enkeltvis i Klitterne udenfor Tidsvilde Hegn, Juni, E. Rosenberg, Mr. Rye og Forf.
- 117a. *Lasioderma testacea* Dft. — *Ptilinus testaceus* Duftschmid, Faun. Austr. III. 46. 7. *Lasioderma Steph.* Ill. Br. Ent. V. 447. — Baron Rosenkrantz

modtog fra Engestofte, Lolland, en halv Snes Individer af en ham ukjendt Bille, med Angivelse, at de var fundne i Urtekramvarer; han bestemte dem som hørende til nærværende Art, hvilken Bestemmelse ogsaa viser sig at være rigtig. Det har senere vist sig, at de paa Museet, under Navnet *Cathorama tabaci* Guer., opstillede Biller i Virkeligheden henhører til nærværende Art, der bør indføres paa denne Plads i Fortegnelsen.

120. *Enneatoma bovistae* Ent. Hft. — Klækket i stort Antal af Bovister fra Vesterfælled, Febr.-Marts, ogsaa nogle Stykker fra Jægersborg Dyrehave, klækkede i Marts, E. Rosenberg.
 122. *Cathorhama tabaci* Guer. — Denne Art udgaar af Fortegnelsen, se ovfr. under Nr. 117a.
 127. *Lyctus canaliculatus* F. — Enkelt i Sønderjylland, under Barken paa en Egestub, i Vesterris, Juni, L. Andersen.
-

Tenebrionidae.

1. *Blaps mortisaga* L. — I stort Antal i Kældere i Gaabense Færgegaard, Falster, Jensen-Haarup.
12. *Diaperis boleti* L. — Foruden i Silkeborg Egnen, hvor den oftere er gjenfunden, anføres følgende ny Lokaliteter: Tidsvilde Hegn, Mai, Juni og September, i Antal, i den hvide Birkesvamp, E. Rosenberg og flere Samlere.
13. *Platydema violacea* F. — Enkelt, Gels Skov, Dec., sightet i Egeløv, stud. mag. Ditlevsen, og Bognæs, Juli, paa Eg, Ass. West. Enkelt, Ulfslyst, Sønderjylland, Juni, L. Andersen.
20. *Hypophloeus fasciatus* F. — Foruden det tidligere nævnte Fund anføres: Kjeldskov, ved Bremersvold, paa en lynslaaet Eg, Juni, i Mængde, Kons. Løvendal og Forf. Midtlolland, i Eg, Juni, en halv Snes Stykker,

- Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Svenstrup, Sjælland, Juni, mange, Kons. Løvendal.
29. **Allecula morio** F. — Klækket, i stort Antal, af trøsket Eg fra Jægersborg Dyrehave, Juni, E. Rosenberg. Flere Gange i Aalholm Slot, Juli, vistnok udviklet i gamle trøskede Egebjælker, Forf.
- 29a. **Allecula Løvendalii** Reitt. — Findes udbredt i en stor Del af Jægersborg Dyrehave; klækket, i Antal, af trøsket Bøgetræ, Mai og Juni, E. Rosenberg.
31. **Mycetocharis axillaris** Payk. — Klækket, i Antal, af trøsket Bøgetræ fra Jægersborg Dyrehave, i Mai, E. Rosenberg, og i Juni, Ass. West.
-

Cistelidae.

33. **Cistela cerambooides** L. — Nogle Stykker i Juni, Pomle Nakke, Falster, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Klækket af trøsket El fra Jægersborg Dyrehave, Mai, 5 Stkr., E. Rosenberg. Enkelt, i et fugtigt Bøgestød i Jægersborg Dyrehave, Juli, Nystrøm. Enkelt, i Hyldeblomster, Halskov paa Falster, Juli, Pastor J. Møller.
- *35a. **Hymenalia rufipes** F. — *Cistela rufipes* Fabricius Ent. Syst. I. 2. p. 44. *H. fusca* Mulsant, Pect. p. 48. (*fusca* Ill.). — Et enkelt Stykke fra Bornholm, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
37. **Cteniopus sulphureus** L. — Refsnæs, Juli, i uhyre Mængde, Bulbjerg og Skagen, Juli, ikke sjælden, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Vosnæsgaard Skov, Juni, i Mængde og Vester Ulslev Præstegaardshave, Lolland, Juli, enkelt, Pastor J. Møller. Enkelt, Frederiksværk, Juni, Forstkandidat C. Larsen. Flokkevis paa Skærmlplanter, Lynæs, Nordsjælland, Juli, J. C. Nielsen. I Mængde paa Skærmlplanter, især *Libanotis*, paa Samsø, Juli, N. P. Jørgensen.
-

Salpingidae.

39. ***Salpingus castaneus*** Panz. — Hornbæk Plantage, Juni, i Mængde, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Rude Hegn, under Fyrrebark, Marts, i Antal, E. Rosenberg. Boserup og Bognæs, Juni, en lille Række, samt Gels Skov, April og Mai, en lille Række, Baron Rosenkrantz. Bornholm, ved Stampen, Juni, enkeltvis, Mr. Rye og Forf. Ved Husum, paa Fyr, Juli, Joh. Andersen.
 - 39a. ***Salpingus mutilatus*** Bech. — Enkeltvis paa Fyn, ved Marienlund, Nov. og Fruens Bøge, Mai, N. P. Jørgensen. 2 Stykker, under Bark paa et udgaaet Kirsebærtræ, i Kolding Skov, Sept., E. Jürgensen.
 40. ***Salpingus foveolatus*** Ljungb. — Gels Skov, Nov., enkelt, Schlick. Als, Mai, enkelt, L. Andersen.
 41. ***Lissodema cursor*** L. — Nordskovene ved Jægerspris. Juli, tre Stkr., kætsede, E. Rosenberg. Enkelt, Rude Hegn, Juni, Kapt. Wielandt.
 45. ***Rhinosimus viridipennis*** Latr. — Paa et gammelt Risgærde i Mavrmosen, ved Bremersvold, Mai, i Antal, O. Holstebroe, og Oktober, en Række, Forf. Enkelt, klækket af Træ fra Sundby Storskov, Lolland, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 - 46a. ***Pytho depressus*** L. — Denne Art synes at brede sig i Nordsjælland. Foruden Tidsvilde, hvor den oftere er taget, er den funden i Rude Hegn, Juni, 2 Stkr., Mr. Rye, og klækket af Larver fra Gels Skov, Aug., Schlick og E. Rosenberg.
-

Melandryidae.

47. ***Tetratoma ancora*** F. — Enkelt, klækket af Træ fra Lolland, Mai, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. 2 Stykker, nedbankede af gamle udgaaede Pile, Juli og Sept., Rævkjær og Styding i Sønderjylland,

- L. Andersen. Enkelt, paa et Risgjærde ved Bremersvold, Lolland, Okt., Forf.
49. *Orchesia sepicola* Rosh. — Svenstrup, Sjælland, paa Risgærder, Juni og Aug., i Antal, E. Rosenberg. Enkelt, Tørring, Sønderjylland, Sept., L. Andersen.
51. *Hallomenus humeralis* Panz. — En halv Snes Stykker fremkom i Kmhr. Fabritius de Tengnagels Klækkehus, af Træ fra Lolland, i Juli. I Svampe paa en Kastanjestub, i København, Juni-Juli, ca. 30 Stkr., Kapt. Wielandt. Østskov ved Sønderby, Nordsjælland, Aug., i en Swamp paa en Egestub, enkelt, E. Rosenberg.
53. *Anisoxya fuscula* Ill. — En halv Snes Stykker er fremkomne i Kmhr. Fabritius de Tengnagels Klækkehns, af Træ fra Lolland, Juni. En lille Række paa Risgjærder af Poppel, Nellemose paa Fyn, Juli, L. Andersen.
54. *Abdera affinis* Payk. — En lille Række, klækket af Swamp paa El fra Hytterkobbel ved Hoptrup, Sønderjylland, L. Andersen.
55. *Abdera flexuosa* Payk. — Kjeld Skov, Lolland, Juni, Pastor J. Møller. En lille Række, klækket af Elle-svamp fra Tørring, Sønderjylland, Juli, L. Andersen.
56. *Hypulus quercinus* Quens. — Boserup, Maj, et Par Stykker, E. Rosenberg.
59. *Melandrya canaliculata* F. — Klækket af Træ fra Lolland, Mai, en lille Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Boserup, Juni, en lille Række, Baron Rosenkrantz, samt enkelt, E. Rosenberg.
- 59a. *Melandrya flavigornis* Duft. — Enkelt ved Pomle Nakke, Falster, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.

Anthicidae.

68. *Anthicus instabilis* Schmidt. — A. instabilis Schmidt, i Stett. Ent. H. III p. 184. A. talaris Schiødte,

- Nat. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 38. (humilis Ths. nec Germ). — Der forekommer mig ikke at være nogen Grund til længere at bibe holde Schiødtes Navn for denne Art, der er vel kjendt under det Navn Schmidt har givet den flere Aar tidligere. Mine engelske Exemplarer ere fuldkomment identiske med de danske. Den foreligger fra Æbelø, Korshavn ved Odense Fjord og Asnæs, N. P. Jørgensen, fra Refsnæs og Botofte og Stengade Strand, paa Langeland, Aug., i meget stort Antal, Schlick, og fra Lollands Sydkyst, enkelt, og Korsør Nor, en længere Række, Forf. Den er funden i alle Maanederne fra Mai til Septbr.
69. *Anthicus bimaculatus* Ill. — Blokhus, Juni, i Mængde, Johansen. Bornholm, nær Arnager Fiskeleje, paa Sydkysten, Juni, i Antal, Kons. Løvendal, Dr. Jørgensen, Mr. Rye og Forf.
76. *Anthicus ater* Panz. — Talrig ved Horsens, Jensen-Haarup. Kolding Fjord, i Sigtegods, April og September, E. Jürgensen.

Pyrochroidae.

78. *Pyrochroa rubens* Schal. — Svanemosen ved Nyraad, Sydsjælland, i Antal, i de første Dage af Juni 1897, senere enkeltvis, Vald. Nielsen. Rissinge ved Kjerteminde, Juni, i Antal, Forstk. C. Larsen. Vejle, Mai, Jensen-Haarup.
79. *Pyrochroa pectinicornis* L. — Kaas Skov, Salling, Mai-Juni, 2 Stykker, paa Egestubbe, Pastor J. Møller. Lindum Skov, nedbanket af Eg, Juni, enkelt, Forf.

Mordellidae.

81. *Mordella aculeata* L. — Ikke sjeldent, i Forsommeren, omkring Odense, især paa Ranunkler; i Antal, paa

- Achillea millefolium*, ved Kværndrup, Juli, N. P. Jørgensen.
82. **Mordellistena abdominalis** F. — Enkeltvis, i Mai og Juni, i Taps, Syd for Kolding, og i Fredsted, Sønderjylland, L. Andersen. Flere ved Bremersvold, Juni, Forf.
- 82a. **Mordellistena humeralis** L. — I Kmhr. Fabritius de Tengnagels og Prof. Gædekkens Klækkehuse er fremkommen en større Række, af Træ fra Lolland og Gjærdestof fra Frejlev, Juni. Bremersvold, nedbanket af et Risgjærde, Sept., enkelt, Pastor J. Møller.
83. **Mordellistena lateralis** Oliv. — Taasinge, Juli, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. 2 Stkr., Gram, Sønderjylland, Juli, L. Andersen. 3 Stkr., paa Risgjærder mellem Nykjøbing F. og Frejlev, Juni, Forf.
- 88a. **Anaspis ruficollis** F. — Foruden Bremersvold, Lolland, hvor jeg oftere har gjenvundet den, nævnes: Liselund, Møen, hvor Baron Rosenkrantz har fundet den i Mængde i Juni-Juli, og Knudshoved, hvor et Par Stykker er fundne af Kmhr. Fabritius de Tengnagel i Juni.
-

Rhipiphoridae.

- 91a. **Metocetus paradoxus** L. — Et enkelt Stykke er fundet paa en Skjærvebunke paa en Vej ved Hillerød, Aug., af Hr. J. C. Nielsen.
-

Meloidae.

94. **Meloë brevicollis** Panz. — Udenfor Jylland, hvor den er udbredt og mange Steder almindelig, foreligger kun et enkelt Fund, nemlig fra Donse, Nord-sjælland, hvor Hr. stud. mag. Ditlevsen har fundet et enkelt Stykke i Mai.
95. **Meloë variegatus** Don. — Almindelig, sammen med

foregaaende Art, fra April til Juni, i Hedeegne vest for Haderslev, L. Andersen. Enkeltvis ved Esbjerg, Mr. Rye. Ikke sjælden ved Gjessø, Syd for Silkeborg, Lærer S. Pedersen. Salling, Juni, enkelt, Pastor J. Møller.

96. *Lytta vesicatoria* L. — Foruden tidligere nævnte Findesteder anføres: Vester Ulslev Præstegaardshave, paa Hængeask, Juni, i Mængde, Pastor J. Møller. Tidsvilde Hegn, Juli, Forstk. C. Larsen. Nyraad, ved Vordingborg, Juni-Juli, Vald. Nielsen og Forf.
-

Oedemeridae.

- 98a. *Asclera cinerascens* Pand. — Skafføgaard, Juni, 2 Stkr., Pastor J. Møller.
101. *Oedemera coerulea* L. — Bornholm, Juli, mange, Baron Rosenkrantz og flere Samlere.
102. *Oedemera croceicollis* Gyll. — I Dr. Meinerts Tillæg blev omtalt enkelte Fund fra Lyngby Mose. Siden den Tid er Dyret oftere taget paa denne Lokalitet, endog i ret betydeligt Antal, i Juni og Juli, i forskjellige Blomster.
105. *Chrysanthia viridis* Schmidt. — Kapt. Wielandt har et Stykke af denne Art fra Esrom, taget i 1887, som har henstaaet ubestemt i hans Samling, indtil Dyret blev bekjendt fra Tidsvilde.
-

Cerambycidae.

1. *Spondylis buprestoides* L. — Tidsvilde Hegn, Juni, enkelt, Cand. Klæcker; sammestedes Rester af døde Exemplarer, i stort Antal, paa opstابل Brænde, J. C. Nielsen, der ogsaa har taget et enkelt Stykke i Hillerød, paa Træ fra Grib Skov, Aug. Endelig har Hr. H. Nystrøm i en Have, der støder op til

- Gels Skov, d. 29 Juli, om Aftenen Kl. 10, fanget et Stykke, der sværmede henover en Græsplæne.
5. **Criocephalum rusticum** L. — Foruden paa Tømmerpladser, hvor Arten af og til er funden, foreligger den fra et Hus i Hillerød, hvor Hr. J. C. Nielsen har taget den i Antal.
 6. **Criocephalum epibata** Schiø. — Et enkelt Stykke, i September, paa et Tømmeroplæg ved Haderslev, hvor alt Træet siges at stamme fra Skovene i Omegnen, L. Andersen.
 14. **Clytus mysticus** L. — Af den sorte Varietet har Baron Rosenkrantz i Jægersborg Dyrehave taget 2 Stkr., i Juni.
 15. **Gracilia minuta** F. — Amtmandsboligen, Nykjøbing F., Juni-Juli, i stor Mængde, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. I et Hus i Hillerød har den holdt sig igennem en Aarrække paa et Loft, i en stor Kurv, og kan tages der i Antal i Slutningen af Juni, J. C. Nielsen.
 17. **Molorchus umbellatarum** L. — Bremersvold, Lolland, paa Skjærbloster, Juni, Pastor J. Møller. I Antal, Nordfalster, Esben Petersen. Enkelt i Slesvig, nedbanket af Skovæble i Tørning, Juni, L. Andersen.
 20. **Callidium undatum** L. — Et enkelt Stykke ved Åabenraa, Juni, L. Andersen. Kjøbenhavn, Nyhavn, enkelt, Cand. Klæcker.
 29. **Rhagium bifasciatum** F. — I Skovene ved Kolding, ikke sjælden, i Forsommeren; Varieteten med Feltet mellem Pletterne helt hvidt er funden i 2 Exemplarer, Han og Hun, Bramdrup Skov, i April, E. Jürgensen.
 30. **Toxotus cursor** L. — Ry Nørreskov, Juni, O. Holstebroe.
 - 32a. **Toxotus Lamed** L. — Paa en Skovvej i Asserbo, ved Frederiksværk, Juli, et enkelt Exemplar, Inspektør C. Christensen.
 34. **Pachyta collaris** L. — I Antal ved Vordingborg, Duurloo. Bjerremarken paa samme Egn, en længere

- Række, Juni, Vald. Nielsen og Forf. Knuthenborg Park, Juni, nogle Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Flere Stkr. i Nørholm Skov ved Varde, Juni-Juli, Jensen-Haarup, Mr. Rye og Forf.
- 37a. **Leptura analis** Pauz. — Et Par Stykker er fundne af Hr. Jensen-Haarup i Nørholm Skov ved Varde i Juni og Juli.
38. **Leptura praeusta** F. — Kjeld Skov, Lolland, i Hvidtjørnsblomster, Juni, en lille Række, Pastor J. Møller.
40. **Leptura octomaculata** F. — Foruden ved Vejle, hvor den ofte er gjenfundet af mange Samlere, anføres: Sønderjylland, Tørring, Juli, en lille Række, L. Andersen og i Angel, en Mil Øst for Flensborg, i Antal, paa *Anthriscus silvestris*, Jensen-Haarup. Gjessø Skov, Lærer S. Pedersen.
- 40a. **Leptura sexguttata** F. — En længere Række, deriblandt enkelte af den helt sorte Varietet, i Nørholm Skov ved Varde¹, Juni-Juli, Jensen-Haarup, Mr. Rye og Forf. Enkelt i Mausing Skov ved Silkeborg, Esben Petersen. Bornholm, ved Almindingen, Juni, enkelt, Løvendal. 2 Stkr., kætsede paa Ranunkler, i Riis Skov ved Aabenraa, Juni, L. Andersen. Enkelt, Gram, Juni, paa Hindbær, Kapt. Wielandt.
- *34b. **Leptura sexmaculata** L. — L. sexmaculata Linné, Syst. Nat. Ed. X. p. 398. L. trifasciata Fabricius, Ent. Syst. I. 2. p. 349. — Et enkelt Stykke, nedbanket, i Hornbæks Plantage, i Juni, Kons. Løvendal.
47. **Leptura atra** F. — Af og til, i Antal, i Hunderup Skov, Fyn, i Forsommeren, ofte sværmende i Solskinnet, N. P. Jørgensen. I Sønderjylland er den almindelig i Brombærblomster, Juni, L. Andersen.
51. **Leptura revestita** L. — Enkelt, i et Egekrat ved Odense Kanal, Juni, N. P. Jørgensen. Tirsdagsskoven ved Hillerød, Juni, J. C. Nielsen.
53. **Astynomus aedilis** L. — Hillerød, paa Træ fra Grib Skov, Aug.-Sept., endog saa sent som 15 Nov.,

- J. C. Nielsen. Flere, i Oktober, paa Skibsbroen i Haderslev, L. Andersen.
59. **Pogonocherus fascicularis** F. — Et Par Stykker, paa Granris, ved Gjerup, Fyn, September, N. P. Jørgensen. Tidsvilde, Juni, i stort Antal, flere Samlere.
60. **Pogonocherus hispidus** F. — Enkelt i Mausing Skov, ved Silkeborg, Esben Petersen. Enkelt, Brede, Juni, stud. mag. Ditlevsen. Enkelt, i Sønderjylland, ved Styding, Juni, L. Andersen.
64. **Monochamus sutor** L. — Enkelt i Vojens, Sønderjylland, Juni, L. Andersen.
65. **Monochamus sartor** F. — Kolding Havn, Juli, enkelt, E. Jürgensen. Enkelt ved Aabenraa, Juni, L. Andersen.
67. **Mesosa nubila** Ol. — Enkelt ved Silkeborg, Esben Petersen og i Christiansdal i Sønderjylland, Juni, L. Andersen.
71. **Saperda scalaris** L. — Klækket, i meget stort Antal, af Træ fra Hald Skov, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
75. **Oberea linearis** L. — Frejlev og Roden Skove paa Lolland, Juni, 4 Stykker, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Ved Hillerød og Frederiksborg Nyhuse, Juli, J. C. Nielsen. Ved Laurbjerg i Jylland fandt Told-assistert Holstebroe nogle Stykker i Juni, og nogle Dage senere fandtes et stort Antal, sværmende om gamle Hasselbuske, paa samme Sted, af Mr. Rye, Mr. Skinner og Forf.

Curculionidae.

3. **Barynotus moerens** F. — Strand ved Stenderup Skov, Juni og Juli, enkeltvis, E. Jürgensen. Skoven ved Hammershus, Bornholm, flere, ædende af Bladene paa *Mercurialis perennis*, Juni, Forf. Enkelt i Erme-lunden, paa Ler, Marts, E. Rosenberg. Et Par Stykker i Juni, Eisbel, Sønderjylland, L. Andersen, og enkelte ved Husum, Joh. Andersen.

4. *Barynotus Schønherri* Zett. — Enkelt ved Skørping, Aug., og ved Lønstrup, Juni, stud. mag. A. Ditlevsen.
5. *Cneorhinus exaratus* Schønh. — Lindum, Juni, Pastor J. Møller. Sandet Mark ved Borup Station, Mai, og Jægerspris, Juni, begge Gange et Par Stykker, Forf.
9. *Strophosomus curvipes* Ths. — Sødringholm, Juli-Aug., enkeltvis, Rosenkrantz. Vrist Klit, S. f. Harboør, Juni, i Antal, Forf.
11. *Strophosomus limbatus* F. — En længere Række, Frøslev, Sønderjylland, Mai, L. Andersen.
13. *Brachyderes incanus* L. — Silkeborg Nørreskov, nedbanket af Birk, et Par Gange, i Juli, N. P. Jørgensen. Tidsvilde Hegn, ret hyppig, Juni, Forf. Husum, Juli, paa Fyr, en lille Række, Joh. Andersen.
- *14a. *Sitona cambrica* Stph. — *S. cambricus* Stephens, Ill. Br. Ent. IV. p. 140. (*cribricollis* Gyll.). — I slaaet Græs ved Langense, Fyn, Juli 1870, 2 Stkr., N. P. Jørgensen. Et Stykke fandtes af Hr. A. C. Jensen-Haarup, i April 1901, ved Jerne Præstegaardshave, ved Esbjerg, derefter enkelte i Kærgaards Skov og endelig et større Antal, ved Roden af Årteblomstrede, ved Stranden mellem Hjerting og Esbjerg, af samme Samler og Mr. Rye.
- *17a. *Sitona cylindricollis* Fahrs. — *Curc. cylindricollis* Fahraeus, i Schønh. Gen. Curc. VI. 1. 269. *S. meliloti* Walt. Ann. and Mag. XVII. 232. — Arnager Fiskerleje, Bornholm, Juni, enkelt, Forf.
- 25a. *Polydrosus flavipes* De G. — Enkelt, paa Eg, i Styding, Sønderjylland, Mai, Joh. Andersen.
31. *Tanymecus palliatus* F. — Vester Ulslev Præstegaardshave og Bremersvold, Lolland, i Juni-Juli, paa Tidsler, flere, Pastor J. Møller. Gjenfunden ved Husum, i Juli 1900, Joh. Andersen.
32. *Chlorophanus viridis* Linn. — Ligeledes gjenfunden ved Husum, i Juli 1900, Joh. Andersen.
35. *Otiorhynchus pabulinus* L. — Enkeltvis ved Lejre,

- Mai, Løvendal og Forf. I en Plantedyng ved Næsby, Mai, en halv Snes Stykker, N. P. Jørgensen. Enkelt ved Husum, Juli, Joh. Andersen.
39. *Otiorhynchus sulcatus* F. — Amtmandshaven Nykjøbing F., hele Sommeren, i stort Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
42. *Otiorhynchus uncinatus* Germ. — Liselund, Møen, Mai-Juni, en lille Række, Rosenkrantz.
44. *Otiorhynchus ligneus* Oliv. — Ikke sjælden i Egnen om Esbjerg, A. C. Jensen-Haarup. Meget almindelig ved Harboøre, Forf. Thisted, i en Sandgrav, Juni-Juli, i Mængde, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
48. *Omias mollicomus* Ahr. — Curc. mollicomus Ahrens N. Schrift. Nat. Ges. Halle II. 2. 17; Om. Boheman i Schönh. Gen. Curc. p. II. p. 506. — Denne Art, der i tidligere Fortegnelser, paa Grund af en Bestemmelsesfejl, har været opført under Navnet *O. brunnipes* Oliv., er endvidere funden af Hr. Pastor J. Møller, i flere Expl., Juni-Juli, i Vester Ulslev Præstegaards Have, Lolland, under Pilebuske.
- *48a. *Omias araneiformis* Schr. — Curc.? araneiformis Schrank, Enum. Ins. p. 125. (*brunnipes* Oliv.). — Funden i Jordbær i Vilvordes Have, Charlottenlund, Juni-Juli, H. P. Duurloo og senere W. Lundbeck.
62. *Gronops lunatus* F. — Aalbæk Præstegaard, i en Lade, Aug.-Sept., talrig, Pastor J. Møller. Lillerød, Sept., E. Rosenberg. Brede, Nordsjælland, Sept., i Antal, Forf.
63. *Orthochaetes setiger* Beck. — Enkelt, Fruens Bøge, ved Odense, N. P. Jørgensen.
74. *Hypera murina* F. — Enkelt paa Bornholm, ved Arnager Fiskerleje, Juni, Forf.
77. *Hypera trilineata* Marsh. — Et Par, Frederiksdal, Juli, Kapt. Wielandt.
79. *Hypera plantaginis* De G. — Salling, April og Juli, enkeltvis, Pastor J. Møller. Harboøre, Juni, Nørholm Skov, ved Varde, Aug., og Gels Skov, Mai, enkeltvis, Forf.

81. **Hypera mutabilis** Germ. — Enkelt ved Lekkende, Aug., og Færgegaarden, Thy, Sept., Baron Rosenkrantz. Enkelt, Bremersvold, Lolland, Nov., Forf.
- *82a. **Limobius dissimilis** Hbst. — Curc. dissimilis Herbst, Natursystem VI. p. 290. Limobius Schh. — Et Par Exemplarer, i Mai 1888, i Nellemose paa Fyn, L. Andersen. 3 Stkr. paa Bornholm, i Juli 1891, Baron Rosenkrantz. Enkelt ved Hammeren, Juni, Mr. Rye. 3 Stkr. ved Husum, Juli, Joh. Andersen.
85. **Cleonus trisulcatus** Hbst. — Enkeltvis ved Kolding, Mai-Juni, E. Jürgensen.
86. **Cleonus albidus** F. — Foruden tidligere nævnte Findesteder anføres: Strand ved Stenderup Skov, Mai, E. Jürgensen. Helsingør, ved Stranden, Mai-Juni, Rosenkrantz. Tidsvilde, Silkeborg, Bornholm, flere Samlere.
88. **Cleonus nebulosus** L. — Enkelt, Tidsvilde, Juni, Ass. West, samt Nørholm Skov ved Varde og Skjørping, begge Steder i Aug., Forf.
91. **Lixus turbatus** Gyll. — Et større Antal er fremkommet, dels ved Klækning af Pupper fundne i Stængler af *Cnidium venosum*, dels kætsede, fra Lyngby Mose, Prof. Gædeken, Baron Rosenkrantz og andre Samlere. Skolebestyrer N. P. Jørgensen har fundet den i Mængde, i Mai, paa en Mark ved Odense, paa *Anthriscus silvestris*, senere klækket adskillige Expl. af Stængler af samme Plante, og endelig fundet enkelte ved Killerup, Aug. Enkelt, Mai, i Eisbøl, Sønderjylland, L. Andersen.
97. **Hylobius fatuus** Rossi. — Enkelt ved Marienlund, Fyn, Aug., N. P. Jørgensen. 2 Expl. ved Gaabense, A. C. Jensen-Haarup.
99. **Pissodes notatus** F. — Tidsvilde Hegn, paa Fyr, Juni, E. Rosenberg og flere Samlere.
102. **Grypidius brunnirostris** F. — Ikke sjælden i Munke Mose, ogsaa ved Ullerslev og Vosemose, Fyn, i Opskyl

- om Foraaret, N. P. Jørgensen. Marts og Sept. paa Hunetorp Hede ved Ræbild, Joh. P. Johansen.
103. *Erirhinus festucae* Hbst. — Denne Art tør vel kaldes ret almindelig, og er ialfald meget udbredt: den angives fra Odense, almindelig i Opskyl, N. P. Jørgensen, Freilev, Lolland, Juni, Pastor J. Møller, Søndersø og Dronninggaard, Sjælland, Forf.
105. *Erirhinus scirrhosus* Schh. — Søborg, Juli, Vosemose, Mai, og Munke Mose, Fyn, April, N. P. Jørgensen. Enkelt ved Nyraad, Sydsjælland, Sept., Forf.
106. *Erirhinus pilumnus* Schh. — Enkelt ved Ribe, Juni, Kapt. Wielandt.
108. *Erirhinus aethiops* F. — Foruden enkelte spredte Fund i Gels Skov, er den funden i stort Antal ved Skovrøddam i Rude Hegn, i April og Mai, dels sigtet i Opskyl, dels funden siddende paa Græsstraa, af Prof. Gædeken, E. Rosenberg og flere Samlere. Tidsvilde, Juni, Ass. West.
109. *Erirhinus bimaculatus* F. — Enkeltvis ved Sødringholm, Juli, Rosenkrantz. Jævnlig ved Esbjerg, Jensen-Haarup. I stort Antal under Stene og i Fanghuller ved Harboøre, Forf.
116. *Dorytomus taeniatus* F. — Enkeltvis paa Stranden ved Guldborgsund, Juli, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Aabenraa, en lille Række, L. Andersen. Bøgehoved, Sønderjylland, Juni, enkelt, Joh. Andersen.
117. *Dorytomus majalis* Payk. — Klitterne ved Blokhus, Juli, i Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
124. *Mecinus collaris* Germ. — Marskenge i Esbjerg- og Ribe-Egnen, A. C. Jensen-Haarup.
- *130a. *Bagous argillaceus* Gyll. — *Rhynchaenus argillaceus* Gyllenhal III. 542. (*incerata* Gyll., *encaustus* Boh., *halophilus* Redtb.). — Et enkelt Stykke med lysgult Lokalitetsmærke, men uden nærmere Angivelse af Tid og Sted, Kons. Løvendal.
131. *Bagous limosus* Gyll. — Ved Donse Damme er den i de senere Aar optraadt i meget stort Antal i Op-

- skyl, navnlig i Mai. Endvidere er den funden i Sanderum Mose, Fyn, Mai og Juni og ved Lethraby, Aug.. i Antal, N. P. Jørgensen.
132. **Bagous diglyptus** Schh. — Enkeltvis ved Aaen i Fruens Bøge ved Svendborg, Juli og September, N. P. Jørgensen. Enkelt ved Aalborg, Joh. P. Johansen og i Eisbel, Sønderjylland, i April, L. Andersen.
 135. **Bagous tempestivus** Hbst. — Oftere i Antal ved Donse Dam, af flere Samlere. Ikke sjælden omkring Odense, N. P. Jørgensen. Rude Hegn, i Antal, April, Rosenkrantz.
 136. **Bagous frit** Hbst. — Nogle Stkr. i Opskyl ved Vosemose, Mai, N. P. Jørgensen. Enkelt ved Donse Dam, Mai, Forf.
 147. **Brachonyx indigena** Hbst. — Foruden i Nordsjælland, hvor den ofte er funden i Antal, anføres Husum i Sønderjylland, hvor en lille Række er taget i Juli af Joh. Andersen.
 151. **Apion Marshami** Stph. — I Vejleegnen har jeg flere Gange truffet den paa forskjellige Steder, dog noget sparsomt.
 153. **Apion penetrans** Germ. — Vildsund ved Thisted, Sept., en lille Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkeltvis, flere Gange, i Sept., paa Tidsler ved Killerup, Fyn, ligeledes, i Juli, ved Vallø, N. P. Jørgensen. Enkelt, Juli, ved Husum, L. Andersen.
 154. **Apion onopordi** Kirb. — Hr. N. P. Jørgensen meddeler om denne Art, at den foruden paa *Onopordon* ogsaa jævnlig findes paa de alm. Tidselarter.
 155. **Apion stolidum** Germ. — Enkeltvis omkring Odense, et Par Gange i September, N. P. Jørgensen. Enkelt, Husum, Juli, Joh. Andersen.
 - *156a. **Apion millum** Bach. — Apion millum Bach, Käferfn. II. p. 198 (annulipes Wenck). — I Antal ved Lekkende, Sydsjælland, i Juli-Aug., Baron Rosenkrantz.
 158. **Apion atomarium** Kirb. — Fanø, Aug., i stor

- Mængde, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Enkeltvis, Lekkende, Aug., Baron Rosenkrantz. Hvorup, Mai og igjen i Sept.-Okt., Joh. P. Johansen.
161. **Apion genistae** Kirb. — Flere Steder i Silkeborg-egnen, Juni, i Antal, Forf. Esbjerg, i Antal, Mr. Rye.
 162. **Apion pallipes** Kirb. — Killerup, Fyn, i Sept., i Antal paa *Mercurialis*, N. P. Jørgensen. Helsingør, skarevis, Sept., Baron Rosenkrantz.
 169. **Apion immune** Kirb. — Enkelt paa Als, i Mai, L. Andersen.
 170. **Apion pubescens** Kirb. — Falsters Østkyst, enkeltvis, i Sept., Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Vallø Dyrehave, Juli, en Række kætset paa *Lathyrus pratensis*, Killerup, Okt., samt Korshavn, Juli, enkeltvis, N. P. Jørgensen.
 171. **Apion simile** Kirb. — I Munke Mose ved Odense, sigtet i nedfaldent Løv, tidlig om Foraaret, N. P. Jørgensen. Hornbæk Plantage, Juni, flere, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Oftere nedbanket fra Birk eller sigtet af nedfaldent Birkeløv i Nordsjælland, Forf.
 173. **Apion seniculus** Kirb. — Skolebestyrer N. P. Jørgensen meddeler, at han altid har fundet denne Art paa ærteblomstrede Planter, derimod aldrig paa *Origanum vulgare*, hvilken Schiedte angiver som Foderplante, skønt han oftere har søgt den paa denne Plante.
 175. **Apion dissimile** Germ. — Rugballegaard Skov ved Vejle, Sept., flere, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 - *178a. **Apion Bohemani** Ths. — Apion Bohemani Thomson, Skand. Ins. VII. p. 60. (*ononicola* Bach, *ononidis* Gyll.). — Et enkelt Expl. fra Egnen om Himmelbjerget, Juli, N. P. Jørgensen. Muligvis vil Arten ved nærmere Undersøgelse af hvad der henstaar under Navnet *apricans* i Samlingerne, vise sig at være mere udbredt her i Landet.

182. **Apion ebeninum** Kirb. — Vejle Nørreskov, Juni, enkeltvis, Skovene omkring Nykjøbing F., ikke sjælden, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Munkebjerg ved Vejle, Aug., en Række, N. P. Jørgensen. Askov, Aug., flere, Joh. P. Johansen.
184. **Apion sulcifrons** Hbst. — Hvorup, Juni og Sept., mange, Joh. P. Johansen.
190. **Apion minimum** Hbst. — Bulbjerg, Juli, et Par Expl., Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
192. **Apion sorbi** F. — Enkeltvis omkring Odense, N. P. Jørgensen. Nogle Stykker ved Nykjøbing F., Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Slagslunde Overdrev ved Ølstykke, Aug., enkelt, Forf. Bøgehoved, Sønderjylland, Mai, 3 Stkr., L. Andersen.
- *192a. **Apion Hookeri** Kirb. — Apion Hookeri Kirby, Mon. p. 69. (rotundicolle Meg.). — Denne Art har været kjendt af Samlerne i mange Aar, men er hidtil ikke anført i Fortegnelsen. Den er optraadt i Mængde paa Grøftevolde ved Taarnby Strandfælled paa Amager og er her taget af de fleste kjøbenhavnske Samlere. Endvidere anføres følgende Fund: Odense, Efteraaret 1875, i stort Antal, senere ved Tommerup, Vejle, Asnæs, Sebber og flere Steder, N. P. Jørgensen. Bremersvold, Lolland, Juni, en Række, Forf. Als, Mai, et Par, L. Andersen.
194. **Apion columbinum** Germ. — Satstrup, Sønderjylland, Mai, 4 Stkr., L. Andersen.
195. **Apion intrusum** Gyll. — Aalborg, Juni, Joh. P. Johansen. Enkeltvis, eller i mindre Antal, paa Slagslunde Overdrev ved Ølstykke, Aug., Vindstrup Overdrev, Sydsjælland, Juni, Bremersvold og Freilev paa Lolland, Juni og Sept. og Nørholm Skov ved Varde Aug., Forf.
196. **Apion pisi** F. — Attelabus pisi Fabricius, Syst. El. II. p. 425. (gravidum Ol.). — Denne Art, der i tidligere Fortegnelser har staet opført under Navnet *A. Sundevalli*, er ret udbredt over hele Landet paa

Kløver. Almindelig, mange Steder, især paa Kløver, saavel paa Fyn og Sjælland som i Nørrejylland, især i Juli-Aug., N. P. Jørgensen. Taps, Juni, O. Holstebroe. Flere Steder paa Sjælland, paa Bornholm, Lolland og ved Hvorup i Jylland, i alle Sommermaanederne, Forf.

199. **Apion cruentatum** Walt. — En længere Række, i Juli, ved Husum, Joh. Andersen.
202. **Apion sanguineum** De Geer. — Enkelte Stkr., Mai-Juni, i Eisbøl, L. Andersen og Joh. Andersen.
- *206a. **Apion sedi** Germ. — Apion sedi, Germar, Mon. III. p. 49. (tumidicolle Bach). — Refsnæs, Juni 1896, 3 Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Arten angives at leve paa sandede Steder paa Sedumarter især *S. album* og *S. acre*.
208. **Magdalinus duplicatus** Germ. — Foruden tidligere nævnte Findesteder, hvor den ofte er gjenfunden, anføres: Boserup, Juni, enkelt, Baron Rosenkrantz, ved Dronninggaard, Juni, 4 Stkr., E. Rosenberg. 3 Stkr., paa Fyr, i Juli, ved Husum, Joh. Andersen.
210. **Magdalinus aterrimus** F. — Enkelt, Jægersborg Dyrehave, Juni, Baron Rosenkrantz.
211. **Magdalinus cerasi** L. — Nogle Stkr., paa Eg, ved Svendstrup, Sjælland, Juni, E. Rosenberg.
212. **Magdalinus barbicornis** Latr. — Agdrup, Juli, en Række, Joh. P. Johansen. Bollerslev, Sønderjylland, Juni, en lille Række, L. Andersen.
215. **Balaninus venosus** Germ. — Enkelte ved Lekkende, Sødringholm samt Helsingør, Juli-Aug., Baron Rosenkrantz. Fænø ved Kolding Fjord, paa Eg, Juli, E. Jürgensen. Enkeltvis, i Juni, ved Rævkjær, Sønderjylland, L. Andersen.
217. **Balaninus cerasorum** Hbst. — Enkelt, nedbanket af Slaaen ved Vejle Sø ved Holte, Aug., Wielandt. Enkelt, Lekkende, Aug., og Meulenburg, Nordsjælland, Juni, Baron Rosenkrantz.

218. **Balaninus crux** F. — I Antal paa Pil, i Juli 1900, ved Slesvig og Husum, Joh. Andersen.
221. **Anthonomus druparum** L. — I Antal ved Tase, Sydsjælland, Juni, O. Holstebroe og Forf.
224. **Anthonomus spilotus** Redt. — Vest for Kolding, i levende Hegn, paa Slaaen og Hvidtjørn, Okt.-Nov., enkelte Aar ikke sjælden, E. Jürgensen.
230. **Orchestes rufus** Oliv. — Enkelte Stykker i Nørholm Skov ved Varde, Juni og Aug., A. C. Jensen-Haarup og Forf. Enkeltvis paa unge Elme i Næsbyhoved Skov, N. P. Jørgensen. En lille Række, i Juni, ved Aabenraa, L. Andersen.
- *230a. **Orchestes alni** L. — Curc. alni Linné, Syst. nat. ed. X. p. 381. — Slesvig, Aug., 3 Stkr., L. Andersen.
- 232a. **Orchestes semirufus** Gyll. — Lyngby Mose, enkelt, Juni, Kapt. Wielandt.
- *232b. **Orchestes pubescens** Stev. — Curc. pubescens von Steven, Mus. Mosq. II. p. 101. (pilosus Gyll.). — Funden i Lyngby Mose, dels kætset, dels nedbanket af Birk, Juli, Kapt. Wielandt og andre Samlere. Arten varierer en Del i Farve, men synes dog altid at adskille sig i Habitus fra *O. scutellaris*, af hvilken denne, saavelsom ogsaa foregaaende Art, af mange Forfattere anses for en Varietet.
- *235a. **Orchestes saliceti** F. — Curc. saliceti Fabricius, Ent. Syst. I. 2. p. 446, Paykull, Mon. Curc. 1792. p. 66. (scutellata Schwamm.). — Paa *Salix cinerea* og *caprea* flere Steder omkring Odense, Mai-Juni; ogsaa i Opskyl fra Aaen ved Dalum, i April, mange, N. P. Jørgensen. I Kærgaard Skov ved Esbjerg, flere, A. C. Jensen-Haarup.
236. **Orchestes decoratus** Germ. — Bramdrup Skov ved Kolding, Juni-Juli, enkelte Aar almindelig, E. Jürgensen.
238. **Orchestes signifer** Creutz. — Jægersborg Dyrehave, paa Eg, i stort Antal, Sept., E. Rosenberg.
- *244a. **Tychius genistae** Boh. — Tychius genistac Boheman,

- i Schönherrs Gen. Curc. VII, p. 301. — Kmhr. Fabritius de Tengnagel har taget en lille Række af denne ny Art i Hornbæks Plantage, Juni.
- *245a. **Tychius squamulatus** Gyll. — *Rhynchaenus squamulatus* Gyllenhal, i Schönherrs Gen. Curc. III. 404. (Kirbyi Wat., *flavicollis* Stph.?). — Funden af Kmhr. Fabritius de Tengnagel i Frederikshaab Plantage ved Vejle, Juni, paa Fanø, Aug. og paa Bornholm, Juli, flere.
246. **Tychius Schneideri** Hbst. — I stort Antal paa *Anthyllis vulneraria*, paa Skrænter ned mod Stranden, ved Esbjerg, Juni-Juli, A. C. Jensen-Haarup. Taps Nørreskov S. f. Kolding samt Gels Skov, Aug., O. Holstebroe.
247. **Tychius junceus** Reich. — Eisbøl, Sønderjylland, Juni, en lille Række, L. Andersen.
- *247a. **Tychius meliloti** Stph. — Tychius? meliloti Stephens III. Br. Ent. IV. 55. — Voergaard Strand, ved Kolding, Juli 1889, paa *Melilotus officinalis*, i Antal, O. Holstebroe. Møens Sydkyst tæt ved Klintholms Havn, Aug., nedbanket af ovennævnte Plante, i Antal. Forf.
- *247b. **Tychius tibialis** Boh. — Tychius tibialis Boheman, i Schönherrs Gen. Curc. VII, p. 310. (*nigrirostris* Walt.). — Hr. A. C. Jensen-Haarup har, mellem sit i Varde-Egnen i Forsommeren 1901 indsamlede Materiale, fundet et Par Expl. af denne Art og senere, sammen med Mr. Rye fundet nogle flere, men meget enkeltvis, langs Stranden ved Esbjerg, ved at ryge mellem Græs og Lyng.
251. **Sibinia primita** Hbst. — Enkeltvis ved Hunderup og Killerup, Fyn, Sept., kætset, og i Ullerslev Mose, Mai, i Opskyl, N. P. Jørgensen; Liselund, Møen, Juni, Baron Rosenkrantz, samt paa Banedæmningen ved Kolding Fjord, Aug., E. Jürgensen.
- 254a. **Cionus hortulanus** Marsh. — 3 Stkr. paa *Scrophu-*

- laria aquatica*, i Juli, ved Husum, Sønderjylland, Joh. Andersen.
255. **Cionus pulchellus** Hbst. — Bornholm, Juni, en lille Række, Kmhr. Fabritius de Tengnagel; Kolding, paa Brunrod, enkelte Aar hyppig, E. Jürgensen. Almindelig paa *Scrophularia nodosa* i Juni-Juli ved Haderslev, L. Andersen, ligeledes ved Husum, Joh. Andersen.
259. **Gymnetron micros** Germ. — Eisbøl, Sønderjylland, 2 Stkr., i Juli, L. Andersen.
- 259b. **Gymnetron linariae** Panz. — Stenderup Strand, i Rodgaller paa *Linaria*, Aug.-Sept., E. Jürgensen. Klækket i Antal, af Galler paa *Linaria*, indsamlede paa Fanø, Aug., Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Klækket i Mængde af Rodgaller paa *Linaria* fra Haderslev, L. Andersen.
- *259c. **Gymnetron pilosus** Gyll. — Rhynchaenus pilosus Gyllenhal, Ins. Suec. IV. 763. — Viuf ved Kolding, Efter-aaret 1892, Proprietær Terp. Klækket fra samme Lokalitet, samt fra Haderslev, Aug., af Galler paa *Linaria*, L. Andersen. Se iøvrigt Ent. Medd. 1. R. 4. Bd. p. 252 o. flg.
261. **Gymnetron collinus** Gyll. — Viuf ved Kolding, Aug., og Haderslev, Okt.-Jan., klækket i Antal af Galler paa *Linaria*, L. Andersen. Ligeledes klækket i Mængde sammen med Nr. 259b af Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- *261a. **Gymnetron netus** Germ. — Curculio netus Germ., Mag. IV. p. 312. — Klækket af D'Hrr. Proprietær Terp og Overlærer L. Andersen af Stengelgaller af *Linaria*, indsamlede paa Førstnævntes Mark i Viuf ved Kolding. Se iøvrigt Ent. Medd. som ovenfor citeret.
- 262a. **Gymnetron concinnus** Gyll. — Ribe, Juni, enkelt, Kapt. Wielandt.
- 265a. **Gymnetron melanarius** Germ. — Enkelt, Rugballe-gaard Skov, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
267. **Orobites cyaneus** L. — I den udtørrede Skovrøddam,

- Juni, E. Rosenberg. I Sandhuller ved Harboøre, Mai-Juni, en lille Række, Forf.
269. *Acalles turbatus* Schh. — Et Par Stkr. i Lyngby Mose, Okt., Baron Rosenkrantz. Stenderup Strand, Juli, E. Jürgensen. Skoven ved Skamlingsbanken, Juni, 2 Stkr. Boserup Skov, paa Hassel, Juni, samt sigtet, April, enkelte, E. Rosenberg. En lille Række paa Risgjærder i Halk, Sønderjylland, Mai, L. Andersen. Iøvrigt funden i stort Tal paa Risgjærder paa Lolland af flere Samlere.
270. *Acalles roboris* Curt. — Enkelte ved Marienborg paa Møn, Marts, O. Holstebroe, Stenderup Strand, paa Eg, September, E. Jürgensen og i Tørning, Sønderjylland, Mai, paa Risgjærder, L. Andersen. Iøvrigt paa Risgjærder paa Lolland ligesom foregaaende.
274. *Coeliodes guttula* F. — Enkelte i Gels Skov og ved Meulenborg, Nordsjælland, Juni, Baron Rosenkrantz, og i Roden Skov, Lolland, Mai, Forf.
275. *Coeliodes fuliginosus* Marsh. — Amtmandshaven, Nykjøbing F., hele Sommeren, i Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
282. *Ceuthorhynchus syrites* Germ. — Johnstrup Vang, Juni, enkelt, Kapt. Wielandt. Als, Juni, enkelt, L. Andersen.
- *283a. *Ceuthorhynchus setosus* Boh. — Ceuth. setosus Boheman, i Schönherrs Gen. Curc. VIII. 2. 139. (atomus Boh.). — Enkeltvis ved Taps, S. f. Kolding, Mai, O. Holstebroe.
- *283b. *Ceuthorhynchus constrictus* Marsh. — Curc. constrictus Marsham, Ent. Brit. 258. — Hammershus, Bornholm, Juni, en mindre Række Mr. Rye, Forf.
- *285a. *Ceuthorhynchus barbareae* Suffr. — Ceuth. barbareae Suffrian, i Stett. ent. Ztg. 1847. 89. (cyano-pterous Redtb.). — Als, Mai, enkelt, L. Andersen.
288. *Ceuthorhynchus querctei* Gyll. — Enkeltvis, Amt-

- mandshaven Nykjøbing F., Okt., Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- *290a. *Ceuthorhynchus borraginis* F. — Curc. borraginis Fabricius, Ent. Syst. I. 2. 437. — Ved Frederiksholm Teglværk, paa Dæmningen, Okt., enkelt, Baron Rosenkrantz.
- *291a. *Ceuthorhynchus pubicollis* Gyll. — Rhynchaen. pubicollis Gyllenhal, Ins. Su. descr. IV. 574. (δ signatellus Gyll., signatus Bris.). — I en lille Dynge gammelt Hø i Udkanten af Fruens Bøge ved Svendborg, Mai, enkelt, N. P. Jørgensen.
292. *Ceuthorhynchus crucifer* Oliv. — Jægersborg Dyrehave, i Antal, Mai, Baron Rosenkrantz. Salling og Lindum, Aug., Roden Skov, Lolland, Juni, Pastor J. Møller. Bognæs, Mai, i Antal, Forf.
293. *Ceuthorhynchus litura* F. — Kolding, paa Tidsler, Aug.-Sept., E. Jürgensen.
294. *Ceuthorhynchus asperifoliarum* Gyll. — Møen, Sept. og Valby, Juli, flere, Baron Rosenkrantz.
- 295a. *Ceuthorhynchus figuratus* Gyll. — Hornbæks Plantage, Juni, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- *295b. *Ceuthorhynchus campestris* Gyll. — Rhynchaenus campestris Gyllenhal. Ins. Su. descr. IV 523. — Med Hensyn til denne og den følgende Arts Identitet hersker den største Uenighed. Beskrivelserne hos Gyllenhal, Schönherr og Germar er ikke saa gode, at man med nogen Sikkerhed kan afgjøre, hvilken Art der er ment under et givet Navn. Dog er disse to Arter meget forskjellige, særlig da Følehornenes Bygning afviger stærkt. Derimod er den foreliggende Art, selv efter de nyere Forfatteres Beskrivelser meget vanskelig at skelne fra *C. rugulosus*, saa at en Forvexling let er mulig. Hr. L. Andersen, Haderslev, angiver at have fundet den enkeltevis i Juni-Juli ved Eishøl i Sønderjylland. 3 Stkr., Husum, Juli, Joh. Andersen. Kapt. Wielandt har ved Ribe taget en lille Række af Individer, som han antager at være

samme Art som Hr. L. Andersens, paa Kamilleblomster, i Juni, samt senere en enkelt lignende paa Amager.

- *295c. *Ceuthorhynchus chrysanthemi* Germ. — Ceuth. chrysanthemi Germar, Col. sp. nov. 221. — Hr. L. Andersen meddeler om denne Art: »som foregaaende, men talrigere.«
- 296. *Ceuthorhynchus melanostictus* Marsh. — Helsingør, Sept., skarevis, Baron Rosenkrantz. Bornholm, Juni, paa en Eng ved Stampen, en længere Række, Mr. Rye og Forf. Et Par Stkr. i Rævkjær, Sønderjylland, Juni, L. Andersen.
- 299. *Ceuthorhynchus denticulatus* Schrank. — Lyngby, Mai, enkelt, Kapt. Wielandt.
- 301. *Ceuthorhynchus angulosus* Schh. — Torpens Omegn, Nordsjælland, Aug., enkelt, Baron Rosenkrantz.
- 302a. *Ceuthorhynchus scapularis* Gyll. — Enkelt paa Fænø, Juni, kætset, og ved Bredden af Stavisaa, Fyn, April, i Opskyl, N. P. Jørgensen.
- 303. *Ceuthorhynchus cyanipennis* Germ. — Rugballegaard, Aug., i stort Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Asnæs, Sebber, Korshavn, Juli-Aug. paa *Crambe maritima* i Antal, N. P. Jørgensen.
- 304. *Ceuthorhynchus chalybeus* Germ. — Af og til, enkeltvis, omkring Odense, især i slæet Græs og Sigtegods, N. P. Jørgensen.
- 306. *Ceuthorhynchus apicalis* Gyll. — Amtmandshaven, Nykøbing F., Marts, Mai og Okt., en Snæ Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Græftevold ved Taarnby Dige, Amager, Okt., enkelt, Forf. Fredsted, Sønderjylland, Juni 3 Stkr. L. Andersen.
- 307. *Ceuthorhyncus quercicola* F. — Færgegaard, Thy, Sept., og Rosenholm, Aug., enkelte, Baron Rosenkrantz. Enkeltvis ved Marslev, Sept. og i Fruens Bøge, Apr. og Nov., N. P. Jørgensen.
- 308. *Ceuthorhynchus melanarius* Stph. — Gjedser, Sept., i stort Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Hu-

lerød, Nordsjælland, paa *Cakile maritima*, Juli-Aug., en lille Række, N. P. Jørgensen. Bornholms Sydkyst ved Dueodden, paa ovennævnte Plante, Juni, i Antal, Mr. Rye og Forf.

- 312. **Ceuthorhynchus pumilio** Gyll. — Fanø, Juli, i Mængde, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Vester Ulslev Præstegaardshave, Mai, Pastor J. Møller. I Mængde i Vrist Klit ved Harboøre, Juli, Ræbild Bakker ved Skjørping, Juni, og mere enkeltvis ved Dronninggaard, i Jægersborg Dyrehave og ved Slagslunde, Nordsjælland, April og Mai, Forf. Enkelt i Tørning, Sønderjylland, Juli, L. Andersen.
- 313. **Rhytidosomus globulus** Hbst. — Kaas Skov, Salling, paa Bævreasp, Juni, Pastor J. Møller. Gels Skov, Mai, en Række, Forf.
- 315. **Tapinotus sellatus** F. — Lyngby Mose, Mai, og Skanderborg, Aug., Baron Rosenkrantz. Donse, enkeltvis, Juni, Kapt. Wielandt. Enkelt i Opskyl ved Rønninge Sø, Fyn, April, N. P. Jørgensen. Lyngby Sø, April, sigtet, og Lekkende, Aug., Forf. Furesø, paa *Lysimachia*, Juni, Mr. Rye og Forf.
- 316. **Rhinonchus velatus** Beck. — Sorø Sø, Juli, i stor Mængde, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Sanderum Mose, Mai-Juni, Vosemose, Marts, i Opskyl, N. P. Jørgensen.
- 320. **Rhinonchus notula** Germ. — Bøte Strand, Nov., i Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- 322. **Rhinonchus granatus** Schh. — Enkelt ved Vosemose, Fyn, Marts, N. P. Jørgensen.
- 323. **Rhinonchus quadrinodosus** Gyll. — Enkelt ved Rønninge Sø, Fyn, April, N. P. Jørgensen.
- 325. **Rhinonchus subfasciatus** Gyll. — Fænø, Juli, Grib Sø, Juli, Munke Mose, Fyn, Marts, April, Sept. og Okt. enkeltvis, N. P. Jørgensen. Oftere ved Damhusmosen, April, og Nyraad, Juni, enkelt, Forf.
- 332. **Baridius picinus** L. — Refsnæs, Juni, ikke sjælden,

- Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Vojens, Sept., 2 Stkr.
L. Andersen.
336. **Cossonus cylindricus** Sahlb. — Enkelt, under Bøgebark, i Floes Skov ved Randers, Aug., O. Holstebroe. Hr. O. Jacobsen har taget et enkelt Stykke i sin Have i Randers, Juni.
390. **Rhynchosites ophthalmicus** Stph. — Stenderup Skov, paa Eg, E. Jürgensen. Knudskov ved Vordingborg, Juni, paa Eg, i Mængde, Kons. Løvendal og Forf. Enkelt paa Eg i Ris Skov, Mai, L. Andersen.
391. **Rhynchosites sericeus** Hbst. — Rugballegaard ved Vejle, Juli, i Mængde, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
393. **Rhynchosites uncinatus** Ths. — Helsingør, enkeltvis, Juni-Juli, Baron Rosenkrantz. Tidsvilde, en lille Række paa Birk, Juni-Juli, Forf.
394. **Rhynchosites pauxillus** Germ. — Vintersbølle Skov ved Vordingborg, Mai, 2 Stkr. Forf.
- 395a. **Rhynchosites alliariae** Payk. — Laurbjerg, Jylland, og Sundby Storskov, Lolland, Juni, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
400. **Rhynchosites populi** L. — Naaege, Juni, i stort Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
402. **Rhinomacer attelaboides** F. — Jægerspris Nordskov, Mai, en lille Række, E. Rosenberg.
404. **Anthribus albinus** F. — Thureby, Mai, paa en Bøgestub enkelt, E. Rosenberg. I Bøgestubbe ved Gjerup, Fyn, Juni, nogle Stkr. N. P. Jørgensen.
405. **Tropideres niveirostris** F. — Gels Skov, Juli, enkelt, kætset, E. Rosenberg. Ikke sjælden paa Risgjærder i Styding, Sønderjylland, Mai-Aug., L. Andersen.
406. **Tropideres sepicola** F. — Enkelt ved Sødringholm, Juli, Baron Rosenkrantz. Gjessø, ved Silkeborg, Juni, Forf. Bognæs, nedbanket af Eg, Juni, og klækket af en træsket Egegren, Aug., E. Rosenberg.
409. **Choragus Sheppardi** Kirb. — Enkelt paa et Risgjærde ved Svendstrup, Juli, Kapt. Wielandt og i Frederiks-lund ved Furesø, Juli, E. Rosenberg.

- *411a. **Bruchus viciae** Ol. — Br. viciae Olivier, Ent. IV. 79. (nigripes Gyll.). — Slagslunde Overdrev ved Ølstykke Station, Mai og Aug., hver Gang kun et enkelt Stk., Forf. En lille Række ved Hammeren, Bornholm, Juni, Mr. Rye.
412. **Bruchus loti** Payk. — Marrebæk paa Vestkysten af Falster, Juni, i Antal, Forf.
413. **Bruchus villosus** F. — Pomlenakke, Falster, Juni, i Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
-

Scolytidae & Platypodidae.

Nedenstaende Fortegnelse er udarbejdet efter Kons. Løvendals:

De danske Barkbiller, Kbhn. 1898, med Tilføjelse
af enkelte senere Fund.

1. **Scolytus Geoffroyi** Goeze. — Scol. destructor Oliv. Schiø. Fort. Nr. 380. — Meget sjælden; funden af Kons. Løvendal i Classens Have, Mai, 1859, i Antal, og Næsbyholm Skov, Mai 1883, i fældede Elmestammer. Gange og nogle døde Expl. fandtes desuden i en udgaaet Elm i Bognæs Vesterskov af samme Samler.
2. **Scolytus Ratzeburgii** Janson. — Schiø. Fort. Nr. 379. — Sjælden, men oftere i Antal, i Jylland, Silkeborg-egnen, Frijsenborg, Lindum og Hals Nørreskov, i Birk, saavel i Stammen, som i de tykkere Grenne.
3. **Scolytus laevis** Chap. — Scol. multistriatus Marsh., Schiø. Fort. Nr. 383. — Meget sjælden; klækket af Træ fra Jægersborg Dyrehave, Juli, og nedbanket af et Risgjærde ved Hadsund, Juni, formodentlig stammande fra Elletræ.
4. **Scolytus pruni** Ratz. — Schiø. Fort. Nr. 381. — Meget stedegen, men funden i næsten alle vore Landsdele, Kjøbenhavn, Lerchenborg. Nykøbing F., Maribo, Nakskov, paa Fyn ved Fløstrup, i Jylland ved Horsens og i Sønderjylland ved Husum, i Juni-Aug., oftest i Frugttræer i Haver, men ogsaa i vild Skovæble og Elmetræ.

5. **Scolytus intricatus** Ratz. — Schiø. Fort. Nr. 382. — Sjælden, men udbredt; Sjælland, Falster, Lolland, Fyn og Jylland, Juni-Aug., oftest i Eg.
6. **Scolytus rugulosus** Ratz. — Schiø. Fort. Nr. 384. — Sparsomt, men funden i de fleste Egne af Landet; Sjælland, Amager, Falster, Lolland, Fyn og Jylland, i Juni-Aug., oftest i Æble- og Blommetræer.
- *7. **Hylurgus ligniperda** F. — Bostr. ligniperda Fabricius, Ent. Syst. I. 2. 367. — Et enkelt Stykke er fundet i Almindingen paa Bornholm af Kons. Løvendal, Juni 1892, i en Fyrrestub.
8. **Myelophilus piniperda** L. — Hylurgus piniperda L., Schiø. Fort. Nr. 348. — Skarevis i alle vore Naaleskove, ynglende i Fyr og Gran.
9. **Myelophilus minor** Hart. — Hylurgus minor Hartig, Schiø. Fort. Nr. 349. — Angives af Schiødte som funden i Nordsjælland; ikke senere gjenfunnen. Indføres jævnlig paa Tømmerpladser.
10. **Polygraphus pubescens** F. — Schiø. Fort. Nr. 356. — Skarevis i Naaleskovene i Nordsjælland, ogsaa funden i Midtsjælland samt paa Falster.
11. **Dendroctonus micans** Kug. — Schiø. Fort. Nr. 350. — Nordsjælland, i Rødgran; Teglstrup Hegn, Gels Skov, Ravnsnæs Skov, Freerslev Hegn og Tidsvilde Hegn, oftest i Juni, undertiden i stort Antal.
12. **Hylesinus crenatus** F. — Schiø. Fort. Nr. 353. — Udbredt men langtfra hyppig; flere Steder paa Sjælland, Amager og Falster.
13. **Hylesinus oleiperda** F. — Schiø. Fort. Nr. 354. — Stedegen og sparsomt; Sjælland, Lolland, Jylland og Sønderjylland. Kolding. Sept. enkelt. E. Jürgensen.
14. **Hylesinus fraximi** F. — Schiø. Fort. Nr. 355. — Udbredt, temmelig almindelig, og funden i alle Landsdele.
15. **Phloeophthorus rhododactylus** Marsh. — Phloeophth. spartii Nördl., Meinerts Tillæg i Ent. Medd. I, Nr. 351a. — I Gyvel, et Par Gange i Juni og September i Om-

egnen af Vejle. I stort Antal i Allinggaard Skov ved Silkeborg, Esben Petersen.

16. **Phloeophthorus spinulosus** Rey. — *Phloeophth. rhododactylus* Marsh., Schio. Fort. Nr. 352. — Udbredt i Skovene N. f. Kjøbenhavn: Jægersborg Dyrehave, Gels Skov og Ruderhegn, samt i Jylland i Egnen omkring Vejle.
17. **Hylastes ater** F. — Schio. Fort. Nr. 344. — Udbredt og ret hyppig over hele Landet.
18. **Hylastes cunicularius** Er. — Schio. Fort. Nr. 345. — Almindelig og meget hyppigere end foregaaende Art.
19. **Hylastes opacus** Er. — Schio. Fort. Nr. 346. — Ikke hyppig, men forekommer dog vistnok i de fleste større Fyrrebevoxninger; Rude Hegn, Tidsvilde, Annebjerg Skov i Odsherred, Bromme Plantage ved Sorø, Bornholm i Almindingen og Blykobbeskov, og i Tversted Plantage ved Hjørring. Amtmandshaven, Nykjøbing F., April, flere, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
20. **Hylastes palliatus** Gyll. — Schio. Fort. Nr. 347. — Udbredt overalt og meget almindelig.
21. **Hylastes trifolii** Müll. — Løvendal Tomicini danici, Ent. Med. II pag. 34. — Enkelte Stykker fundne ved Husum i Sønderjylland af Toldassistent Hansen.
22. **Crypturgus pusillus** Gyll. — Schie. Fort. Nr. 357. — Kun funden paa Sjælland, hvor den imidlertid er ret udbredt og hyppig.
23. **Crypturgus cinereus** Hbst. — Schio. Fort. Nr. 358. — Ligeledes kun funden paa Sjælland. I det hele en langt sjældnere Art.
24. **Cryphalus abietis** Ratz. — Schio. Fort. Nr. 359. — Udbredt og almindelig.
25. **Cryphalus tiliae** Panz. — Schio. Fort. Nr. 360. — Nordfalster og paa Risgjærder i det sydøstlige Lolland, oftere i stort Antal. Ogsaa klækket i Antal af Træ

- fra Sundby Storskov, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
26. **Cryphalus fagi** F. — Schiø. Fort. Nr. 361. — En sjældnere Art, funden paa Sjælland, Møn, Lolland og Falster. Klækket i Antal sammen med foregaaende, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 27. **Cryphalus caucasicus** Lindm. — Cryph. caucasicus Lindemann, Mon. Borkk. Russl. Soc. imp. Nat. Mosc. LI. 373. Cryph. Schreineri, Løvendal Tom. dan. p. 53. — 2 Stkr., fremkomne i Kons. Løvendals Klækkehus, enten af Gjærdestof fra Frejlev Skov paa Lolland, eller snarere, som Hr. Løvendal antager, af Avnbøg fra Kjeldskov ved Bremersvold paa Lolland.
 - *28. **Pityophthorus glabratus** Eich. — Pityophth. glabratus Eichhoff, d. eur. Borkk. 196. — I Antal, nedbanket af Grenebunker af Fyr i Hornbæks Plantage, Juni, Kons. Løvendal og Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
 29. **Taphrorychus bicolor** Hbst. — Dryocoetes bicolor Schiø. Fort. Nr. 373. — Sjælland, Falster og Lolland; i det hele sparsomt.
 30. **Xylocleptes bispinus** Dft. — Meinerts Tillæg Nr. 367a. — Kun et enkelt Stykke kjendes her fra Landet, det er fundet af Kons. Løvendal i Jægersborg Dyrehave, i Mai, kætset.
 31. **Tomicus sexdentatus** Börner. — Tom. stenographus Schiø. Fort. Nr. 362. — Kjendes kun fra Tømmerpladser; men efter Schiødte findes ofte i vore Tørvemoser Stammer, der bærer tydeligt Vidnesbyrd om, at den tidligere har ynglet her i Landet, og sandsynligt er det derfor, at den vil findes i vore Skove.
 32. **Tomicus typographus** L. — Schiø. Fort. Nr. 363. — Foruden paa Sjælland, hvor den oftere er optraadt i stor Mængde og har anrettet betydelig Skade, er den ogsaa funden i Vejleegnen.
 - *33. **Tomicus acuminatus** Gyll. — Bostr. acuminatus

Gyll., Ins. Suec. IV. 620. (geminatus Zett.). — Kun funden i Bromme Plantage ved Søre, hvor Kons. Løvendal traf den ynglende i en afhugget Fyrretop, sammen med *Tom. proximus* og *bidentatus*.

34. ***Tomicus proximus*** Eich. — Løvendal Tom. dan. p. 58. — Bromme Plantage, sammen med foregaaende. Hornbæk Plantage i Antal, Juni, Kons. Løvendal og Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
35. ***Tomicus laricis*** F. — Schiø. Fort. Nr. 364. — Udbredt og temmelig almindelig over hele Landet.
36. ***Tomicus suturalis*** Gyll. — Tom. nigrita Schiø. Fort. Nr. 365. — Sjælland, Lolland, Jylland, men stedegen om end undertiden i stort Antal.
37. ***Tomicus chalcographus*** L. — Schiø. Fort. Nr. 366. — Forskjellige Steder i Nordsjælland og ved Vejle, undertiden i Mængde. Sundby Storskov, Lolland, i Antal, Marts, Nov. og Dec., Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
38. ***Tomicus elongatus*** Løv. — Løvendal Tom. dan. p. 61. — Gels Skov og Tidsvilde Hegn, enkelte Stykker, Juni og Juli, Kons. Løvendal. Fra ældre Tid henstod i Museets Samling en Del Expl., fremkomne i Drewsens Klækkehus af Naaletræ fra Nord-sjælland, men uden nærmere Optegnelser.
39. ***Tomicus bidentatus*** Hbst. — Tom. bidens Schiø. Fort. Nr. 367. — Findes af og til, men hører til de sjældnere Arter. Den er funden flere Steder paa Sjælland, i Jylland og paa Bornholm. Ved Esbjerg i stort Antal, Jensen-Haarup.
40. ***Tomicus quadridens*** Hart. — Løvendal, Tom. dan. p. 65. — Et Par Individer ere fundne paa Falster; to (Han og Hun) i Hornbæk Plantage, Juni 1899, Dr. C. Jørgensen.
41. ***Dryocoetes autographus*** Ratz. — Schiø. Fort. Nr. 369. — Jevnt udbredt og ikke sjælden paa Sjælland og i Jylland.
42. ***Dryocoetes alni*** Georg. — Schiø. Fort. Nr. 372. — Temmelig sjælden; funden flere Steder paa Sjælland,

- Falster, Lolland og i Jylland. Enkelt i Sønderjylland
L. Andersen.
43. **Dryocoetes villosus** F. — Schiø. Fort. Nr. 370. — Ikke almindelig; funden i Jylland, paa Sjælland og Lolland.
 44. **Lymantor coryli** Perris. — Lymantor sepicola Løvendal Tom. Dan. p. 68. *Pityophthorus micrographus* Schiø. Fort. Nr. 368. — Kun funden paa Risgjærder paa Lolland, Falster, Langeland og Fyn, men oftere i stort Antal.
 45. **Coccotrypes dactylicherda** F. — *Dryocetes dactylicherda* Schiø. Fort. Nr. 371. — En indført Art, der gjentagne Gange er funden ynglende i Daddelkjærner i København.
 46. **Xyleborus dispar** F. — Schiø. Fort. Nr. 374. — Udbredt, men ikke almindelig; funden paa Sjælland, Lolland, Fyn og i Jylland og Sønderjylland. Hanerne er langt sjældnere end Hunnerne.
 47. **Xyleborus Saxesenii** Ratz. — Schiø. Fort. Nr. 376. — Udbredt, men sjælden; funden paa Sjælland, Falster, Lolland og i Jylland.
 48. **Xyleborus monographus** F. — Schiø. Fort. Nr. 375. — Kun funden en Gang her i Landet, nemlig ved Randers i en Egelund, der forlængst er ryddet.
 49. **Trypodendron signatum** F. — *Xyloterus signatus* Schiø. Fort. Nr. 378. — Hyppig og udbredt i den største Del af Landet, dog endnu ikke iagttagen paa Lolland, Falster og Møen.
 50. **Trypodendron quercus** Eich. — Løvendal Tom. dan. p. 80. — Da den let forvexes med foregaaende Art, er der en Mulighed for, at den kan være udbredt her i Landet. Med Sikkerhed vides den kun at være funden i Jylland, nemlig i Lindum Skov ved Onsild, ved Silkeborg og i Ry Nørreskov.
 51. **Trypodendron domesticum** L. — Schiø. Fort. Nr. 377. — Almindelig og udbredt i alle vore Landsdele.

52. **Platypus cylindrus** F. — Schio. Fort Nr. 385. — Skal for mange Aar siden være funden paa Skibs-værfter paa Kristianshavn.
-

Chrysomelidae.

3. **Donacia dentata** Hoppe. — Af og til enkeltvis ved Odense Aa i Juni og Juli, N. P. Jørgensen.
4. **Donacia sparganii** Ahr. — Enkeltvis ved Odense, og i stort Antal ved Ramløse, Nordsjælland, Aug., N. P. Jørgensen. Rosenholm, Aug., enkeltvis, Baron Rosenkrantz, Kristiansminde ved Kolding, Juli, E. Jürgensen.
8. **Donacia obscura** F. — Enkeltvis ved Vosemose og Brahetrolleborg, Fyn, Mai-Juni, N. P. Jørgensen. Ballerup, Mai, i stort Antal, paa Rør, Kapt. Wielandt.
17. **Donacia nigra** F. — Munke Mose ved Odense, Juni, en lille Række, N. P. Jørgensen.
22. **Haemonia equiseti** F. — Donse, Nordsjælland, Juni, enkelt, kætset, Kapt. Wielandt. Et enkelt Expl. fundet dødt i Østersøen ud for Kjeld Skov, Juni, Pastor J. Møller, Lyngby Mose, Mai, Baron Rosenkrantz.
25. **Orsodacna cerasi** F. — Frejlev Skov, Juni, i Hvidtjørnsblomster, en lille Række, Pastor J. Møller og Forf. Sammesteds, i stor Mængde, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
28. **Zeugophora frontalis** Suffr. — Enkeltvis i Hegn og Udkanten af Skove ved Kolding, paa Bævreasp og Sølvpoppel, Juli-Sept., E. Jürgensen.
- *28a. **Zeugophora Turneri** Power. — Zeugophora Turneri Power, Zoologist 1863 p. 8735 (rufotestacea Kr.). — Et enkelt, dødt Exemplar af denne ejendommelige Art blev fundet paa Bornholms sydlige Strandbred, nær Arnager Fiskerleje, i Juni 1900, af Mr. Rye.

29. *Crioceris merdigera* L. — Hostrup, Sønderjylland, Juli, i Antal, L. Andersen.
- *38a. *Cassida subferruginea* Schr. — *Cassida subferruginea* Schrank, Beyträge 62. (*ferruginea* F.). — Gjedser, Mai, 3 Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
- *41a. *Cassida seladonia* Gyll. — *Cassida seladonia* Gyllenhal, Ins. Suec. IV. 644. — Ved Hasle paa Bornholm, under Stene, Kons. Løvendal.
- *46a. *Cassida oblonga* Ill. — *Cassida oblonga* Illiger, Käf. Preuss. 485 (vittata Vill.). — Sosa Odde paa Bornholm, Sept., Kons. Løvendal. Taps Nørreskov, Mai, enkelt, O. Holstebroe.
48. *Cassida hemisphaerica* Hbst. — Kolding-Egnen, Juli-Okt., E. Jürgensen. Helsingørs Omegn enkeltvis, Juli, Baron Rosenkrantz. Hornbæk, Juni, enkelt, stud. mag. Ditlevsen. Nyraad ved Vordingborg, Aug., i Antal, V. Nielsen, Forf.
- 51a. *Clythra laeviuscula* Ratz. — Paa en Eng ved Marienlyst ved Vordingborg, Juni 1894-95, ikke gjenfunnen senere, V. Nielsen.
54. *Labidostomis tridentata* L. — Enkelt ved Laven, Aug., N. P. Jørgensen.
59. *Cryptocephalus coryli* L. — Foruden tidligere nævnte Findesteder, hvor den oftere er gjenfunnen af flere Samlere, nævnes: Rude Hegn, Juli, enkelt, Forf.
66. *Cryptocephalus punctiger* Payk. — Tidsvilde, kætset under store Birketræer, Juli, en lille Række, Forf. Sammesteds, Juli, enkelte, E. Rosenberg.
67. *Cryptocephalus flavilabris* F. — Tidsvilde, paa Birk, Juni, en lille Række, Ass. West. Sammesteds, i Antal, Juni, Mr. Rye og Forf. Kaas Skov, Salling, Juni, Pastor J. Møller.
68. *Cryptocephalus pallifrons* Gyll. — Taps Østermose, Sept., enkelt, O. Holstebroe.
70. *Cryptocephalus vittatus* F. — Løvenholt ved Silkeborg, Juni, i stort Antal, Mr. Rye. Lindum Skov ved Onsild, Juni, Pastor J. Møller, Forf.

74. **Cryptocephalus gracilis** F. — Esbjerg, Juli, i stort Antal, A. C. Jensen-Haarup og Mr. Rye. Enkelt, Juni, paa Als, L. Andersen.
- 76a. **Lamprosoma concolor** St. — Frejlev Skov, Juni, i stort Antal, paa *Aegopodium podagraria*, O. Holstebroe, Mr. Rye og Forf.
77. **Eumolpus obscurus** L. — Munkebjerg ved Vejle, Juni, en lille Række; Søborg i Nordsjælland, Juli, N. P. Jørgensen.
- 78a. **Oreina luctuosa** Oliv. — I stor Mængde paa *Centauraea jacea* ved Assens og Sønderby paa Fyn, Juli, L. Andersen.
- *84a. **Chrysomela gypsophilae** Küst. — Chrysomela gypsophilae Küster, Käf. Eur. II. 71. — Denne Art har været sammenblandet med *sanguinolenta* L., indtil Hr. Løvendal blev opmærksom paa den. Den synes at være udbredt over hele Landet og næsten ligesaa almindelig som nævnte Art.
86. **Chrysomela limbata** F. — Enkelt ved Tidsvilde, Juni, og Jægerspris, Juni, A. Klöcker. Enkeltvis omkring Silkeborg, Esben Petersen. Gels Skov, Apr. og Juni, begge Gange enkelt, E. Rosenberg. Frederiksværk, Juli, enkelt, C. Fabritius de Tengnagel.
87. **Chrysomela carnifex** F. — En lille Række under *Artemisia* paa Stranden Nord for Rønne paa Bornholm, Sept., A. Klöcker.
88. **Chrysomela marginata** L. — Horsensegnen, Marts, Jensen-Haarup. Kolding Fjord, Aug., E. Jürgensen.
89. **Chrysomela analis** L. — Esbjerg, enkeltvis i April, Jensen-Haarup. Funden i Silkeborgegningen, i stort Antal, Juli, Mr. Rye. Harboøre, Apr. og Aug., enkeltvis, Forf. I Stursbøl, Sønderjylland, Juli, en lille Række, L. Andersen.
95. **Chrysomela fucata** F. — Meulenburg, Nordsjælland, Mai-Juni, et Par Stkr., Baron Rosenkrantz.
- 95a. **Chrysomela duplicata** Zenk. — Enkelt i Gelskov, Aug. 1893, A. Klöcker. Sammesteds i Antal paa

Hypericum, Mai-Juni og igjen Aug.-Oct., E. Rosenberg.
Enkelt ved Helsingør, Sept., Baron Rosenkrantz.

- *96a. **Chrysomela quadrigemina** Suff. — Chrysomela quadrigemina Suffrian, Mon. 125; Weise 405 (gemellata Rossi). — Et enkelt Stykke ved Tommerup, Fyn, Mai, N. P. Jørgensen.
- 105. **Gonioctena pallida** L. — Krabbesholm Skov ved Skive, paa Hassel, Mai, talrig, Pastor J. Møller. Mai-Juni, paa Hassel, ved Tommerup, Aarup, Brahetrolleborg og Tarup paa Fyn, N. P. Jørgensen.
- 120. **Adimonia fontinalis** Boh. — Et Par Stykker paa Enge ved Hundrup, Juni og Juli, N. P. Jørgensen. Et Par Stykker i Juli, i Lyksborg, Sønderjylland, L. Andersen.
- 122. **Adimonia interrupta** Illig. — Tidsvilde, Juni, i Antal, E. Rosenberg, West, Rye, Forf. Hr. Rosenberg har klækket Dyret i Antal af Larver paa *Sedum acre*.
- 123. **Adimonia aptera** Bon. — Rugballegaard ved Vejle, Mai og Juni, enkelte, og Sundby Storskov, Marts, 3 Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Peders Nymarks Eng ved Nyraad, i Slutningen af April og Begyndelsen af Mai, sigtet af Løv, en Række, Vald. Nielsen.
- 126. **Galeruca suturalis** Ths. — Af den sorte Varietet *v. nigrita* Ws. har Hr. E. Rosenberg et Stykke fra Faaborg, paa Lyng, og et andet, taget af Forstkandidat C. Larsen i Mosen ved Lillerød Station.
- *130. **Galeruca pusilla** Dft. — Galeruca pusilla Duftschmid, Fn. Austr. III. 230; Weise, 631. (tenella Joann. nec L.). — Søborg, Nordsjælland, Aug. og Rønninge, Apr., begge Gange enkelt, N. P. Jørgensen.
- 139. **Psylliodes dulcamarae** Ent. Hft. — Rugballegaard ved Vejle, Juni, i Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Jægerspris Nordskov, Juli, nogle Stkr., E. Rosenberg. Frejlev Skov, Juni, i Antal, Forf. Kolding, April og Juni, E. Jürgensen.

140. **Psylliodes chalcomera** Ill. — Kohaveskov ved Nykjøbing F., Mai, i stort Antal, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
143. **Psylliodes affinis** Payk. — Ikke sjælden ved Odense, N. P. Jørgensen. Lekkende, Juli-Aug., mange, Baron Rosenkrantz.
- *143a. **Psylliodes thlaspis** Foudr. — *Psylliodes thlaspis* Foudras, Alticides p. 42. (*fuciformis* Redt.). — Kors-havn ved Odense Fjord, paa *Crambe maritima*, Juli, i Mængde, N. P. Jørgensen. Refsnæs, Juli, 4 Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
145. **Psylliodes napi** F. — Klitmøller, Sept., Sorø, Marts, enkeltvis, Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
147. **Psylliodes cyanoptera** Ill. — Lyksborg, Sønderjylland, Juli, 2 Stkr., L. Andersen.
154. **Thyamis holsaticus** L. — Esbjerg, enkeltvis, Jensen-Haarup.
- *161a. **Thyamis suturellus** Dft. — *Haltica suturella* Duftschmid, Fn. austr. III. 262. (*thoracicus* Stph., All.). — Hr. N. P. Jørgensen meddeler: Af denne forholdsvis let kjendelige Art tog jeg 7 Stkr. i Opskyl i Munke Mose, Marts-Apr. 1897-98.
164. **Thyamis verbasci** Marsh. — Ikke sjælden omkring Odense, N. P. Jørgensen.
- *175a. **Phyllotreta flexuosa** Ill. — *Haltica flexuosa* Illiger, Schneid. Mag. I. 5. 1794 p. 601. — Hr. N. P. Jørgensen meddeler: Denne vistnok udbredte Art er mærkelig nok ikke taget op i tidligere Fortegnelser. I Munke Mose ved Odense traf jeg den i Antal i Opskyl, Apr. 98; desuden har jeg den fra Vosemose, Marts, Fruens Bøge, Apr., Ullerslev, Mai, og et enkelt Stk. fra Sebber ved Limfjorden, Aug.
- *180a. **Phyllotreta cruciferae** Goeze. — *Haltica cruciferae* Goeze, Ent. Beytr. I. 1777, 312. (*obscurella* Ill.). — I Udkanten af Hunderup Skov sigtede Hr. N. P. Jørgensen i Dynger af Løv, i April og Mai, 2 Stkr. af denne Art. Han bemærker, at en Have findes tæt

derved, hvori en Gartner dyrker forskjellige *Cruciferae* til Frøavl.

- *181a. **Dibolia occultans** Koch. — *Haltica occultans* Koch, Ent. Hft. II. p. 22. *Dibolia* Latr. — Roden Skov, Lolland, Sept., enkelt, Kons. Løvendal.
- *181b. **Dibolia depressiuscula** Letz. — *Haltica depressiuscula* Letzner, Uebers. Verh. Schles. Ges. 1846. 83. — Paa et Gjærde ved Killerup, Fyn, flere Gange om Efteraaret, især September, enkeltvis, N. P. Jørgensen.
- *181c. **Dibolia rugulosa** Redt. — *Haltica rugulosa* Redtenbacher, Fn. Austr. ed. I. 541. — En lille Række i Lindum Skov ved Onsild, Juni, Kons. Løvendal.
- 186. **Apteropeda orbiculata** Marsh. — Enkeltvis, Mai-Juli, ved Haderslev, L. Andersen.
- 187. **Apteropeda majuscula** Foudr. — Bramdrup Skov, Stenderup Skov og Kolding, Juli, E. Jürgensen. Enkeltvis ved Haderslev, Mai-Juli, L. Andersen.
- 193. **Ochrosis salicariae** Foudr. — Eng ved Kaas Skov, Salling, Juni, Pastor J. Møller. Rosenholm, Aug.-Sept., enkeltvis, Baron Rosenkrantz. Lyngby Mose, Mai, en lille Række, Forf.
- 195. **Epitrix pubescens** Ent. Heft. — Lekkende, Sydsjælland, Juli-Aug., mange, Baron Rosenkrantz.
- *199a. **Podagrlica fuscicornis** L. — *Chrysomela fuscicornis* Linné, Syst. nat. XII ed. p. 595. (malvae Fourc., Schrank). *Podagrlica* Foudras. — Enkeltvis paa Stokroser i Sønderborg, L. Andersen.

Erotylidae.

- 1. **Engis sanguinicollis** F. — Lundby Bakker S. f. Aalborg, Juni, enkelt, Joh. P. Johansen. I en Sandkule i Styding, Sønderjylland, Juni enkelt, L. Andersen.
- 8. **Tritoma bipustulata** F. — Gram, Nordslesvig, i Svamp paa en Bøgestub, April, en Række, Kapt. Wielandt.

Endomychidae.

1. *Lycoperdina succincta* L. — Ræbild Bakker ved Skjørping, Aug., en lille Række, Johansen, Forf.
 3. *Endomychus coccineus* L. — Findes jævnlig paa Risgjærder i den sydøstlige Del af Lolland. Kolding, under Bark paa en Bøgestub, Juli, en lille Række, E. Jürgensen. En lille Række, i Aug., i Christiansdal, Joh. Andersen.
-

Coccinellidae.

1. *Rhizobius litura* F. — Nykjøbing F., Juni og Sept., temmelig almindelig; Bornholm, Juni, enkelt, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Ikke sjælden paa sandede Diger ved Kolding, Juni og Aug.-Sept., E. Jürgensen. Hammeren, Bornholm, i Antal, Mr. Rye, Forf. Enkeltvis, Mai-Aug., i Eisbøl og en lille Række ved Husum, Juli, Joh. Andersen.
2. *Coccidula scutellata* Hbst. — Digerne udfor Kjeld Skov, Lolland, Juni og Sept., Pastor J. Møller.
9. *Adalia bipunctata* L. — Helsingør, Marts, enkelt, Baron Rosenkrantz. Sose, Bornholm, Aug., enkelt, stud. mag. A. Ditlevsen.
14. *Coccinella hieroglyphica* L. — Den sorte Varietet er taget ved Gram i Nordslesvig af Kapt. Wielandt, ved Kolding, Aug.-Sept., enkeltvis, E. Jürgensen, i Floes ved Randers, O. Holstebroe og Forf., samt ved Gjessø, S. f. Silkeborg, Juni, Mr. Rye og Forf.
19. *Myrrha octodecimguttata* L. — Enkeltvis i Hornbæk Plantage, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel, Ravneholm, April, og Rude Hegn, Marts, E. Rosenberg, samt Bremersvold paa Lolland, Aug., og Tidsvilde, Juni, Forf.
30. *Exochomus quadripustulatus* L. — Enkelt i Eisbøl, og Styding, Juni, L. Andersen.
31. *Exochomus auritus* Scriba. — Enkelte Stkr., under

- Tang paa Stranden ved Tidsvilde, Juni, Mr. Rye.
 En lille Række i Ulfslyst, Mai, L. Andersen. Enkelt
 i Hostrup, Sønderjylland, Mai, Joh. Andersen.
32. *Hyperaspis reppensis* Hbst. — Kolding, paa Regnfang, Juni og Aug., E. Jürgensen. Paa Eg, Løverodde ved Kolding, Juni, enkelt, Kapt. Wielandt.
35. *Platynaspis bisbipustulata* F. — Refsnæs, Aug., i større Antal, Schlick; enkelt ved Sosa Odde, Bornholm, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel, Bevtoft, Sønderjylland, Juli, L. Andersen, samt Erlev, Sønderjylland, Aug., Joh. Andersen.
36. *Scymnus nigrinus* Kug. — Tørning, Sønderjylland, Aug., enkeltvis, L. Andersen.
38. *Scymnus biverrucatus* Panz. — Klitmøller, Mai, 2 Stkr., Kmhr. Fabritius de Tengnagel.
39. *Scymnus Redtenbacheri* Muls. — Enkelt ved Guldborgsund, paa en Skrænt, Juni, og Hornbæk, Juni, Kmhr. Fabritius de Tengnagel. Bornholm, Juni, et Par Stkr., Mr. Rye.
43. *Alexia pilosa* Panz. — Lyngby Mose og Ordrup Mose, sightet, April, E. Rosenberg. Enkelt ved Foden af et gammelt Risgjærde ved Bremersvold, Juni, Forf. Tørning, Sønderjylland, Mai, en lille Række, L. Andersen.
- 45a. *Clambus minutus* St. — Enkeltvis omkring Odense, især i Sigtogods om Foraaret; Tommerup, Sept., N. P. Jørgensen.
46. *Comazus enhamensis* Stph. — Enkelt, Amager Fælled, Sept., E. Rosenberg.
47. *Sericoderus lateralis* Gyll. — Søborg, Nordsjælland, Aug., i Antal; jævnlig enkeltvis i Sigtogods fra Odense Omegn, N. P. Jørgensen.
-